






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1787/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1787/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1787/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

1787/A



P E D A N I I
DIOSCORIDIS
ANAZARBEI, DE
MEDICA MATERIA

LIBRI SEX,
Ioanne RVELLIO Suefsionenfi
interprete.

HIS ACCESSIT, PRAETER
Pharmacorum simplicium catalogum, copiosus
omniũ ferme medelarum sine curationũ Index.



LVGDVNI,
Apud Theobaldum Paganum.

M. D. XLVII.

INDEX OMNIUM

quæ in Dioscoride continentur.

A Brotonum	229	Adianton	364
Abfinthium	227	Aegilops	365
Abfinthiũ marinum	228	Aeris squamma	441
Abfinthiũ Santonicũ	229	Aeris flos	440
Acacalis	76	Aerugo rafa	442
Acacia	83	Aerugo scolecia	444
Acacia altera	84	Aes vſtum	439
Acantha,us	223	Aethiopis	354
Acanthium	222	Aëtites lapis	482
Acanthus fylueſtris,	223	Agallochon	25
Acetum	413	Agaricum	211
Acetum è betonica	427	Ageraton	327
Acetum muſſum	414	Agnus	85
Acetum ſcillinum	416	Aiuga	302
Acetum è ſtœchade	427	Alabaſtrites	480
Achillea	319	Alcea	298
Achras	99	Alcibiadion	315
Acida muria	415	Alcyonium	473
Acinos	239	Alisma	299
Acorum	8	Allium	186
Aconitum	342	Aloë	225
Adarces	474	Alfine	347
Adeps omnis	135	Althæa	297

INDEX.

Alumen	464	Anethum	249
Alumen scissile	ibidē	Anguinium senectus	115
Alus	309	Anisum	249
Alysson	271	Anonis	223
Alypon	393	Anthemis	292
Amaracum	238	Anthericum	198
Amaranton	327	Antyllis	291
Ambrosia	282	Antipathes	475
Amiantus lapis	481	Antirrhinon	362
Ammi	251	Antispoda	439
Ammoniacon	269	Aparine	271
Amomis	20	Aphaca	184
Amomum	19	Apiastrum	276
Ampelitis terra	486	Apios	392
Ampeloprason	186	Apium	293
Amphisbænæ ictus notæ		Apocynon	344
531. eius curatio	541	Apollinaris	334
Amurca	88	Apri iecur	121
Amygdalæ amaræ	101	Apum ictus curatio	537
Amylum	157	Aqua	412
Anagallis	205	Aqua frigida	513
Anagyris	299	Aqua marina	412
Anchusa	315	Aqua mulsa	411
Androsaces	290	Arabicus lapis	480
Androsæmon	301	Araneus	126
Anemone	204	Arbutus	101

INDEX.

Arction	355	Asplenon	290
Arction	354	Aspidis ict ⁹ notæ	533. eius
Arcturon	ibidem	curatio	543
Arena	483	Aster Atticus	359
Argemone	205	Astragalus	329
Argēti recrementū	449	Athamanticum	8
Argenti scoria	ibidem	Athera	155
Argēti spuma	ibi. & 510	Atractylis	272
Argentū viuū	456. & 510	Atramentū librariū	487
Arisarum	198	Atramentū sutoriū	458
Aristolochia	214	Atriplex	169
Armeniaca mala	98	Auellana nux	103
Armenius lapis	454	Auena	156
Armoracia	167	Auricula muris	209
Aron	197	Auri pigmentum, siue ar	
Arrenogonon	286	senicon	463. & 510
Artemisia	281	B Accæ lauri	71
Arundo, vide Harundo.		Baccharis	240
Asarum	13	Balaustium	94
Asclepias	272	Ballote	276
Ascyron	301	Balsamum	22
Asininum iecur	121	Barbula hirci	183
Asini vngula	120	Basilisci ictus notæ	533
Asius lapis	476	eius curatio	543
Aspalathus	24	Bdellium	55
Asparagus	173	Beta	171

INDEX.

Betonica	304	Calamus odoratus	21
Bitumen	66.& 67	Calamintha	235
Blatta pistrinaria	120	Calcifraga	393
Bliton	168	Caltha	327
Botrys	282	Calx	510
Brassica	169	Calx viua	471
Brassica marina	171	Cancamum	26
Brassica sylvestris	170	Canceri	113
Britannica	305	Canis rubus	77
Bromus	365	Canis rabidi iecur	121
Bryon	25	Canis rabiosi signa	524.
Bryonia	394	curatio morfus eius	525.
Buccina	110	ab eo morforū vict ^o ratio.	
Buglossum	361	527	
Bulbus esculentus	199	Cannabis	298
Bulbus vomitorius	200	Cantharides	125
Bunion	360	Capnos	355
Buprestis	125.& 499	Capparis	202
Buphthalmos	294	Capræ vngula	121
Butyrum	131	Caprinum iecur	ibidem
Butyri fuligo	ibidem	Cardamomum	10
C acalia	360	Cardamina	175
C cancrys	260	Carduus	222
Cadmia	433	Carpari succus	503
Cæcilie ictus notæ	531.	Cariotæ	92
curatio eadem quæ vi-		Carum	249
peræ morfus			

a s

INDEX.

Cafeus	130	Chamæ	117
Cafia	16	Chamæacte	390
Castanea	90	Chamæcissos	361
Castorium	117	Chamædaphne	369
Catanance	363	Chamædrys	274
Caucalis	181	Chamæleo albus	118
Cedria	70	Chamæleo niger	219
Cedrides	71	Chamæleuce	361
Cedromela	98	Chamæpitys	302
Cedrus	69	Chamæfyce	387
Celticum nardum	12	Chamælea	389
Céchri iēt ⁹ notæ 532. eius		Characias tithymalus	382
remedia	542	Chelidonium	207
Centauriū magnum	216	Chelidonium minus	208
Centaurium minus	217	Chia terra	485
Cepa	185	Chondrylla	178
Cepæa	299	Chryfāthemō 292. &	327
Cera	151	Chryfocolla	454
Cerafia	96	Chryfocome	326
Ceractē iēt ⁹ notæ 533. eius		Chryfogonon	ibidem
curatio	542	Cicadæ	123
Cerui genitale	120	Cicer fatium	159
Ceruinum cornu	124	Cicer arietinum	ibidem
Ceruffa	452. & 507	Cicer fylueftre	160
Cestron	304	Cichorion	178
Chalcitis	459	Cici	381

INDEX.

Cicuta	343.& 503	mnēs i&us virulētos	533
Cimices	119	Conyza	284
Cimolia	485	Corallium	475
Cinis farmentitius	472	Coriandrum	251.& 502
Cinnabaris	455	Coria veteramētaria	121
Cinnamomum	17	Coriarius frutex	91
Cionia	110	Coris	302
Circæa	283	Coronopus	176
Cirfium	358	Cornu cerui	124
Cistus	78	Cornus	100
Citria mala	98	Corruda	173
Clematis	307	Cos Naxia	483
Clinopodium	273	Costus	20
Clymenon	310	Cotonea mâla	97
Cnicus	398	Cotyledon	349
Coagulum	134	Crateogonon	286
Coccum gnidion	390	Crimmon	155
Coccū infectorium	324	Crithmū seu critamō	176
Cochleæ	112	Crocodilion	220
Cœruleus	455	Crocomagma	27
Colchicon	345	Crocum	ibidem
Colligendorum ratio	4	Croton	381
Colocasia	161	Cucurbita	179
Colocynthis	392	Cucumis sativus	179
Colymbades	87	Cucumis sylvestris	372
Communis curatio in o-		Cuminum sativum	250

INDEX.

Cuminū fyluestre	ibi.	Dipsacum	220
Cunila	231	Dipsadis mori ⁹ notæ	532.
Cupressus	68	eius curatio	541
Curmi	154	Dorycnion	339. & 501
Cyclaminus	194	Draba	190
Cyclaminus altera	196	Draco marinus	110
Cydonomeli	419	Draconis marini ictus re	
Cynia	399	media	539
Cynocrambe	ibidem	Dracunculus	196
Cynoglosson	362	Dryini ictus notæ	532. ei ⁹
Cynosorchis	287	curatio	541
Cyparissias tithimal ⁹	384	Dryopteris	397
Cyphi	26	Dulcis radix	216
Cypirus	9	E Benus	80
Cytinus	94	E Ebulum	390
Cytisus	356	Ebur	124
D Amasce napruna	100	Echinus	109
D Damasonion	299	Echion	316
Daphnoides	368	Elaphoboscon	255
Daucus	257	Elaterion	373
Delphinium	ibidem	Elatine	320
Dédroides tithimal ⁹	384	Electrum	73
Deuteria	409	Elclisphacos	234
Dictamnium	233	Elæomeli	32
Dictamnium Cretēse	234	Eleoselinum	253
Diphryges	462	Elichryson	327

INDEX.

Empetron	393	Fagus	90
Ephemeron	346. & 500	Farina crassior	155
Epimedium	313	Fel	143
Epimelis	99	Ferri rubigo	445
Epipactis	355	Ferula	261
Epirotica mala	98	Festuca	365
Epithymum	393	Febrini testes	116
Equisetum	323	Ficus	105
Equorum lichenes	121	Filicula	397
Eretria terra	483	Filix	396
Erica	75	Filix foemina	ibidem
Erinaceus	109	Fimum	145
Erinei	107	Flos æris	440
Erinus	317	Flos salis	469
Eruca	181	Flos punicæ	94
Eruca olerum	125	Flos sylvestris punici ibi.	
Eruca pinorū	125. & 498	Fœniculum	256
Eruum	163	Fœniculum erraticū ibi.	
Eryngium	225	Fœnum græcum	158
Erysimon	190	Fraxinus	72
Erytrodanon	296	Fuligo è myrrha, resina,	
Empatorium	321	styrace	59
Emphorbium	266	Fuligo liquidæ picis	65
F aba	160	Fuligo pictoria	486
Faba ægyptia	161	Fuligo thuris	59
Fax	471	Fumaria	355

INDEX.

Fungi	345. & 508	Glaucium	270
G Agates lapis	479	Glaux	366
G Galactites lapis	480	Gluten piscium	270
Galaxias	ibidem	Glutinium	ibidem
Galbanum	267	Glycyfide	294
Galerita	123	Gnaphalion	283
Galion	350	Gnidium granum	389
Galiopsis	ibidem	Gobius	118
Galla	90	Gramen	317
Gallina	122	Gramen arūdinaceū	ibi.
Gallinæ cerebellum	ibi.	Gramen parnafi	ibidē
Garum	119	Grossi	107
Genitale cerui	120	Gummi amygdalæ	102
Gentiana	213	Gummi cerasi	96
Geranion	283	Cypsum	472. & 508
Geodes lapis	483	H Aematites	477
Gingiberis	192	H Hæmorrhoi ictus	
Gingidion	181	notę 532. ei ⁹ curatio	542
Girh	273	Halica	156
Gladiolus	313	Halicacabon solanū	338
Glans	89	Halimus	76
Glans Iouis	90	Harundo	74
Glans Sardiana	ibidē	Harundo cypria	ibidē
Glans vnguētaria	379	Harundo vallatoria	ibi.
Glastum fatium	209	Hastula regia	198
Glastum syluestre	210	Hedera	206

INDEX.

Hedysaron	289	Hirundines	124
Helcysma	449	Hirudo	512
Helenium	28	Holostium	310
Helenium alterum	29	Hordeum	153
Helioscopius	384	Horminum	288
Heliotropiū magnū	399	Hyacinthus	329
Heliotropiū parū	400	Hydromeli	412
Helleborum album	369	Hydromelon	419
Helleborum nigrū	370	Hydropiper	193
Helxine	320.& 346	Hyoscyamus	334.& 504
Hemerocallis	285	Hypecoon	334
Hemionitis	291	Hypericon	390
Herba Sabina	69	Hypocistis	78
Heriacium magnū	252	Hyssopum	230
Heriacium paruum, ibid.		I Aspis	481
Hippace	131	I Iberis	108
Hippocampus	110	Ibiscum	297
Hippoglosson	362	Ichthyocolla	270
Hippolapathon	168	Idæa radix	323
Hippomarathon	256	Iecur apri	121
Hippophaës	380	Iecur alinum	ibidē
Hippophæston	381	Iecur canis rabidi	ibi.
Hippopotami testes	116	Iecur caprinum	ibidē
Hippofelinon	254	Iecur mergi	ibidē
Hirci barbula	183	Illecebra	348
Hirculus	12	Ilex	90

INDEX.

Indicum	455	Lampsana	168
Inguinalis	359	Lana	132
Intybus	177	Lana cremata	ibi.
Iouis glans	90	Lanaria herba	194
Irio	190	Lappa	365
Iris	6	Lapathum	167
Isopyron	359	Lafer	264
Iudaicus lapis	481	Laserpitium	ibidē
Iuglandes nuces	102	Lathyrus	385
Iuncus	325	Lauer	175
Iuncus odoratus	21	Laurus	71
Iuniperus	68	Laurus Alexandrina	368
Ius piscium	119	Lauri baccæ	71
Ixia	218	Lemnia terra	457
L Abrum Veneris	220	Lens	162
L Labrusca	402	Lens palustris	347
Lac	128	Lentiscus	61
Lac coagulatum	509	Lentiscina refina	64
Lac humanum	130	Leontopelaton	273
Lac schiston	129	Leontopodion	362
Lactis serum	ibid.	Lepidium	203
Lacerta	127	Leptocarya	103
Lactuca sativa	180	Lepus marinus	115. & 511
Lactuca sylvestris	ibi.	Lepus terrestris	115
Ladanum	79	Leucacantha	224
Lagopus	312	Leucanthemon	292

INDEX.

Leucas	274	Lycium	82
Leucoion	285	Lycopsis	316
Lichenes equorum	121	Lygos	86
Lichen	326	Lyfimachia	306
Lignorum marcor	73	M Acer	73
Ligusticum	246	Manæ	118
Ligustrum	77	Magnes	479
Lilium	275	Magudaris	365
Lilium sylvestre	285	Malabathrum	15
Limonion	312	Malicorium	94
Lingua bubula	361	Malua	168
Linozostis	398	Malum	97
Linum	159	Malum Armeniacum	98
Lithocolla	482	Malum cotoneum	97
Lithospermon	295	Malum dulce	98
Locustæ	123	Malum Epiroticū	ibi.
Lolium	157	Malum Medicum	ibi.
Lonchitis	296	Malum orbiculatū	ibi.
Lora	409	Malum Persicum	ibid.
Lotus arbor	99	Malum præcox	ibidē
Lotus Aegyptia	357	Malum punicum	93
Lotus sylvestris	356	Malum sylvestre	ibid.
Lotus urbana	ibidem	Mandragoras	339. & 504
Lupinus	164	Manna thuris	58
Lychnis coronaria	275	Marcor lignorum	73
Lychnis sylvestris	ibi.	Maron	239

INDEX.

Marrubium	277	Metopion vnguentū	49
Marrubium nigrum	276	Milium	156
Mastiche	61	Millefolium	357
Meconium	504	Millepedæ	120
Medica	184	Misy	460
Medica mâla	98	Mituli	III
Medion	313	Moly	243
Medulla	142	Molybdæna	448
Mel	149	Molybdoides lapis	448
Mel heraclion	502	Morochthus	480
Melampfithium	462	Morus	103
Melanteria	460	Mullus	116
Melanthium	263	Mulsum	411
Melia terra	486	Muralis herba	346
Melilotos	239	Muria	469
Melimela	98	Mures	128
Melissophyllon	276	Muris auricula	209
Melitites lapis	480	Mus araneus	127
Melomeli	419	Muris aranei ictus notæ	
Memphites	481	531. eius curatio	539
Mentha	235	Muscus	25
Menthastrum	ibi.	Muscus marinus	351
Meon	8	Mustela	117
Mercurialis	398	Myagron	358
Mergi iecur	121	Myofotis	209
Mespilus	99	Myrica	75

INDEX.

Myrrha	52	Ocimastrum	316
Myrrha Bœotica	54	Ocimum	182
Myrrhis	357	Oenanthe	284. & 403
Myrtidanum	96	Oesypum	133
Myrtus satiua	95	Olea syluestris	86
Myrtus syluestris	367	Oleaster	ibidem
N Aphtha	67	oleę ethiopice lacrima	85
Napus	166	Olei vires	29
Narcaphthon	25	Oleum amygdalinum	33
Narcissus	379	Oleum balaninum	34
Nardi genera	10	Oleum cicinum	32
Nardum Celticum	12	Oleum cnicinum	34
Nardum montanũ	13	Oleũ è gnidio grano ibi.	
Nardinum vnguentũ	51	Oleum hyoscyaminũ	34
Nasturtium	189	Oleum laurinum	35
Natricis ictus notæ	532	Oleum lentiscinum	36
eius curatio	542	Oleum mastichinum ibi.	
Nepeta	235	Oleum melanthinum	34
Nerion	344	Olenm melinum	98
Nitrum	469	Oleum myrteum	35
Nitri spuma	470	Oleũ oliuæ syluestris	30
Nux auellana	103	& 88	
Nux iuglans	102	Oleum omphacinum	29
Nux pinea	60	Oleum picinum	65
Nymphæa	289	Oleum raphaninum	34
O Chra	455	Oleum Sicyonium	31

INDEX.

Oleum sinapinum	34	Osisifragus	123
Oleum styracinum	55	Ostracites	483
Oleum terebinthinū	36	Osyris	366
Oliuæ colymbades	87	Othonna	208
Oloschœnos	325	Quorum natura	122
Olusatrum	254	Qui candidum	ibidē
Omphacium	404	Oxalme	415
Omphacomelites	419	Oxylapathum	167
Onagra	358	Oxymyr sine	367
Onitis	231	P Aederota	223
Onobrychis	300	Præonia	254
Ononis	223	Paliurus	76
Onosma	289	Palma	92
Onyx	III. & 480	Palma elate	93
Ophioscorodon	187	Palma thebaicæ	92
Ophites lapis	482	Panaces Asclepij	245
Opium	331	Panaces Chironiū	ibidē
Opobalsamum	22	Panaces Heracleum	243
Opopanax	243	Pancration	201
Orbiculata mala	98	Panicum	156
Oreoselinon	253	Papauer corniculatū	333.
Origanum	231	& 505.	
Origanum sylvestre	ibi.	Papauer erraticum	330
Ornithogalum	183	Papauer satium	ibi.
Orobanche	182	Papauer spumeum	334
Oryza	156	Pappi	51
		Papy	

INDEX.

Papyrus	74	Phalaris	295
Paralios	384	Pharicon	506
Pardaliâches	342	Phasiolus	163
Paronychia	326	Phœnicobalanus	92
Parthenium	293	Phœnix	322
Passum	406	Phygius lapis	476
Pastinaca herba	247	Phu	14
Pastinaca marina	115	Phycus marinus	352
Pastinacæ marinæ ict ^o no		Phyllitis	278
tæ 531.eius curatio	539	Phyllon	286
Pedicularia	375	Phyteuma	362
Pelecinon	289	Picea	59
Peplis	386	Picis liquidæ fuligo	65
Peplos	ibidem	Pineæ nuces	60
Pepo	179	Pinorū erucæ	125.&498
Periclymenon	311	Pinus	59
Peristereon	328	Piper	191
Persea	108	Piscium ius	119
Perfica mala	98	Pissasphaltos	67
Personata	355	Pisselæon	65
Petasites	ibidem	Pistacia	102
Petroselinum	253	Pityusa	385
Peucedanon	261	Pix liquida	64
Phalangium	278	Pix ficca	66
Phalangij morsus notæ		Plantago	173
530.eius curatio	358	Platanus	72

b

INDEX.

Plumbago	448	Psychotrophon	304
Plumbum elotum	446	Psyllion	336.&502
Plumbum vstum	ibid.	Ptarmica	193
Plumbi recrementũ	447	Pulegium	232
Pnigitis terra	485	Pulegium syluestre	233
Polemonia	308	Pulicaria	336
Polion	279	Puticula	155
Polycnemon	273	Pulmones animalium	120
Polygala	366	Pumex	466
Polygonaton	307	Purpura	110
Polygonon	306	Pygocomon	391
Polypodion	397	Pyrafter	99
Pompholyx	435	Pyrethrum	258
Populus alba	72	Pyrites	477
Populus nigra	ibidem	Pyrorum genera	99
Porrum capitatum	184	Q Vercus	89
Portulaca	172	Q Quinquefolium	321
Potamogeton	352	R Adicula	194
Poterion	222	R Radix	166
Propolis	152	R Radix dulcis	216
Prunus, pruna	100	R Radix sylvestris	167
Pseubobunion	360	R Rana	117
Pseudocasia	16	R Rana palustris	511
Pseudocinnamomum	19	R Ranunculum	203
Pseudodictamnium	234	R Rapum	165
Pforicon	459	R Recondendorum ratio	5

INDEX.

Recrementū argenti	449	Rubus Idæus	320
Resinæ variæ	63	Rumex	167
Resina lentiscina	64	Ruscum	367
Resina liquida è pinu &		Ruta	240
picea	63	Ruta sylvestris	242
Rha	213	S Abina herba	69
Rhamnus	78	Saccharum	150
Rhaphanus	166	Sacra herba	328
Rhaphanus sylvestris	167	Sagapenum	266
Rhaponticum	213	Sal	467
Rheon	ibidem	Salis flos	469
Rhodia radix	323	Salis spuma	468
Rhododendron	344	Salamandra	126. & 499
Rhus	91	Saliuaris	258
Ricinus	381	Saliunca	12
Rosa	81	Salix	86
Rosei pastilli	ibidem	Salvia	234
Rosmarinus	258	Sambucus	390
Rosmarinū corōariū	260	Samia terra	484
Rubeta	511	Samius lapis	ibid.
Rubia	296	Sampsuchum	238
Rubigo ferri	445	Sandaracha	463. & 510
Rubrica fabrilis	457	Sandyx	453
Rubrica Sinopica	ibidē	Sanguinaria	306
Rubus	319	Sanguinaria foemina	307
Rubus canis	77	Sanguis	144

b z

INDEX.

Sanguistauri	509	Scorpij ictus notæ	530.
Sapa	406	eius curatio	538
Sapphirus	481	Securidaca	289
Sarcocolla	269	Sedum magnum	347
Sardianæ glandes	90	Selenites lapis	481
Sardonia	503	Selinusia terra	485
Sarmentitius cinis	472	Semen	155
Satureia	237	Semperuium	347
Satyrion	288	Semperuium minus	348
Satyrion erythronio ibi.		Senecta anguium	115
Scammonia	387	Senecio	391
Scandix	181	Sepia	115
Schistum lac	129	Seps	127
Schistos lapis	479	Seris	177
Scilla	200	Serpyllum	237
Scincus	127	Sertula Campana	239
Scolopendra	114	Serum lactis	129
Scolopendræ ictus notæ		Sesama	157
530. eius curatio	538	Sesamoides	372
Scolymos	222	Seseli	247
Scordion	280	Seseli Aethiopicum	248
Scorodoprasum	188	Seseli Creticum	ibidem
Scoria plumbi	447	Seseli Peloponnense	ibi.
Scorpioides	400	Setanium	99
Scorpius marinus	113	Sicyonium oleum	31
Scorpius terrestris	ibid.	Sideritis	318

INDEX.

Sidion	94	Siligo	155	Sphondylion	260
Siliquæ			97	Sphragis egos	458
Silphium			264	Spina acuta	77
Silurus			118	Spina alba	221
Sylibum			379	Spina arabica	ibidem
Sinapi			188	Spongiæ	474
Sion			175	Spongiarum lapides	482
Sifer			167	Spuma nitri	470
Sifon			248	Spuma falis	468
Sisymbrium vtrunq;			175	Spuma argenti	449. & 510
Sitania			153	Squamma æris	441
Smarides pisces			118	Squāma ex acie decussa	
Smilax	183. & 343. & 503		442		
Smilax aspera			366	Stachys	277
Smilax lævis			367	Staete	50
Smyris lapis			483	Staphis agria	375
Smyrnion			254	Stercus ferri	445
Solanum hortense			336	Stibium	448
Solanum manicum			338	Stimmi	ibidem
Solanū somniferū			ibidē	Stœbe	310
Soncus			177	Stœchas	230
Sorba			100	Stomoma	442
Sory			461	Stratiotes	352
Sparganion			314	Stratiotes millesoliū	ibi.
Spartion			378	Strigmenta balnearum	31
Spatha			93	Struthia cotonea	98

INDEX.

Struhion	194	Thracias lapis	479
Styrax	54	Thunnus	119
Succinum	73	Thus	56
Suillus pulmo	120	Thuris cortex	58
Suillus talus	124	Thuris fuligo	59
Sulphur	465	Thuris manna	58
Sycomorus	104	Thyites lapis	480
Symphyton	309	Thymelæa	389
T Alus suis	124	Thymoxalme	415
Tamarix	75	Thymus	236
Taxus	343. & 503	Tilia	78
Tauri sanguis	509	Tithymali	382
Telephion	210	Tordylion	248
Tellinæ	111	Torpedo piscis	114
Terebinthus	62	Toxicon	506
Terebinthina	ibidem	Tragacantha	224
Terra	483	Tragium	324
Terra fornacum	486	Tragoriganum	232
Testæ	485	Tragos	155. & 325
Testiculus canis	287	Tribulus	311
Teucrion, Teucris	274	Trichomanes	365
Thalassomeli	413	Trifolium	278
Thalicttron	351	Trimestria	152
Thapsia	376	Triphyllon	278
Thelygonon	286	Tripolion	363
Thlaspi	189	Trissago	274

INDEX.

Triticum	152	Vinum anethinū	43 ^r
Tuber	183	Vinum apijtes	419
Tusſilago	281	Vinum aromatites	428
Typha	283	Vinum aſarites	430
V Eneſata	513	Vinum bunites	427
Veneris ſymblic ⁹	349	Vinum calaminthites	428
Veratrum album	369	Vinum catorchites	422
Veratrum nigrum	370	Vinum cedrinum	423
Verbaſcum	353	Vinum cedrites	424
Verbenaca	328	Vinum ceſtrites	427
Vermes terreni	127	Vinū chamædryites	426
Veſparū iſt ⁹ curatio	537	Vinum è chamælaea	431
Veſicaria	337	Vinū chamæpityimū ibi.	
Vetonica	305	Vinum è conyza	428
Viſtus ratio in morſu ra-		Vinum cupreſſinum	423
bioſi canis	527	Vinum cydonites	418
Vimen	86	Vinum daucites	430
Vina marina	417	Vinum dictamnites	427
Vina picata	424	Vinum è flore falis	431
Vina refinata	423	Vinum helleborites	432
Vini natura	405	Vinum hyſſopites	426
Vinum abiegnum	423	Vinum ex iride	429
Vinum abrotonites	428	Vinum iuniperinum	423
Vinū abſintites. 228 &	425	Vinum laurinum	ibid.
Vinum acorites	430	Vinum lentiſcinum	421
Vinum adynamon	410	Vinū mādragorites	432

INDEX.

Vinum marathrites	431	Vinum è satureia	428
Vinum è marrubio	427	Vinū scammonites	433
Vinum melites	418	Vinum scillinum	417
Vinum melitites	410	Vinum selinites	431
Vinum melomeli	429	Vinum stœchadites	426
Vinum è myrrha	419	Vinum strobilites	423
Vinum myrsinites	421	Vinum è sycomoris	422
Vinum myrtites	420	Vinum è Syriaca nardo,	
Vinum è nardo syuestri		celtica, malabathro	429
430		Vinum terebinthinum	
Vinum nectarites	429	421	
Vinum œnanthinum	419	Vinum thymites	428
Vinum omphacites	409	Vinum è thymelæa	431
Vinum palmeum	421	Vinū tragoriganites	427
Vinum origanites	428	Viola alba	285
Vinum panacites	430	Viola purpurea	359
Vinum phthorion	431	Viperæ ictus notæ	531.
Vinū è petroselino	ibi.	eius curatio	540
Vinum picatum	424	Viperinæ carnes	114
Vinum pineum	423	Viscum	270
Vinum è pipere	429	Vitis alba	394
Vinum è pulegio	428	Vitis nigra	395
Vinum resinatum	423	Vitis sylvestris	397
Vinum rhoidites	420	Vitis vinifera	401
Vinum rhœtes	ibid.	Vitex	85
Vinum saluiatum	430	Vlmus	73

INDEX.

Vmbilicus veneris	349	Vng. rosaceum	37
Vnedo	101	Vng. sampsuchinum	40
Vnguentorum ratio	36	Vng. styracinum	45
Vng. abrotoninum	41	Vng. susinum	42
Vng. amaracinum	48	Vng. telinum	40
Vng. anethinum	42	Vngula afini	120
Vng. butyrium	45	Vngula caprae	ibidem
Vng. cinnamominum	50	Vnguis odoratus	111
Vng. crocinum	44	Vrina	148
Vng. cyprinum	45	Vrtica	349
Vng. elatinum	38	Vstio contra venenatos	
Vng. gleucinum	48	ictus	526
Vng. hedychroon	49	Vua	402
Vng. iasminum	52	Vua passa	403
Vng. lirinum	46	Vulpinus pulmo	120
Vng. lilinum	42	X Anthion	365
Vng. malabathrinum	52	X Xyphion	313
Vng. megalinum	49	Xylobalsamon	23
Vng. melinum	39	Xylocinamomum	18
Vng. mendesium	50	Xyris	314
Vng. metopion	49	Z Ea, seu semen	155
Vng. narcissinum	44	Z opissa	66
Vng. nardinum	51	Zytum	154
Vng. ociminum	41		
Vng. œnanthinum	39		
Vng. onychinum	45		

FINIS.

b s

INDEX.

INDEX NOMENCLATIO num, quibus officinae Seplasiariorum, & Herbarij nostri temporis vtuntur.

A		B	
A Cacia	83	Bruscus	367
A Agnus castus	85	Bryonia	394
Agrimonia	321	Buglossa	358
Alcanna	77	C	
Alkekengi	337	C Alamentum	235
Aloë	25	C Camomilla	292
Apium	253	Capillus Veneris	364
Apium risus	283	Caprifolium	311
Aphrodilos	198	Cartamus	398
Arabis	190	Cataputia maior	381
Artichault	222	Cataputia minor	385
Aspergula	271	Cauda equina	323
B		Centinodia	306
B Alsamita	175	Cerefolium	181
B Bardana	355	Ceterach	290
Basilicon	182	Choiri	285
Berberis	77	Coloquintida	392
Berusa	175	Consolida maior	309
Bismalua	297	Cornu cerui	176
Borago	361	Crassula maior	210
Branca vrcina	223	Cucumer asininus	372
		D	

INDEX.

128

D Ragagantum 224

E

E Nula campana 28

E Eupatorium vulgatum 298

F

F Aba inuersa 210

F Filipendula 284

F Flammula 308

F Fumus terræ 355

G

G Allitrichum 288

G Genista 378

H

H Edera terrestris 361

H Hepatica 326

H Herba Iudaica 318

H Herba Simeonis 298

H Herba tetrahil 318

H Hermodactylus 345

I

I Arus 197

I Iringus 225

I Iua arthritica 302

I Iusquiamus 334

L

L Acca 26

L Lapatium 167

L Lappa maior 355

L Lappa minor 365

L Laureola 368

L Lenticula aquæ 347

L Lilium conuallium 346

L Linaria 366

L Lingua hircina 316

L Liquiritia 216

M

M Aluauiscus 297

M Malû granatû 93

M Mastix 61

M Matricaria 293

M Matrifylua 311

M Melissa 276

M Mezreon 389

M Miliun folis 295

M Millefolium 352

M Morfus gallinæ 347

N

N Asturtiû aquaticum

N 175 Nenuphar 289

O

O Robus 163

INDEX.

P		Sicla	17 ²
P apauer cornutū	333	Sigillum Salomonis	307
Papauerrubrum	330	Silermontanum	247
Parietaria	346	Solatrum	336
Perforata	300	Sparagus	173
Perficaria	286	Spelta	155
Pes columbinus	283	Squilla	200
Petroselinum	253	Squinantum	21
Piperitis	203	Stichas Arabica	230
Plantago aquatica	299	Stœchas citrina	327
Polytricon	365	Sumach	91
Prasinum foetidum	276	T	
Pulicaria	284	T Amariscus	75
R		Tapfus barbatus	353
R Esta bouis	223	Terpentina	62
Reuponticum	216	V	
Rostrum porcinum	177	V Ermicularis	348
Rubia tinctorum	296	Vicia syluestris	184
S		Vincam peruinca	307
S Aponaria	199	Virga pastoris	220
Satyrion	287	Vngula caballina.	281
Scariola	177	F I N I S.	
Scrofularia minor	208		

EPITAPHIUM
Ioannis Ruellij, Dionysio
Corronio au-
thore.

Hic situs est, in quo vixit medicina, Ruellus:

In quo naturæ notitia, atque poli.

In quo prima fuit dos, Graiūm vertere scripta

In Latium, ac Latio scribere digna Ioue.

Olim erat affinis, nunc est conuiua deorum,

Premiaq; illa sui grata laboris habet.

NAENIA IN OBITU
RUELLII.

Cesserat è viuis ad celsa Ruellius astra,
Constiteratq; alti clarus in arce patris.
Cum perisset hominem rara Mors, ait, Ecce triumphe
Clamet io, cui cui victima grata cadit.
Vicinus, en nostras toties qui eluserat arteis,
Qui toties mortem vicerat, interijt.
Ast vbi in ore virum versari auditq; videtq;
Hunc magis atq; magis viuere, victa fremit.
Cui Paen, quibus ortus erat mihi redditur astris,
Quemq; putas victum, lina trophaea refert.
Prima, quod olim animas mille atro depulit orco:
Alter, quod moriens nunc quoq; mille rapit:
Nempe Dioscoride Romana per oppida ducto,
Cui toga, cui potior lingua Latina, sua est.
Cetera quid memorem victuri scripta laboris,
Naturam & stirpes, pharmacaq; omne genus?
Non villas, nec equos, nec curam diuitis agri,
Nullaq; vite hominis commoda praterijt,
Quae non tractarit, sapientibus edita Graijs,
Quae non reldiderit, vel meliora suis.
Vtq; mage inuideas, dicam amplius, edidit annis
A mille haud quisquam tanti opus ingenij.

FINIS.

P E D A N I I
DIOSCORIDIS

A N A Z A R B E I, D E

Medicinali materia, libri

primi præfatio,

Ioanne R V E L L I O Sueffionensi
interprete.



V A N Q V A M amicissime
Arce, complures non veterum mo-
do, sed recentiorum quoq; de medi-
camētorum compositione, viribus,
atq; probatione commentati sunt:
nobis tamen nec vanum, nec à ratione abhorrentē
impetum animi ad hoc opus incessisse, tibi ostende-
re tentabimus: quòd eorum nonnulli absolutum ni-
hil ediderunt, aliq; quàm plurima, quæ auditu per-
cunctando didicerant, scriptis tradiderunt. Siqui-
dem Bithymus Iolas & Heraclides Tarentinus, o-
missa prorsus herbarū tractatione, rem sanè quàm
paucis perstrinxerunt. Neq; verò omnes illi de me-
tallicis quicquam rebus aut odoramentis memoriæ
prodiderūt. Crateus autē herbarius, & Andreas
medicus, qui cæteris diligentius hac in parte versa-
ti vidētur, radices multas apprimè vtilis, herbas-
quæ haud quaquā adnotatas, reliquerūt. Verunta-
men

me priscorum subscribere oportet sententijs quos, etsi
 pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen
 impendisse diligentiam constat. Iunioribus minus
 assentiendum: e quibus Iulius Bassus, & Nicera-
 tus, & Petronius Niger, & Diodotus, Asclepiadae
 omnes, medicinalem materiam vernaculam cogni-
 tamq; vulgo, dignam censuerunt, quae ab ipsis lite-
 ris exacte mandaretur: & ut medicamentorum vi-
 res probationesq; cursim complexi, sic nullo experi-
 mento eorum effectus colligentes, inani verò red-
 dendarum causarum studio verba fundentes, alia
 pro alijs scriptitando, rem in acervum congeriemq;
 controuersiarum extulerunt. Siquidem, qui inter
 eos egregius habetur Niger, euphorbium, nascenti-
 tis in Italia, chamaeleae succum esse contendit:
 androsamonq; eandem herbam cum hyperico esse,
 quinetiam aloën in Iudaea fossilem nasci, & ple-
 raque his similia exponit, reclamante euidentia,
 quae prorsus veritati refragantur. Quibus con-
 iectura colligi potest, ea non oculata fide, sed nar-
 ratione potius ab alijs accepisse. In ordine idem
 ipsi aberrarunt, partim eorum discrepanteis nul-
 laq; cognatione coniunctas vireis collidentes: par-
 tim per elementa literarum scripta in ordinem di-
 gerentes, quò facilius memoria manularetur, ge-
 nera & eorum effectus à sua cognatione disun-
 gentes. Nos verò ab iuventute, ut ita dicam, iuuen-
 ta, iungi desiderio cognoscendae materiae allecli,
 permul

Dioscori-
 dis cogno-
 scendorum
 simpliciū
 studium

permultis regionibus peragratis (nec enim nescis nos militare vitam exegisse) tuo hortatu cōmentationē in sex libros contulimus: quod opus tibi dicamus, Aree, animi gratitudine obsequentes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Etenim natura cū in omneis eruditione excultos, tum verò in eos quibus cum tibi eiusdē artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiaē esse soles: in nos etiā aliquāto peculiaris. Enimvero non parum praebet tuae probitatis argumentum, optimi viri Licinij Bassi singularis erga te amicitia: quam vnā nobiscum degentes nouimus, cum mutuam inter vos beneuolentiam & emulatione dignam intueremur. Admonitum autem te velim, eosq; qui in hosce commentarios incident, ne in verbis facultatem nostram aestimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia curam. Etenim plurima visu ipsi exactissime cognouimus: quaedam etiam ex e. i. de qua inter omnes conuenit hīstoria, percunctationeq; rerum apud singulos vernacularum diligenter acceptius. Dabimus igitur operā, vt differēti ab aliis ordine tradito, genera medicinarum viresq; describantur. Quod autem necessaria sit medicamentorum ratio, nemo est fermē qui ignoret. quā dea & toti arti coniuncta sit, vniuersisq; eius partibus efficax administret auxiliū. Quare per medicamentorum compositiones atque mīsturas, & facta in morbis pericula extēdi, & incre-

A

mentum capeſſere poteſt, quàm plurimum confe-
rente ſingulorum medicaminũ cognitione. Quin-
etiam vernaculam familiaremq; materiã cõple-
temur, vt perfectã ſit quæ à nobis relinquetur do-
ſtrina. Verũ in primis curã impendere oportet, vt
ſuis tẽporibus ſingula & demetãtur & recõdan-
tur. certè pro horũ ratione aut valët viribus, aut
euando nulloq; munere funguntur. Serena igitur
cœli conſtitutione demetenda ſunt. Magni ſiquidẽ
refert inter colligendũ, ſi vel ſqualores vel imbres
infeſti ſint: quemadmodum ſi loca, in quibus pro-
deunt, cliuofa, & ventis expoſita ſint et perflata,
frigidaq; & aquis carentia: in his enim locis vi-
res eorum longè validiores intelliguntur. Contrã,
quæ in cãpeſtribus, riguis, & opacis, cæterisq; lo-
cis à vento ſilentibus enaſcuntur, plerunq; degene-
rant, & minus viribus valent: multoq; magis, ſi
non ſuo tẽpore nec opportunè colligãtur, aut ſi per
imbecillitatem intabuerint. Neq; ignorandũ, ſæ-
pe pro peculiari loci natura, aut anni clementia,
maturius aut ſerius adoleſcere. Nonnulla pro-
pria vt, hyeme florent & folia pariunt: quædam

Plantæ, vt bis anno florifera. Quare cui in animo eſt horum
exactè co- peritiã aſſequi, neceſſe eſt eum prima germina-
gnoſcant, tione ſolo emergentibus, adultis & ſeneſcentibus
omni tem- tione ſolo emergentibus, adultis & ſeneſcentibus
pore inſpi, aſſeſſe. Nam qui pullulanti herbæ duntaxat ad-
ciendæ. ſliterit, adultam cognoscere non poteſt: neque qui
adultam tantum inſpexerit, nuper erumpentem
noſ

noscet. Quo fit, ut propter mutatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisque magnitudine, & id genus alias peculiares notas, nonnulli qui olim has rerum varietates non perspexerint, magno in errore versentur. Quae causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, verbi gratia, gramen, quinquefolium, & tusilaginem emittere flores, fructum & caulem negant. Ergo qui sepius ad visendas herbas & earum natales se contulerit, earum cognitionem maximè consequetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex herbae medicaminibus veratri genera, nigrum, inquam, & candidum multis edurare annis: reliqua à trimatu inutilia. Quae verò fruticosa sunt, sicut stachas, trixago, polium, abrotonum, seriphium, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine praegnantia demetantur. flores quoque antea, quam sponte sua decidant, fructus autem, ut maturi decerpantur necesse est: & semina, ubi siccari ceperint, priusquam defluant. Herbarum succus & foliorum elici debet, germinantibus tamen prius cauliculis. Lac & lacryma excipiantur, iuciso per summum adolescentiae vigorem caule. Radices, & linguamenta, corticesve ut recondantur, eximere conuenit eum herbae suis folijs exuuntur. Siccantur etiam expurgatae inibi, locis aspergine non redolentibus: sed quae luto aut puluere sunt obsitae, aqua elui debent. Flores & omnia quae incudum

odore efflant, arculis tiliaceis, nullo situ obductis, reponantur. Nonnunquam charta aut folijs semina, ut perennent, aptè inuoluuntur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, vitrea, aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modò rara non sit, accommodatur: & lignea, præsertim è buxo: sed ænea vasa ocularijs medicamentis liquidisq; & omnibus ijs quæ aceto, pice liquida, aut cedria componuntur. Adipem autem & medullas stagnæis vasis recondi conuenit.

Iris.

CAP. I.



IRIS à cælestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert gladioli, sed maiora, latiora, & pinguiora.

Flores in caule æqualibus inter se spatijs distant, incurui, varij: siquidem candidi, pallentes, *lutei, purpurei, aut cærulei conspiciuntur: quæ diuersi coloris specie, quædam cælestis arcus imago representari videtur. Radices subiacent geniculatæ, *duræ, odoratæ: quæ frustatim dissectæ, in vmbra siccantur, & traiectæ lino recoduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica: & inter has laudatissima, quæ pumila ferè & densa constat radice, frangenti contumax, subrufo colore, *gustu amaro, odore per quàm sincero, ita feruentiore. ut nullum prorsus solum redoleat: quæ dum tunditur, sternutamenta mouet. Secundum locum ha-

bet

ἡμίλινα,
non μέλα-
να.

*σεραῖ, id
est, solide,
*τῇ γένει
πυρωτέρα,
id est, gustu
feruentiore.

bet Africana, cādicans, guſtuq; amara. Teredines in vetuſtate ſentiunt, tūc tamen odoratiores reddi ſolent. Viſ omnibus excaſfactoria, extenuās, cōtra tuſſim efficax: humorū qui aegrē reiciūtur craſſi- tiem digerunt, bilem craſſamq; pituitā ex hydro melite drachmis ſeptem epotæ purgant, ſomnum conciliant, lacrymas ciunt, torminibus medentur. Eadem potæ ex aceto auxiliantur ſerpētium iēti- bus, lienosis, cōuulſis, perfrictionibus, horroribus, & quibus genitura eſfluit: menſes ex vino potæ pellunt. Decoctum earum, ſxminarū fotibus vti- liter imponitur, ad emolliendos locos, laxādaq; in eis venarum ſpiracula, iſchiadicis infunditur, fi- ſtulis ac ſinus carne explet. Radices ex melle glan- dis modo ſubditæ, partus extrahunt: quinetiā co- ctæ & illitæ, ſtrumas, veteresq; duritias emol- liunt. Siccæ quoq; vlcera replent, & cū melle pur- gant: nudata oſſa corpore operiunt: doloribus ca- pitis, cum aceto & roſaceo magna vtilitate illi- muntur. Admotæ cū albo veratro & duabus mel- lis partibus, lēngines & vitia cutis in facie à ſole contracta emaculat: peſſis, malagmatis, & acopis inferuntur. In vniuerſum, magni ad omnia vſus.

ANNO TATIO.

Cenſetur Galanga officinarum. Nec enim Acori genuinam aut faciem aut naturam obtinet, quam vulgus herba- riorum in hoc nomine ſolet indicare.

Acorum.

CAP. II.

Acorum folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum sed obliquum aetas, & summo cespice sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimum est densum, candidum, plenum, carie non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod aspletion dicunt. radici vis calfactoria. De coctū potu urinam cit: prodest lateris doloribus, & iocineris atque thoracis: item torminibus, vulsis, ruptis: lienem absomit, urinae stillicidio & serpentum ictibus auxiliatur, insidentibus ad muliebres affectus iridis modo utiliter imponitur,

* Plinius oculorum caligines succo discutit, antidotis radix aulso habet: ac sic magno usu commiscetur.

Meon.

CAP. III.

Meon, quod Athamanticum vocant, in Macedonia & Hispania plurimum gignitur, Græci qui anetho folijs & caule simile, sed eo crassius. bidam vetu nūm ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsissimi coctis in obliquum rectumq; radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacientibus. Quæ fer facit, ut uesicæ ex aqua, vel trita citra coctionem, præqualis her clusorum renū vesicæq; farctæ vitia potu leniant, ba sit Me urinae difficultati medentur, stomachi inflationes on, non fa discutunt. Torminibus, affectæ vuluæ, articulorū cile q̄s con discutunt. Torminibus, affectæ vuluæ, articulorū iecerit, doloribus, atq; fluxionibus pectoris, trita cū melle

in eclegmate auxiliatur, sanguinē per menstrua pellunt, de sessionibus feruefacta: infantibus autē illita imo vētri, vrinas mouēt: quod si plus quam deceat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

Cypirus.

CAP. II II.

Cypirus, quē aliqui erysiceptrum, vt aspalathum appellant, folia fert porraceis proxima, sed longiora & exiliora: caulem odorati iunci, cubitalem aut maiore, angulosum, in cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur: radices, quarum in medicina est vsus, coherentes inter se, oleis oblongis similes: aut rotundae, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cultis enascitur. Optima est grauisima, densa, fractu cōtūmax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi, qualis est Cilicia, Syriaca, & quae à Cycladibus insulis petitur. Huic calida vis inest. Venarum spiracula laxat, vrinam ciet, ad calculos aquamq; subter cutem vtilissimē bibitur, aduersus scorpionum ictus remedio est, perfrictionibus vuluae, & praecclusionibus fotu prodest, pellit menses. Contra vlcera oris etiam si depascent vorenq; farina eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, & vnguentorum spissamentis bene adijci solet. Aliud cypiri genus tractunt in India nasci, gingiberis effigie, quod māducatum croci vim reddit, gustu amaro sentitur, & illitū praesentē psilothri vim exhibet.

Cardamomum. CAP. V.

Cardamomum optimum est, quod ex Coma-
gene, Armenia, Bosphoroq; deuehitur: in In-
dia quoq; & Arabia prouenit. Eligi debet plenū,
frangenti contumax, occlusum, fractumq; (quod
enim huiusmodi non est, exoletum iudicatur) &
gustū acre, subamarum, & odore caput tentans.
Excalfactoriam vim habet, potumq; ex aqua fa-
cit ad comitiales, Ischiadicos, tussēs, neruorum re-
solutionem. Item ad rupta, vulsa, tormina: latus
ventris tineas excutit. Ex vino autē potū, renibus,
difficultati vrinae, à scorpione ictis, neque non o-
mnibus venenū vibrantibus, auxilio est Cum cor-
tice radicis lauri epota drachma calculos commi-
nuit, partus suffitu enecat, scabiem ex aceto illitū
adimit. Et ad vnguentorum spissamēta additur.

Nardum. CAP. VI.

Duo nardi genera: vnum Indicum, alterum
Syriacum appellatur, non quòd in Syria
proueniat, sed quòd montis in quo oritur, pars
vna ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex
hoc Syriaci genere præcipuum est recēs & leue,
largam gerens comam, flauum colore, perquā
odoratū, ac cyperum redolens, breui spica, ama-
ro sapore, linguam siccante, quod diu in sua odo-
ris gratia permaneat. Ex Indicis autem nar-
dum quoddam Gangitis vocatur, à fluuio Gāge,
apud quem enascitur, montē præterfluente: quod
gens

genus ob multam loci, in quo prodit, viginem, viribus infirmius est, atque procerius adolescit plures ferens spicas ab vnica radice comosas, vnaq; conuolutas, ac grauiters olentes. Mōtanum autem odoratiū, spica breui ac mutila, odore cypero vicino, ceteras habens Syriaci clotes. Est & genus quoddam cui Sampharitico nomen locus induit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, candiore interim medio caule, hircorum virus supra modum redolēte: quod improbat. Madefactum vendi solet: quod vitium ex eo deprehēditur, quod candida sit spica, & squalida, & nulloq; puluere obsita. Adulteratur stibio cū aqua aut palmeo vino, inspissationis pōderisq; causa inspirato. Intueri autem oportet si lutum radicibus infideat, & χονῦ, id incerniculo puluerem excutere, eluendis manibus est, et quod vtilem. Vim habent excalfactoriam, & exiccant-natiua caccantem. Vrinam mouent, alium potu sistūt, vultus reat lanuue profluvia, saniemq; apposita supprimūt. Nau gine. se ex aqua frigida auxiliātur, & stomachi ro- sionibus, inflationi, iocineri, regio morbo, renum vitijs. Aquæ autem incocta fotu ad in se ssum, vultus inflammationibus medentur: ad glabras oculorum genas valent: siquidem eas ad densiorem pilum reducūt. perfusis humore corporibus inspar guntur. Miscentur antidotis, & in fictili nouo nō picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum vino in pastillos coacta.

Nardum Celticum. CAP. VII.

Hirculus
herba.

Celticum nardum nascitur in Liguria alpibus, salunca patrio nomine appellatum, prouenitq; in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido florem luteum. Cauliculorum & radicū duntaxat vsus est, et odoris suauitas: vnde pridie fasciculos aqua abluere expedit, & exēpta terra paulo solo atq; humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidem vtile, cum aceroso alienoq; propter humoris vim, nō excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus vocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio, namq; herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neque amara, neq; odorata, vti verum nardum est. Itaq; radices atq; cauliculi, abiectis folijs triti secernuntur, vino excipiuntur, digeruntq; in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asservari debent. Laudatur maximè recens, iucūdi odoris, radice numerosa coherens, plenum, nec fragile. Ad eadē, quæ Syriacum pollet: sed vehementius urinam cit, & stomacho vtilius est. Inflammationibus iocineris, et felle suffusis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absinthij decocto bibitur: item aduersus li. nem, renum & vesicæ vitia, & venenatos ictus, ex vino. Additur in malis gmata, potiones, & calfacientia vnguenta.

Mon

Montanum nardum. CAP. VIII.

Montanū nardū, quod ab aliquibus thylactis, & niris appellatur, in Cilicia, & Syria nascitur, surculo et folijs eryngio similibus, minoribus, minimè tamen spinosis, asperisq;. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, cœu hastulæ regiæ, sed longè gracilioribus, & longè minoribus. Neq; caulem, neq; fructum, neq; florem profert. Adeadem ad quæ Celticum efficax.

ANNOTATIO.

*Minoribus]. Fuchsius in opere de Stirp. maioribus legendū suspicatur. Plinius, qui hinc omnia mutuatus est, mollioribus habet: quod sanè vtrunq; herbæ, quàm aptissimè quadrat.

*Cytino hyoscyami.] Id est, florū hyoscyami, qui veri cytini, quem domesticæ punicæ florem esse nouimus, aliquam exprimit effigiem, vt in eius descriptione author Dioscorides.

Asarum.

CAP. IX.

Asarum, quod & ipsum aliqui syluestre nardum appellant: hederæ folijs *minoribus multò, rotundioribusq;, floribus *cytino hyoscyami similibus, purpureis, inter folia proxime radicem emicantibus, odoratis, in quibus semen acinosum. [Cauliculos habet angulosos, asperos, Deest in & molles] radices numerosas, geniculatas, te- Græco. nnes.

nues, obliquas, gramine non dissimiles, longè tamen graciliores: odoratas, excalfacientes, & quæ linguam vehementer mordet. Excalfactoriam vim habet: urinam cit, hydropicis. & vetusto coxendicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsa potæ, menses trahunt, & veratri albi modo purgant. In vnguenta additur. Umbrosis montibus prou nit, sed plurimum in Ponto, Phrygia, Illyrico, & Italiæ Iustinensi agro.

ANNOTATIO.

*Maiores] Rectius fortè minoribus legas, vt Ruellius quoque monuit. Flores siquidè Valerianæ nunc dictæ, quam Phu esse omnes ferè suspicatur, Narcissum effigie expressissimè quidem referunt, eo tamè longè sunt minores: ni fortè soli diuersitati id imputandū censeas.

Phu.

CAP. X.

*hippose-
lmi. **P**Hu, quod & aliqui syluestre nardum appellant, nascitur in Ponto, folio *olusatris, aut elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, læui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto, floribus narcissi proximis, *maiores, teneriores, & ex albicante purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo villosa in nigri veratri aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem contextus, flavescentibus, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardum

amis

amulantibus. Excalfacit, vrinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem præstare potest. ad lateris etiã dolorem efficax, menses cit, antidotis inseritur. Adulteratur radice rusci ammixta: sed maleficiũ deprehenditur: quoniam hæc dura est, & frangenti contumax, sine vlla odoris gratia.

Malabathrum.

CAP. XI.

Malabathrum arbitrantur aliqui esse Indi ci nardi folium, falsi quadã odoris cognitione: permulta enim nardum olent, quemadmodum plu, asarum, niris. secus autem res se habet. Nanq; malabathrum folium sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transsinitur, & siccatur reconditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore aquis, humi aridis fruticibus vri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recēs, ex candido nigricans, integrũ, nec fragile, odore caput feriēs: quod diu in sua vi odore permaneat, & nardũ sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmis verò & minutim contusum, præsertim si cariosum virus olet, vitiosum est. Eadem nardo sortitur vires, sed efficacius omnia præstat. Vrinam vehementius ciet, ac stomacho magis prodest malabathri vis. Lippitudinibus, inflammationibusq; tritũ & in vino feruefactum cõmode illinitur: subditũ linguæ, oris halitũ & suauitatẽ cõmendat. Vestium quoq; odorẽ in-
terpo

terpositum seruat, & ab erosione tuetur.

ANNOTATIO.

Officinis falso Cinnamomum hodie dicitur. Est enim earum Cassia, non quam hic Dioscorides, cui, sicut & alijs veteribus, fuit incognita, sed Actuarius libro de Composit. medic. depinxit.

Cassia.

CAP. XII.

Cassia, cuius cōplura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiā gignitur, crassi corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fuluescēs, pulchri coloris, coralli amula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordēs & * cum aliquāto feruore astringens, aromatica, vinoso odore cuiusmodi est, quæ ab incolis, achi appellatur, ab Alexandria negotiatoribus, daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricās, Zigir cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundū locū tenet antedicta. Tertia, cui Museletico blasto, id est germi, cognomē est. Reliquæ viles, et quæ * aphemū dicitur, nigra, * Græcus in suavis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ darca, alyphemō & citto vocitatur barbaro nomine. Similior huic est pseudocassia, quā ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cū nec acris, nec odorata sit, haren- temq; medulla corticē habeat. Inuenitur etiā lata quædā fistula, mollis, lenis, surculosa, quæ antedicta præfertur. Dānatur canticās. scabra, hirci-
num

* μετὰ
πολλῶν. i.
cū multo.

* Græcus
αλφημῶ

hum virus redolens, & quæ tenui fistula, & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, urinam ciedi, siccandi, & leniter astringendi. Conuenit ad medicamēta oculorum, quæ præstandæ claritatis gratia cōcinnantur, & ad malagmata. Lentiginēs tollit cū melle illita, mēses trahit, cōtra vipera rū ictus pota auxiliatur, aduersus intestinas inflāmatiōes omneis et renū vitia, pota proficit. Fœmīnis in solio desidētibus, aut suffimentis, prodest ad dilatationē vuluæ. Ea duplo pōdere medicamētis mixta, cinnamomi vicē supplet, si ipsum desit: nā eosdē effectus præbet, ad plurima perquā vtilis.

Cinnamomum. CAP. XIII.

Cinnamomi genera plura, patrium sibi nomen vendicantia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod cassia, cui Mosyliti nomen est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex vinoso in cinereū vergens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquā iucundè, olens. Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate constat. Inuenitur enim cum optimo, eoq; quod peculiare est, odor rutæ aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordens, & cum calfactione quadantenus salsum, quod nō citò confricanti asperum, aut frianti lanuginosum, læuibus, tamen intervodijs appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice surculum. facilis est huiusmodi probatio: nanque fragmenta miscelanea

lanea quaedam esse videntur. Quæ autem melius
 spirant, suo halitu cum nares primū consulūtur,
 olfactū expleant, deterioris dignotionē impediūt.
 Est etiam montanum, crassum, pumilum, fulue-
 scens admodum. Tertium à Mosylitico, perquā
 suauiter olet, nigrū, fruticosum, paucis interceden-
 tibus geniculis. Quartum, fungosum, candicans,
 aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnam ha-
 bens radicem, quæ cassiam planē representat.
 Quintū genus, odore nares feriens, subrufum, &
 cortice fuluæ cassiæ simile, tangētī firmum, minus
 neruosum, densa radice firmatum. Iis quæ thuris,
 cassiæ, myrti, aut amomi odorem spirant, minus
 suauitatis inest. Deligito scabrum, albū, rugosum:
 at leue, & lignosum circa radicē, ut inutile reij-
 cito. Est etiamnum simile aliud, cui pseudocinna-
 momo cognomen est, vile, inualidi odoris, soluta-
 rumq; virium. Vocatur etiam Zingiber, cum tā-
 men sit xylocinnamomum, præbens quandam cin-
 namomi faciem. Est autē lignosum cinnamomū,
 sarmenta longa robū aq; ferens, odore longē cin-
 namomo inferiore. Sunt qui xylocinnamomum, à
 cinnamomo genere differre dicant, quod à natura
 eius abhorreat. Cinnamomum omne excalfacit,
 emollit, & cōcoquit, vrinam ciet: tā mēses, quā
 partus potū aut ex myrrha impositum pellit, con-
 tra bestias, quæ virus ei aculantur, venenaq; con-
 uenit: caliginem pupillis oculorum obuersantem
 discutit.

discutit, crassitiem extenuat, lentigines, & vitia cutis in facie ex melle illitum detergit: cōtra tusses, defluxiones, aquam subter cutem fusam, renū vitia, & vrinae difficultatem efficax est, vnguentis pretiosis inseri solet: & in summa, magni ad omnia vsus. Tritum vino excipitur, vmbraq; siccatum, quò diutius eduret, reconditur.

[Est & quoddam cinnamomum, quod aliqui pseudocinnamomum appellant, perquam denso atq; crasso sarmento, longè tamen inualidius cinnamomo, & odore, & gustu.]

Desunt in Græco.

Amomum. CAP. XIII.

Amomum exiguè fruticat, ex ligno se cōuolvens in racemi modum, flore, ceu candidæ violæ, paruo: folijs & vitis allæ similibus. Lauda- & bryonia. tur, quàm maximè Armeniacū & fuluo auri co- & χρυσίον lore, ligno subrufo, valde odorato. Medicū, quoniā τὸ χρόον, id in campestribus, & aquosis erascitur, infirmius est, colore esse constat. Est autē magnū, subuiride, tactu te- aurum iminerum, frutice venoso, odore origani. Ponticum tans. verò subrusum, parū, fragile, racemosum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, candidum vel subrubrum, quod nec astrictum cohæreat, nec conuoluatur, sed solutum diffundatur: seminis plenum, vuis paruis simile, graue, valde odoratū, modò tariem nō contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Vim habet calfaciendi, astringendi, exiccandi. Somnū al-

licit, & illitum fronti, doloris sensum aufert, inflammationes, & meliceridas concoquit, discutitq;: inuat quos scorpius percussit, ex ocymo illitum, & podagricis confert, inflammationes oculorū, viscerumq; lenit ex: vna passa, ad vuluarū vitia in pēsis, aut in sessionibus vtile est. Decoctū iocineri, renibus, podagrae, potu conuenit. Antidotis immiscetur, & pretiosissimis vnguētis. Adulteratur amomum herba simili, quæ amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi probationibus fragmēta fugienda sunt: eligēda autē, quæ ab vna radice integros surculos emittunt.

Costus.

C A P. XV.

PRæcellit Arabicus, candidus, lenis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi vendicat Indicus, lenis, vber, vt ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abundē plenus, densus, aridus, à teredinibus non erosus, sine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei excafactoria, vrinā ciet, menses pellit, vitys quæ vuluam malè habent, tam impositu quàm fotu & suffitu auxiliatur. Contra viperarū morsus sextantem bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesq; ex vino & absinthio: venerem ex mulso stimulat, latas ventris tēpeas ex aqua pellit, horroribus ex oleo, ante febrium

brum acceſſiones, & neruorum reſolutionibus oblitur: vitia cutis in facie, cum aqua vel melle illitus, emendat. Additur in antidota & malagmata. Sunt qui admiſtis helenij comagſni præduris radicibus, adulterent, quod deprehenſu facile eſt: ſiquidem neq; guſtu feruet he lenium, neque validum odorem vibrat, vt caput tentare poſſit.

Odoratus iuncus. CAP. XVI.

Odoratus iuncus, in Africa & Arabiana ſcitur. Laudatiſſimus ex Nabathæa: pro-^{Officinis} ximus Arabicus, quæ aliqui Babylonij cognomi-^{ſquiman-} nant, alij teuchitin. peſſimus ex Africa, Eligendus eſt rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmētis, qui manibus confricādo roſæ odore emittit, igne & mordacitatis ad linguā. Floris, culmorum, radicisq; eſt uſus. Vim vrine ciūde habet, menſes pellit, diſcutit inflammationes, caput aggrauat, modicè aſtringit, cōminuit, excoquit, ac venarū ſpiracula laxat. Flos eius in potu utilis ſanguine reijcentibus, doloribus ſtomachi, pulmonis, iocineris, & renū, miſcetur antidotis. Radix aſtringentior eſt: ideo faſtidys ſtomachi, hydro- picis, conuulſis, drachma vna cum pari pondere piperis, per dies aliquot datur. Decoſtum vuluæ inflammationibus, ad deſidentiū fatus, vtile eſt.

Calamus odoratus. CAP. XVII.

Calamus odoratus in India naſcitur: melior eſt fuluus, denſe geniculatus, & qui

assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & astringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus. Urinam potu ciet. quare cum graminis aut apij semine coctus, in aqua subter cutem fusæ morbo, renum vitis, stillicidio urinae, ruptisq; commodè bibitur: menses & potu & appositu pellit. tussi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundinem fumo: ad muliebres infusus decoquitur, & clysteribus imponitur Suffusionibus, malagmatibusq; odoris gratia commiscetur.

Balsamum. CAP. XVIII.

*Marcel-
lo locus
hic suspen-
sus,

Balsamum, arbor & alba viola, lycii, siue pyracanthæ magnitudine conspicitur. Folium ruta proximum longè candidius, perpetuò virens: in Iudæa solis quadam valle & Aegypto nascens. his differens modis: scabritia proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, theristum vocant, quasi demessile: fortassis quoniã ob gracilitatē facile demetatur. Aestivis sub ortu Canis ardoribus, arbor vnguibus ferreis inciditur, manatq; è plaga succus, quem Opobalsamum vocant: sed tam exiguo stillatis, ut annis singulis, ne plures quidē quam seni septē mve congij cogantur, inibiq; pōdus duplo rependitur argento. Succus probatio est, ut sit recēs, validi odoris, syncerus, nō ad acorē vergēs, dilui facilis, levis, astringēs, ac modicè mordēs gustu. Sed variè vitatur, misto
ab

ab aliquibus terebinthi, cypri, lentisci, balani un-
guento: itē susino, metopio, melle, aut Cypria cera
liquida. quod maleficiū facile deprehēditur. Nāq;
merus in laneam vestem fusus, neque maculam
facit, neque si eluatur notam relinquit: vitiatus
autem inhaeret, & lac instillatus coagulat, quod
adulteratus nō efficit. Quinetiā syncerus in aqua
aut lacte celerrimē liquatur, coloreq; lacte scit: vi-
tius verò olei modo innatat, se cōvoluens, aut in
stellæ modū diffundens. Syncerus senescēs crasse-
scit, deteriorq; redditur. Hallucinatur, qui aqua
concretū pessum ire, & ad ima sidere arbitratur,
postea dissipatū supernatare. E ligni genere, quod
xylobalsamum vocant, probatur recēs, sarmento
tenui, fuluū, odoratū, quadāmtenus opobalsamū
spirans. Necessarius etiam seminis erumpit vsus,
quare eligatur flauū, plenū, grande, ponderosum,
mordens gustu, feruens in ore, modicē opobalsamū
olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod à
Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitu-
dine, inanitate, virium ignauia, sapore piperis.
Efficacissima vis inest succo, & quā maxime cāl-
faciens: abstergit quæ tenebras oculorum pupil-
lis offundunt, medetur perfrictionibus vuluæ cum
rosaceo cerato appositus: menses quoque, secun-
das & partus extrahit, horrores illitu discutit,
vlcera sordida expurgat & cruda concoquit, vri-
nam potu ciet, agrē spirantibus prodest: datur

in lacte contra aconitū haustum, aut serpentium
ictus: miscetur acopis, malagmatis, & antidoti.
In summa, præcipua authoritas succo, secunda se-
mini, minima ligno. Semē commodè potui dati,
doloribus lateris, pulmonum vitijs, tussi, ischiadi-
cis, comitialibus, vertiginosis, orthopnoicis, urinæ
difficultati, torminibus ac serpentum morsibus
ad muliebres suffitus perquā vtile est: vuluan-
aperit in defensionibus balnearum decoctum, &
humorem euocat. Lignum easdem habet vires
aliquanto minores. Ex aqua potum cruditatibus
torminosis, vulsis, venenatorum ictibus opitula-
tur, urinam cit, ad capitis vulnera cum sicca Ir-
conuenit, squammas ossium extrahit, & ad vn-
guentorum spissamenta additur.

Aspalathus.

CAP. XIX.

*^{ξυλώδης} **A**spalathus, alijs erysiceptron, frutex est
*^{surculosus} surculosus, multis spinis horres. nascitur
id est, ligno in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula:
sus. quo ad vnguentorū spissamenta pigmetarij vtun-
tur. Optimus est grauis, detracto cortice rubens,
aut in purpurā vergens, densus, odoratus, gusta-
tu amarus. Est & alterum genus candidū, ligno-
sum, sine odore: quod deterius habetur. Vim calfa-
ciendi cum astrictione obtinet. vnde decoctum cū
vino ad tetra oris vlcera colluenda conuenit, ad
nomas genitalium, et sordida vlcera infunditur:
subiectum in pefso, partum extrahit, aluum sistit

eius

eius decoctum: & sanguinis reiectionem potu co-
hibet, vrinae difficultatem inflationesq; discutit.

Muscus.

CAP. XX.

Bryon, id est muscus, à quibusdā splachmō ap-
pellatur: in cedro arbore, populo alba, et quer-
cu inuenitur. Optimum est cedrinum, proximum
populneum: in quo genere cādidum & odoratius
præstat, nigricans improbatur. Astringendi vim
habet. Decoctū insidentiū vuluis vtile: vnguentō ha-
lanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur: thymia-
matum, acoporumq; compositionibus conueniens.

Agallochum.

CAP. XXI.

Agallochum, lignum est quod ex India at- Putatur li-
qua Arabia deportatur, thuiæ ligno simile, gnū aloës
maculatū, odoratum, gustu astringens, cum qua- officinarū.
dam amaritudine, cute verius quā cortice vesti-
tur, aliquantulum versicolore. Manditur, aut de-
cocto os colluitur, commendandi halitus gratia.
Sudores arcet toto corpori insparsum: pro thure
ad suffimēta substituitur. Radix epota drachmæ
vnius pondere, humida stomachi vitia, & imbe-
cillitatem, feruoremq; mulcet: si lateris, iocine-
risve dolor excruciat, si dysenteria, aut tormina
infestant, ex aqua bibere prodest.

Narcaphthuni.

CAP. XXII.

Narcaphthum ex India defertur, corticosum,
simile sycomori libro: quod iucundi odo-
ris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis com-

B 4

positis: constrictionibus vuluæ suffitu prodest.

Cancamum. CAP. XXIII.

Videtur **C**ancamum Arabici ligni lacryma est, myrr-
quibusdam **C**rrha quodāmodo similis, virosi gustus, quam
Lacca offi- ad suffimenta vsurpant. Vestes eo, additis styrace
cinarum. & myrrha, suffiuntur. Vim proditur obtinere
extenuandi obesos, si ternū obolorū pondere ex
aqua, aut mulso aceto plusculos dies ebibatur, lie-
nosis datur, comitialibus, & suspiriosis: menses cū
aqua mulsa pellit, oculorum cicatrices confestim
emendat, vino madefactū medetur eorundē he-
betudinibus, aduersus gingiuas humore pragnā-
teis, doloreisq; dentium, non aliud efficacius.

Cyphi. CAP. XXIII.

Cyphi odorati suffimenti compositio est, dica-
ta dñs, qua abundē Aegyptū sacerdotes vtū-
tur. In antidota misceri solet, suspiriosis datur in
potu. Permulta componendi rationes, quarum
vna hæc est: Sumito cyperi dimidium sextarium,
cum pari baccarum iuniperi adultæ modo: vuæ
passæ pinguis, exemptis vinaceis, minas duode-
cim: resinæ repurgatæ minas quinque: calami &
iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum mi-
nam: myrrhæ duodecim: vini veteris sextarios
nouem, cum duabus mellis minis: vuam pas-
sam detractis vinaceis tusam, cum vino & myr-
rha subigito: cætera tusa & cribrata adijcito, die
vno humorem combibere finito, dein mel coquito
duna

dum sibi glutinis asciscat crassitudinē, eliquatam resinam accuratē permisceto cū reliquis diligenter contritis, & in fictile vas recondito.

Crocum.

CAP. XXV.

CRocum, optimum in medendi usu Coryceū, crecens, & boni coloris, paulum candidi generis in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum, à quo detractū est nihil, quod madefactum manus inscit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacre: sin huius generis non est, aut vetus, aut humore perfunsum creditur. Secundus locus datur Coryceo, ē tractu Lyciæ contermino. Tertius Lycio, ē mōte Olympo. dein ex Aegibus Aetoliæ. Cyrenaicū & Centuripinum inter Sicilica omniaviribus infirmius est. Omnium natura oleracea. Itali tamē ob succi copiam, & coloris venustatem, tingendis mortarijs dicauerunt: quibus de causis magno venditur. Vtilissimum in medicina quod antē descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuatque etiam sapæ subtilu: contrita, quò pondus adiciatur, simul argenti spuma, aut plumbagine: sed maleficiū declarat insidens puluis, præsertim si defrutum in odorando subolet. Thessalus ipsum tantum odoratum esse voluit. Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis. Proculdubio vim coquendi, emolliendi, atq; substringendi habet: urinam cit, elegantem colorem præstat, qui ex passio

B 5

biberint crapulam non sentient: oculorum fluxiones illitum cum humano lacte, cohibet: additur in potiones, quæ interaneorū causa temperantur: ad vuluæ etiā sedūq; cataplasmata, vtiliter inditur: venerē stimulat, vergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet, auricularijs collectionibus vtile. Quò facilius conteratur, in calido fictili sole siccari oportet, celeriterq; versari. Vrinam mouet radix ex passo pota. Fit etiā expressis vnguenti crocini odoramētis, & in formas digestis, quod crocomagma vocant. Optimū est odoratum, modicē myrrham olens, graue, nigrum, ligni expers, laue, subamarum, quod madefactū croci colorem reddit, gustatumq; vehementer dentes ac linguā

* Rectius inscit, * multis durans annis, quale est quod a Sy Marcellus ria defertur. Habet suas vires ad delenda quæ aliquot ho liginem oculis obuersant: urinam cit, calfacit, con ras perma coquit, & emollit. vires croci proportionē quadamtenus repræsentat, quandoquidem plurimam croci partem sibi crocomagma vendicat.

Vulgò Enula capana.

Helenium.

CAP. XXVI.

* ἐκ ὀφθ- H Elenium folia habet verbasci angustioris folij, asperiora, oblonga: caulem quibusdam vōis, ἡδὲ in locis nō emittit: radicē subalbīdā, interdū sub- σκίοις. rufam, odoratā, subacrem, vegetam, magnam, ex ad est, in qua agnatæ propagines liliorū aut arimodo serun mōtosius ac tur. * Montibus in vmbrosis, siccoq; solo prouenit. opacis. Foditur æstare radix, eparticulatimq; dissecta sic calur.

catur. Potum radicis decoctū menses & vrinas
ciēt. ipsaq; in eclegmate ex melle prodest tussi, or
thopnoea, ruptis, conuulsis, inflationibus, & ser
pentium morsibus. In summa excalfaciens. Folia
ex vino cocta vtiliter ischiadicis illinuntur. Hele
nium stomacho vtile in passo conditum: siquidem
salgamarū paululum siccata radice, mox de
coctam, & frigida aqua madefactam, in sapam
coniūciunt, & ad vsus recondunt. Trita potaq; ad
cruentis excreationes efficax est. Alterum helenij
genus in Aegypto gigni Crateuas tradit: herba
est cubitalibus ramulis, serpilli modo per humum
repētibus. folijs lenticulae circa ramos, sed longiori
bus crebrisq; radice pallida, digiti minoris crassi
tudine per ima tenui, supernè crassiore, cortice ni
gro. Nascitur in maritimis collibusq;. Radix vna
in vino epota, contra serpentū ictus auxiliatur.

Omphacinū oleumq;. CAP. XXVII.

Oleum quod ex immaturis oliuis exprimi
tur, ad multos vsus recte valentibus accom
modatissimum: omphacinum id appellatur. Præ
stat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale
vnguentorum compositionibus idoneum intelli
gitur. Stomacho vtile est quod astringat: gingi
uas contrahit, dentes firmat, si contineatur in ore,
sudores cohibet, & quò vetustius ac pinguius, eò
ad medicamenta aptius est. Et (vt reliqua in com
mune dicantur) omne oleum calfacit, emollit ven
trem,

trē, à perfrictionibus corpus tuetur, ipsumq; prōptius ad obeūda munera reddit, aliū emollit, ulcerantiū venenorū vires permistū hebetat, contra venena datur, assidue potū redditumq; vomitionibus, soluit aliū heminae mensura cū pari ptisanæ succo aut aqua potū, ad tormina calidū simul decocta ruta tribus sextarijs in potu datur, vētris animalia pellit, idem maximē ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit & vehementius discutit, oculorū claritati subtilū confert. Si vetustū nō sit occasio, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, vt vetustatē representet.

Oleum filuestris Oliuæ.

CAP. XXVIII.

Oleum quod syluestres oliuæ fundunt, vehementer astringit, & ad sanorū vsus secundum sibi locū vendicat. In doloribus capitis vtiliter pro rosaceo substituitur, sudores arcet, defluētes capillos inhibet, furfures, vlcera capitis manantia, scabiem, lepr. usq; abstergit: tardius curationē sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Candidum oleum fit hoc modo: Album colore, nec anniculo vetustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centum heminarum mensura, & sub solem media quoq; die concha refunditur: ex altoq; demittitur, vt assidua deuolutione, icūq; agitatum respumet: octaua die fœnum græcū mundū quinquaginta denariorū pondere, calida aqua made-

fact

factum donec emolleſcat, in ſupradictū oleū deij-
citur, ita ne extillet aqua: poſtea tede præpinguis
piceæ, aſſulatiſſimæ ſæ æquale pōdus adiicitur, &
transactis octo diebus, oleū concha mouetur. Vbi
candorem contraxerit, in vas nouum veteri vino
aſſuſum recōdi debet, ſubſtratis ſertulæ Campa-
næ corollis drachmas vntecim pendentibus, cum
pari iridis pōdere: ſi minus, rursus ſoli mandā-
dum, & idē munus obeunctū, vſq; dū inalbescat.

Sicyonium. CAP. XXIX.

Sicyoniū componendi ratio hæc eſt: In lebetem
Soris lati ſtanno inductum, funditur olei al-
bi quod crude oliuæ reddiderunt, congius vnus,
aqua ſemicongius: leui id igne coquitur, leuiter
mouendo: at vbi his efferbuit, & ſubtracto igne
refrixit, innatans oleum concha decapulatur, &
adiecta noua aqua conferueſcit, & reliquis vt di-
ximus peractis reponitur. In Sicyonia maximè
fieri conſueuit, Sicyoniū inde accepto cognomine.
Calfactōriam ad quendam vſq; modum vim ha-
bet. Febri ac neruorum vitij prodeſt. ſceminæ ad
commendandum faciei nitorem eo vtuntur.

Strigmenta Balnearū. CAP. XXX.

Strigmenta à balneis calfaciūt, molliunt, di-
ſcutiūt: ad ſedis rimas & cōdylomata illinū-
tur. Illa verò quæ ex palæſtris pulnerē ſibi aſciue-
runt, in ſordis ſpecie redacta, articulorum nodos
impoſita adiuvant: iſchiadicis inſotus aut mala-
gma

gmatīs locū, calida cōmodē sufficiuntur. Deraſæ gymnāſiorū parietibus ſimulacrīs q̄; ſordes, calfaciūt: tubercula, quæ agrē ad coctionē perducūtur, diſſipāt: deſquāmatis & vlceribus ſenū profunt.

Elæomeli.

CAP. XXXI.

IN Palmyris Syriæ, quod elæomeli vocant, ex quodā caudice manat, oleū melle craſſius, ſapore dulci. Bilē, cruditates q̄; detrahit, ſextario cum vna aqua hemina dato. Sed qui ſumpſere, torpeſcūt, & viribus deſciuntur: quod minimē vererī oportet, verūm crebro excitare, ne veterno preſſi ſomnos capiet. Fit & oleū ē pinguitudine ſurculorū oleæ: optimū vetus, craſſum, pingue, nō turbidum. Calfacit, priuatim q̄; caliginibus oculorū illinitur: lepras, neruorū q̄; dolores illitum emēdat.

Cicinum oleum.

CAP. XXXII.

Cicinum oleum hoc modo temperatur: Matu-
ri ricinū quavolēs quātitate torrido ſole flaeſcant, & vuarum more inſtrati tantisper inſolantur, dum veſtiēs cortex fractus decidat. Caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter runditur: poſtea in lebetem ſtanno illito, qui aquam habeat, demittitur, ſubiecto q̄; igni ferueſcunt: & ubi inſitum prorsus humorem reddiderunt, ſublato ab igni vaſe, innatans oleum concha tollitur, & reconditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit uſus, longē ſecus fieri ſolet. Nam repurgatos ricinos mola mandant, & accurate molitos per
ſpora

sportulam torculo exprimūt. Tum quidem ematuruerūt ricini, cum cōtinentibus orbiculis exuuntur. Ad psoras, & vlcera capitis manantia valet: prodest sedis inflammationibus, vuluis conuersis atque praelusis: item iudecoris cicatricibus, & aurium doloribus: emplastra efficaciora reddit additum, potu aquam aluo extrahit, ventris animalia pellit.

Amygdalinum. CAP. XXXIII.

AMygdalinum oleum, quod aliqui metopiū vocant, hoc fit modo: Semodius ex amaris nucibus repurgatis siccatisq; in pila ligneo pistillo leniter tūdatur in offas, aqua quæ ferbuerit sextarius adijcitur, & vbi dimidia hora humorem hauserit, vehementius quàm antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitis hæsit, cōcha excipitur. Pressis nucibus rursum hemina aqua inspergitur, & postquā ebiberint, idem opus proseguendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra vuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundē locorū inflammationes efficax est: vitij renū, calculosis, difficili vrinæ, suspitiosis, lienosisq; proficit: dolores capitis, grauitatē auditus, sonos incertos, tinnitusq; discutit: maculas, & vitia cutis tollit è facie, & eam erugat cū melle, radice lilij & Cypria cera aut rosaceo cerato: & oculorum hebetudines emendat, vlcera capitis manantia & furfures cū vino abstergit.

Bal

Balaninum. CAP. XXXIII.

Simili modo fit balaninum oleum, quod repur-
gat maculas, lentigines, varos, & cicatrices
nigras. Aluum soluit, stomacho aduersatur, cōtra
auriū dolorē, sonos, & tinnitus auxilio est, cum
anserino adipe instillatū. Similis sesamini ratio.
Fit etiam ē nuce iuglande oleum, quod caryinum
vocat. Eandem vim habet quam Balaninum.

Hyoscyaminum. CAP. XXXV.

Huoscyaminum sic fit: Semen candidū, recēs
Hac siccum tunditur, & calida aspergitur
aqua, vt in amygdalino diximus. dumq; insola-
tur, siccata, quæ sub manu sunt, partes cū reliqua
massa permisceātur: hoc in ante fieri oportet dum
nigrescat & grauiter oleat: mox pressum atq;
excolatū reconditur. Ad aurium dolores efficax
est, pessis miscetur, ad emolliendū vtile. Fit & ē
grano gnidio purgato & tuso. Vis ei aliū solue-
re potu. Non secus cnicinū oleum temperatur: cui
facultas eadē est quæ factō ē gnidio grano, verū
inualidior. Raphaninum ē raphani semine fieri
solet, ceterorū more. Phthiriasis mala valetudine
contractas tollit, scabritias cutis in facie emēdat.
Ad obsonia vtuntur Aegyptij. Melanthinū idem
quod raphaninū potest. Tritū sinapis semen, &
calida aqua madefactū, adiecto postea oleo expri-
mitur. Id ad diuturnos dolores efficax est, trans-
fert humores qui in aliqua parte conreuerunt.

Myr

Mirteum. CAP. XXXVI.

Mirtei faciendi ratio hæc est. E Myrto nigra syluestri, aut satina, foliorum mollissima queque tusa premuntur: succo pares omphacini olei portiones adijciuntur, subiectisq; carbonibus inferuescunt donec concoquantur, innatans oleū deraditur. Sed longè facilior hæc cōpositio: Tenera folia cōtusa coquuntur in oleo & aqua, & quod innatat eximitur. Præuatim alij deiecta in oleū folia in sole macerāt: alij prius oleū inspissāt malicorio, cupresso, cypiro & iunco odorato. Efficacius est amarū gustū & oleosum, viride, trās lucēs, & olens myrtū. Astringit & indurat, ideā medicamentis miscetur quæ cicatricem obducunt: prodest vlceribus in capite manantibus, ambustis igni, & papularū eruptionibus. Facit ad attrita & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudores cōpescit, & omnia quæ astringionem inspissationemq; desiderant.

Laurinum. CAP. XXXVII.

Laurinū fit hoc modo: Lauri bacce cū maturæ sunt, in aqua coquuntur: siquidē ex obduelo cortice quandā pinguitudinē reddūt, quæ manibus subacta concha excipitur. Alij omphacini prius oleum cypiro, iunco odorato, & calamo inspissant, deinde tenera lauri folia concoquunt. alij etiam baccas, donec oleum odorem cōtraxerit. alij styracem & myrtum addūt. Optima laurus ad

C

id latifolia & montana. Oleum laurinum vtilius quò recentius, quòque viridius colore, amarissimum, & acris. Vis ei excalfactoria, emolliens: venarum spiracula aperit, lassitudines discutit, omnibus nervorum vitijs, algoribus, distillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum non aliud iuvantius: attamen potum nauseam parit.

Lentiscinum. CAP. XXXVIII.

Similis lentiscini ratio. Nam è maturo fructu temperatur, factis prius spissamentis, vt in laurino diximus. Hoc scabiè iumentorū canumq; sanat: vtilissimum pestis, acopis, & leprarum medicamentis: sudores cohibet. Nec secus terebinthinum fieri solet, quod refrigerat & astringit.

Mastichinum. CAP. XXXIX.

Mastichinū è trita sit mastiche, quod cōtra omnia vuluæ mala efficax est: mediocriter calfacit, astringit, et emollit. Aduersus promiñetes stomachi duritias, cæliacorū, dysenteriorūq; cruciatus vtile: faciem emaculat, & colorem nitidum facit. optimum in Chio insula componitur.

Vnguentorū compositio. CAP. XL.

De ratione vnguentorum consequenter tractandum existimauimus, quādoquidem ea in nonnullis corporū vitijs, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum prosunt, in quorum probationibus cōsule-

re naves oportet, an ea oleant ex quibus tēperan-
tur. Optimum huiusmodi iudiciū, quod in qui-
busdam planè obseruari nō potest, propter ea quæ
admiscuntur odore cæteris præualentia: vt in ama-
racino & crocino, telino, & plerisq; alijs, quæ cre-
bra circa hæc meditatione experiri conueniet.

Rosaceum. CAP. XLI.

Rosaceum sic fit: Iunci odorati quinq; libras
& bessē tūdito, & subactas aqua in vigin-
ti olei libris & quincūce subinde mouēdo, coquito:
dūq; percolaueris, in olei libras viginti & quin-
cuncē, adlycito rosas nō madefactas numero mille,
& manibus melle perunctis identidē moueto, in-
terdiu premens, finito nocte tota macerari, postea
exprimito: & ubi recrementū pessum ierit, muta-
to vase, in craterē melle illitum recondito. Cæterū
rosas quæ antea pressæ fuerunt, in labellū demitti-
to, & affusis octo libris & quadrāte spissati olei,
iterum premito, eritq; secundarium oleum. Quod
si tertias vsq; quartāsve perfusiones infundēs ex-
primere voles, secundarium fiet, tertiarium, &
quartarium vnguentum. Sed quoties id feceris, va-
sa melle oblini debent. Si verò secundam infusio-
nem instituire libet, in expressum oleum, numero
pari recentes rosas, nullo humore imbutas inij-
cito: manibus melle præmadefactis, agitans pre-
mito: & iterum, tertio aut quarto simili modo
exprimens facito, totiesq; recenteis rosas detra-

Etis vnguibus immittito: fiet enim ita oleum multo validius: nā septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prelum melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet: nam si minimum quid relinquatur, vnguentum corrūpet. Alij autem detractis vnguibus, rosas tantum oleo macerāt in solo hoc modo: Rose quæ selibram pondere equāt, in sextario olei diebus octo madescūt & vsq; tertiam perfusionē quadraginta diebus insolantur, & sic oleū reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscunt, & salem, quò minus oleat. Vim astringendi & refrigerandi obtinet, fomentis & cataplasmatibus vtile. Potius soluit aluum, stomachi ardorem restringit, vlcera caua replet & mulcet, quæ cacoëthe vocātur: vlceribus in capite manantibus, atq; feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo perfunditur, dentes inter initia doloris collui prodest, ad genarum duritias illitū efficax est, ad lacescita interanea & concitatas vulvas vtilissimè subijcitur.

Elatinum. CAP. XLIII.

FRacta elate tusa & scarificata, in labellum deijcitur: omphacium oleum triduo infunditur, mox per sportulam exprimitur: verum pares esse debent vtriusq; portiones, dein mundo vase ad vsus recunditur. Viribus rosaceo proportionē respondet: alium tamen non mollit.

Mel

Melinum. CAP. XLIIII.

Melinis hoc modo temperatur: Olei congius decem aquæ sextarijs admiscetur. Adijci-
tur elatæ palmarum fractæ quadrans, & iunci
odorati vncia: quæ die vno macerata coquun-
tur, mox in vas oris patuli oleum excolatur, &
indita arundinacea crate, aut vetusta tegete,
cotonea mala superponuntur, & vestimentis
operta tantisper inibi resident, dum malorum vi-
res ad se oleum alliciat. Alioqui cotonea, decem die-
rum spatio operimentis inuoluunt, vt contineatur
odoris suauitas, nec euanescat: postea biduo ma-
cerata oleo exprimuntur, oleumq; reconditur. Id
vim refrigeratorem & astringentem habet. Con-
tra scabiosa vlcera & quæ serpunt, ac furfures,
berniunculosque effectum præbet: exulceratis
vuluis infunditur, citatâ vrinam sistit infusum,
sudores cohibet, contra cantharidas, buprestim,
binorum crucas, bibitur. Laudatur maximè quod
cotonea mala olet.

Oenanthini compositio. CAP. XLV.

Oenanthæ è lambrusca, optimè olens post-
quam emarcuit, deiecta in omphacinum
oleum mouetur, voluiturq;: & cum biduo man-
serit, exprimitur, & reconditur. Astringit, pro-
ximum rosaceo effectum præbens: sed aluum non
resoluit, aut mollit. Probatissimum est, quod odo-
re oenanthæ refert.

Telini cōponendī ratio. CAP. XLV

Foenigraci libræ quinque, calami libræ vñ
 cypiri libræ duæ, olei libris nouem, septen-
 diebus macerātur, quotidie ter mouentur, post
 premuntur, & reponuntur. Aliqui pro calan-
 cardamomum substituunt, & cypiri loco xyle-
 balsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus
 spissato fixumgræcum macerantes exprimunt.
 Hoc telinum abscessus emollit, & concoquit, o-
 mnibus vuluarū duritijs magnopere conuenit, f-
 minis difficile parientibus subijcitur, ubi præ ex-
 cretis humoribus loci siccitatem contraxerunt.
 sedis inflammationes lenit, teneismo subditū pro-
 dest, vlcera capitis manātia fursuresq; expurgat
 ambustis, & pernionibus addita cera proficit, vi-
 tia cutis in facie emendat, pigmentis ad concilian-
 dum faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recēs,
 quod non vehemēter fixnigraci odorem præ se fe-
 rat, & manus abstergat, sapore ex dulci in ama-
 rum inclinato: tale enim optimum indicatur.

Sampsuchini cōpositio. CAP. XLVII.

Serpilli, cassiæ, abrotoni, florū sisymbrij, fron-
 diū myrti, sampsuchi singule portiones, qua-
 dā pro viribus ipsorū coniectatione, vñ tundu-
 tur, atque is omphacini olei modus adijcitur, quē
 inadentium vires non euincat: hæc post quadriduū
 exprimuntur. Denuò noua alia, simili mensura,
 & equali tempore macerata premūtur: ita enim

valē

validius reddi solet. Eligi oportet sampsuchum colore ex atro viridi, plurimū retolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantē, aduersus vuluæ præclusiones conuersionesq; efficax est, menses & secundas & partus extrahit, vuluæ strangulatus recreat, lumborū inguinumq; dolores lenit: sed cum melle vti eo præstat, quandoquidem vehementi astrictione locos indurat. Lasitudines illitum discutit, in opisthotonicorū, vulsorūq; cataplasmata vtilissimè additur.

Ociminī compositio. CAP. XLVIII.

Ocimum oleum fit vt cyprinum: Ocimi folia decerpta librarū vndecim, & besis pondō, die noctuq; viginti olei libris macerato, premito, colato: cumq; exhauseris quallum, rursus parē olei modum fundito, exprimito. Vocatur autem id secundarium: nam tertiæ perfusionis non est capax. Deinde recens ocimum equali pondere, vt in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tanto temporis spatio maduerit, exprimitur, & oleū recoditur. quod si in animo fuerit ter aut quater madefacere, semper ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici: sed illo modo melius. Idem quod sampsuchinum potest, sed inefficacius.

Abrotoninī compositio. CAP. XLIX.

Olei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincūce foliorum abrotoni libras octo die noctuq; madefactas, premito. Quod si in lon-

gum tempus oleum velis asservari, eiectis prioribus folijs, nova appones, & macerata exprimes. Calfacit, ad vuluæ duritias præclusionesq; efficax est, mensura. & secundas pellit.

Anethini compositio. CAP. L.

Olei libris octo & dodrante, florum anethi libras undecim & besē, maceratas in oleo die una, manibus premito & recondito. Quod si iterū persundere velis, recētes anethi flores cōsimiliter madefacito. Vuluarū duritias emollit, venarum spiracula laxat, contra horrores febriū circuitu redeūtes auxiliatur: calfacit enim, & lassitudines discutit: prodest articulorum doloribus.

Sufinum. CAP. LI.

Suinū, quod alij lulinum appellant, sic temperatur: Olei libræ novem cum quincunce, calami libræ quinq; & quadrans, myrrhæ uncia quinque, permixto odorifero vino decoquuntur, & colato oleo, cardamomi tusti & cælesti aqua madefacti libræ tres & semis macerantur, premunturq; tres libræ cū semisse spissati olei assumuntur: mille liliū decerptis folijs, in latum, nō tamen profundum, labellū demittuntur: iniectū oleum, manibus melle perūctis agitur: die noctuq; conquiescunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleum, protinus ab aqua, quæ simul expressa fuerat, colo incerni oportet: (nō enim, ut rosaceū, moram tolerat: nā concalfactum fervet & com-
putre

putrescit: quare sæpius decapulādum) vasa melle
illineāda, tenuis sal inspargendus, & si qua sordes
vasis faucibus hæsit, eximenda. Odoramētis iam
expressis ex quasillo in labellū transfusis, rursum
olei prius odoribus imbuendi, quod primum pon-
dus æquet, & cardamomi tusti drachmæ decem
coniunguntur. Hæc manibus scitè pressa, interiecta
breui mora exprimuntur: quod profluit, repurga-
tur. Tertio eadē infunduntur, adiecto cardamo-
mo, & sale, & manibus melle madefactis. Lon-
gè optimū erit, quod prius exprimitur: secundum,
quod sequitur: tertium locum sibi vendicat, quod no-
uissimū prodit. Denno in mille lilia euulsis folijs
expressum primo oleum infunditur: tum eadem
ratione proseguendus, idemq; faciendum, vt prius,
addito cardamomo, dein expresso: & quo frequen-
tius recentia lilia maceraueris, eo validius vn-
guentū efficies. Deniq; cum factū abundè videbi-
tur, singulis cōpositionibus miscere cōuenit myr-
rrha quàm optimæ duas & septuaginta drach-
mas, & croci decem, cardamomi quinque, & se-
ptuaginta: croci verò & cinnamomi pares por-
tiones tunduntur, & cribratæ in lutrā cum aqua
demittuntur, expressumq; primò vnguentū insun-
ditur, & paulò post excipiuntur vasculis siccis,
myrrha aut gūmi antea perfusis, & croco, melle
& aqua madefactis. Eadē fuit in altera aut ter-
tia expressioe. Aliqui simplex ex balanino, aliore

oleo, & lilijis cōponunt. Optimum esse constat Phœnice, mox Aegypto factum. Sed cum prim. laudatur quod lilia redolet. Excalfacit, emolli. vulnæ præclusiones, & collectiones aperit, vtilissimum ad muliebria mala: vlcera in capite manantia, feruidas eruptiones, varos, furfuresq; emendat: vibices cicatricesq; celerrimè ad colorem reuertit, ita vt sæpe fallant. In summa extenuat, potibilem per alium extrahit, vrinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Narcissinum. CAP. LII.

Narcissini olei spissamenta ita fiunt: Sex librae aspalathi cū sextate trūduntur, olei eloti libra septuaginta cū vncijs quinq; assumuntur. Aspalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur: quo exēpto, calamus quinq; librae, et bessè adijcitur, cū myrrhæ gleba contūduntur, cribrataq; ac vino veteri odorato immista, decoquitur: simulac autem cū ijs efferbuerit, eximitur: refrigerati olei excolatur, cuius portio in labellum mittitur, flores narcissi quamplurimi coniiciuntur, qui bidui spatium (vt in susino dictū est) permoti exprimuntur. Oleum subinde decapulandū, siquidem celerrimè putredinē sentit. Valet hoc ad emolliendas vulnæ duritias, præclusionesq;: sed capitis dolores facit.

Crocinum. CAP. LIII.

Cum crocinum componere voles, prius olei, vt in susino diximus, spissamenta facies, eis-

dem ponderibus, & mēsuris: cuius olei libras treis
& semissem, croci vnciā vnā assumes, identi-
dem quotidie moueto, & sexta die, quā hoc assi-
duo peregeris, oleū à croco colis incernito, eidē cro-
co parem olei modum ady cito, moue triduo, dein
contuse myrrhæ atq; cribrate drachmas quadra-
ginta permisceto, & in pila agitatum recondito.
Aliqui oleo aromatibus ad cyprinū imbuto in cro-
cini compositione vtuntur. Optimum est, quod a-
bundē crocum spirat, in medendi vsu expetitur.
Proximū, quod myrrham refert. Calfacit, somnū
allicit, quare persæpe phreniticis subuenit, perfu-
sum, aut naribus admotum, aut illitum: pus mo-
uet, vlcera purgat, cōtra vuluæ duritias atq; præ-
clusiones, & vlcera, quæ cacoëthe vocantur, pro-
dest cum croco, cera, medulla, duplicato olei ponde-
re. Concequit enim, emollit, humectat, & permul-
cet: ad oculorum glaucitates ex aqua illinitur.
Huic autem proportionē respondent butyrium,
onychinum & styracini: quæ & etsi nominibus
distant, viribus & compositione cognata sunt.

Cyprini spissamentum. CAP. LIIII.

Olei omphacini eloti pars vna, aquæ cœle-
stis tantundem cum semisse, cuius vna par-
te oleum diluitur, altera ady ciendis odoramentis
admiscetur: dein assumptis aspalathi libris quin-
que, & semisse, calami libris sex, & semisse, myr-
rhæ libra vna, cardamomi libris tribus, & do-
dras

drante, olei libris nouē, & uncīs quinq;. Aspalathus tusus, & aqua affusus decoquitur in oleo donec cōseruescat, myrrha autē vino vetere odorifero subacta, contususq; simul calamus, digeruntur in offuias, quæ exēpto aspalatho immittuntur: & ubi efferbuerint, sublato abeno, oleum percolatur. Cardamomū tusum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitatur, nulla, dū refrixerit, interpellatiōe. Post hæc colato oleo, in viginti octo libras olei, floris ligustri, quod cyprū vocāt, sex & quadraginta libræ cū beſſe instillātur, quæ sufficienter madefactæ per sportulā exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem recentium florum pondus iniectū simili modo prematur: & iterū aut tertio si quis velit, madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonū, quod cum odoris suauitate nares feriat Aliqui cinnamomum addunt. Calfacit, emollit, ora venarū adaperit, vuluæ neruorumq; vitijs cōuenit, pleuritidis, fractisq; per se vel cerato immistū: malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationiq; inguinum opitulantur: item in acopa adijcitur.

Irii spissamentum. CAP. LV.

Spathæ quam minutissimè contusæ sex libras cum beſſe, in tribus & septuaginta libris & quincunce olei, areo vase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit: postea in capulam melle oblitam colato: ex eo aromatibus

bus imbuto oleo, irinū primò temperatur, iride ex
oleo inspissato macerata, vt scripsimus. Sed alia
est cõponendi ratio: In olei septuaginta libris &
quincunce, xylobalсами (vt dictum est) contusi, li-
bras quinq; & sextantē excoquito, postea detra-
cto xylobal samo nouē libras & dextantē adijci-
to, & myrrhæ glebam vetere vino odorato persufu-
sam, & in olei ita odoribus imbuti quatuordecim
libris, totidem tussæ iridis, binis diebus ac noctibus
madefacito, strenuè & vehementer distringito.
Quod si vis validius fieri, par pòdus iterū ac ter-
tio similiter maceratū exprimito. Longè optimū
est quod solā irin olet, quale est in Perga Pamphi-
liæ, & Elide Achaïæ natū. Vim habet calfacto-
riā atq; emollientē, crustas adimit, sordida vlcera
& putrida purgat. confert feminis vuluæ causa-
rys. itē inflammationibus eiusdē atq; præclusioni-
bus, partus eijcit, hæmorrhoidas recludit, contra
auriū sonitus ex aceto, ruta & amaris nucibus,
prodest: diuturnis destillationibus, naribus illitū,
& cõtra graueolentia earū vlcera, quas oxænas
vocant, auxiliatur: aluiū purgat cyathus epotus,
facit ad ilei cruciatus, vrinā mouet, difficileis vo-
mitiones adiuuat, perūctis eo digitis & immis-
sis, vel ijs quæ ad vomitū ciendum induntur angine
etiā illinitur, aut ex aqua mulsa gargariatur:
itē contra arteriæ scabritiam. datur etiam ijs qui
sicutā, coriandrū, aut venena fungorū hauserūt.

Glen

Gleucinum absolute constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, celtica nardo, spatha, asspalatho, sertula campana, costo, & musto: circumdatis interim vinaceis vasis, quod aromata, vinum & oleum conceperat. Tricenis diebus, his in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horroribus & nervorum vuluæq. vitis auxiliatur, omni acopo iuvantius, quippe quod emolliat.

Amaracinum longe optimum in Cyzico fieri solet ex omphacino et balanino, spissamentis est xylobalfamo, iunco odorato, et calamo factis, conditisque amaraci, costi, amomi, nardi, cassie, carpobalsami & myrrhe odoribus. Aliqui, quod pretiosius fiat, cinnamomum addunt Mel autem & vinum assumuntur: hoc in vasorum illitione, illud ad cogendum vasorum aromatum offas. Amaracinum calfacit, soporem mouet, venarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, urinam cit, putrilaginibus ac fistulis perquam utile: necnon humectibus herniis, postquam medica manus operam suam impenderit: crustas, & tetra ulcera, quae theriomata vocat, rumpit: difficili urina, illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hamorrhoidas illitu soluit, vuluæ subditum menstruos cursus euocat, duritias ac vuluæ tumores discutit, vulneratis nervis, & musculis confert, laneo

LIBER PRIMVS.

49

eo centunculo modice madefactū & impositum.

Megalinum. CAP. LVIII.

Factitabatur olim megalinum, sed nūc compositio exoleuit & prorsus oblitterata est. Cuius ad hīstoriae complementum meminisse non auit alienum. Mīstura cum amaracino eadē erat, sed resina exuperabat, hac tantum ratione differens. Quare leuiter emollit. Resina vnguentis, neque tutela neque voluptatis gratia adiicitur, sed coloris crassamentiq; causa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olere: cuius coquendae ratio declarabitur, dum de resina differemus.

Hedycroum. CAP. LIX.

Quod hedychroon vocant, in Co fieri solet: eisdem praeclitū viribus, & mīsturis, quibus amaracinum, sed suauius spirat.

Metopium. CAP. LX.

It in Aegypto vnguentum, quod metopion patrio nomine appellatur, propter galbani mīstionem: nam lignum in quo galbanum enascitur, metopion vocant. Constat amaris nucibus, amphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calamino, melle, vino, myrrha, balsami semine, galbano & resina. Probatur pingue, graui odore, quod magis cardamomum & myrrham, quā galbanū respiciat. Calfacit vehementer, & adurit, atq; extrahit, ora venarum aperit, vlcera purgat, extrahitq; ad praecisos neruos, & musculos, ad hernias
hum

humore cōtractas, cū erodentibus medicamētis efficacax est: ceratis et malagmatis inseritur, horribilibus, cōuulsisq; præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, et retrorsum cōtracta est, vtile habet: sudores ciet, vuluæ spiracula recludit, & eiusdē duritias laxat: in summa, molliendi naturā habet.

Mendesium. CAP. LXI.

Mendesium constat balanino oleo, myrrha, cassia, & resina. Aliqui tamen post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addūt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, vim nullā exhibent. Similem metopio vim obtinet, sed inferiorem multā.

Stacte. CAP. LXII.

Stacte vocatur pinguitudo recentis myrrhæ cum exigua aqua tuse, & origano expressæ. Ea perquam odorata, ac pretiosa est: atque vnguentum per se facit, quod stacte nominatur. Maximè probatur, quæ nullam olei mīstionē admittit, cuius minima portio compos est virium plurimarum. Vim calfactoriam myrrhæ & calidis vnguentis respondentem habet.

Cinnamominum. CAP. LXIII.

Cinnamominū confit ē balanino oleo, & xylobalсами, calami, iurci odorati spissamentis, atq; cinnamomi, & seminis balsamini suauitate conditur, quadruplaq; myrrhæ ad cinnamominum portione, mel ad cogenda omnia adijcitur.

Laud.

Laudatur nō acre, molli odore, planē myrrhā re-
 dolens, crassum, odoratū, gustu perquā amaro.
 Id non à resina, sed myrrha crassitudinē obtinuit:
 resina enim neq; amaritudinē præbet, neq; vllam
 odoris gratiā adūcit. Vim habet admodū acrem,
 amarā, & calfacientē. Itaq; ora venarū aperit,
 calfacit, discutit, diffundit, humores et spiritus at-
 trahit, caput aggrauat, contra vuluæ vitia cū du-
 plo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim ferē
 multū acrimoniæ exoleſcit, & quedā emolliendi
 vis contrahitur alioqui adurit, & præ omnibus
 crassis vnguentis indurat. Facit mirū in modum
 ad fistulas & vlcera quæ putredinis vitiū sense-
 runt: itē ad hernias humidiores, carbūculos, febriliū
 horrores, tremores, gāgrænasq; cū cardamodo:
 aduersus serpentiiū morsus illinitur, scorpionū &
 phalangiorū ictibus cum tritis grossis imponitur.

Nardinum. CAP. LXIIII.

Ratio nardini faciundi euariat. Nā aut mā
 labathrino folio, aut sine eo fit: plerūq; autē
 balanino oleo, aut omphacino: iūcus odoratus spīs
 samēti gratia adūcitur: sicuti propter odoris sua-
 uitatē, costus, amomum, nardum, myrrha, balsa-
 mum. Laudatur tenue, non acre, nardi aride aut
 amomi odorē referens. Vis ei extenuās, acris, ex-
 purgat, excalfacit, absterget humores, rarefacit.
 Hoc liquidū est, nec habet strigmenti crassitudinē,
 nisi resinā recipiat. Fit etiam simplex ex ompha-

D

cino oleo, iunco, calamo, costo & nardo.

Malabathrinum. CAP. LXV.

Malabathrinum spissamenta nardini habet, in super myrrhae plusculum additur: qua de causa calfacit, crocino aut amaracino viribus respondens.

Iasminum. CAP. LXVI.

Apuđ Persas fit, quod Iasminum cognominatur, ex albis floribus violæ: quorum sextans, in Italicum sextarium sesamini olei demittitur, violis, ut in lilino diximus, vicissim permixtatis. Apud Persas inter epulandum usurpatur odoris causa. Nam toti corpori conuenit, præsertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactione, laxationemque desiderant: grauius enim spirat, quam ut libenter à plerisque recipiatur.

Myrrha. CAP. LXVII.

Myrtha lacryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis: è cuius vulnere defluit lacryma in subiectas tegetes, alia circum caudicem concreuit. Dicitur ex his aliqua pediasimos præpinguis, quæ expressa, Staete emittitur. Alia gabirea pinguis, lato & pingui solo nascens, ea copiosam sudat statim. Omnium prima est, quæ troglodytica appellatur, accepto cognomine à loco, in quo prouenit: splenders, subviridis, ac mordens. Quinetiam legitur

egitur tenuis quædã, quæ à troglodytica secunda
st, bdellij modo mollis, verũ odore grauiuscula,
apricis nascens. Alia caucalis cognominatur, præ-
ter modũ expleta, nigra, & retorrída. Omnium
deuterrima, quæ erga sîma dicitur: pingui carens,
cano situ obducta, acris, ad gummi imaginẽ ver-
gens, & viribus eius p̃xima. Improbatur amin-
nea cognomine. Ex ijs pastilli fiunt, sed è pingui-
bus pingues, & odorati: è sicciõribus haudqua-
quã pingues, & inodorati: minus odore pollet,
quæ oleũ non admisit, cum in pastillos digerebat.
adulteratur macerato gummi aqua, in qua myr-
rha maduerit. Eligenda est recens, squallore obsita,
leuis, vndiq; cõcolor, quæ confracta venas vnguiũ
modo candidas & leues ostēdat, minutis glebis,
amara, acris, odorata, calfaciens: superuacua &
inutilis est ponderosa, coloris piceĩ. Calfacit, cohi-
bet, soporem gignit, glutinat, siccit, astringit,
vuluam emollit, & præclusam aperit: menses &
partus celeriter extrahit cum absinthio, lupinorũ
cremore, vel succo rutæ admota: tuberculo fabæ
deuoratur in vetere tussi, orthopnœa, in laterũ pe-
torisq; doloribus, in alui p̃fluio, & dysenteria:
horrores discutit, duabus horis ante febrĩũ acces-
siones, fabæ magnitudine pota cum pipere & a-
qua: subdita linguæ liquataq; scabritiem arteriæ
expolit: obtusam vocẽ expedit, ṽtrĩs tineas enecat,
contra grauẽ oris halitũ mādatur, & aduersus

alarum tedia cū liquido alumine illinitur: gingi-
 uas & dentes stabilit, colluto cū vino & oleo ore:
 vulnera capitū illitu glutinat, medetur fractis au-
 ribus ac ossibus nudatis, perūcta cum cochleā car-
 nibus. Itē purulentis auribus inflammatisq; cum
 meconio, castorio, & glaucio ad varos autē cum
 cassia & melle illinitur, impetigines ex aceto pur-
 gat, defluentes capillos cū ladano & vino myr-
 teo illita, firmat: diuturnas destillationes lenit, il-
 litis pēna naribus: oculorū vlcera cōplet, albugines
 tollit, caliginem discutit, scabritiem lenigat. Fit ē
 myrrha, perinde atq; thure, fuligo, &, vt postea
 ostendemus, ad eadē conueniēs. Bæotica myrrha,
 dissecta radix est arboris cuiusdā in Bæotia na-
 scentis. Melior est quæ myrrham odoris suauita-
 te repræsentat. Vis ei calfactoria inest, emollit di-
 scutitq;, suffimentis commodissimè inseritur.

Styrax. CAP. LXVIII.

αιπάρως
id est, pin-
guis. **S**tyrax lacryma est arboris malo cotoneæ si-
 milis. Præfertur * sordescens, flauus, resino-
 sus, albicantibus grumis, quāplurimum in sua
 odoris gratia permanens: qui dum mollitur, mel-
 leum liquorem reddit: qualis ē Cataballis, Pisti-
 dia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, surfu-
 rosus, friabilis, canoq; situ obductus. Cæterum la-
 cryma inuenitur gummiū similitudine, perluci-
 da, & myrrhæ æmula: verum per pauca manat.
 Adulteratur ligni scobe, quam vermiculi eroden-
 tes

LIBER PRIMVS.

55

es excusserunt, melle, & iridis sedimento, & qui-
 usdam alijs. Alij ceram aut adipem odoribus
 imbuti, fragrantissimis solibus cum styrace subi-
 ciunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua
 veluti vermiculos exprimunt, vñundantq;. Sty-
 racem hunc [quoniam in vermiculorum speciem
 contrahatur] scoletiten cognominant, tanquam
 syncerum imperiti approbant, nō animaduerten-
 tes ad præcipuam odoris fragrantiam: si quidem
 acer admodum est, qui adulterationis vitio caret.
 Styrax calfacit, emollit, & concoquit: medetur
 tussi, destillationibus, raucedini, grauedini, et in-
 terceptæ voci: vuluæ præclusæ duritiæve laboran-
 ti conuenit, cit menses potu apposituq;, alium le-
 uiter mollit, si exiguum cū resina terebintina ca-
 tapotij modo deuoretur. Miscetur vtiliter discen-
 tientibus malagmatis, acopisq;. Adoletur autem
 & igni torretur, vt fiat ex eo, veluti ex thure, fu-
 ligo, ad eadem cōueniens ad quæ thuris fuligo. Ex
 eo etiam in Syria styracinū oleum componitur,
 quod calfacit vehementer, & emollit: verum ca-
 put dolore afficit, adgrauatq;, & soporē adfert.

Bdellium.

CAP. LXIX.

Bdellium alij bolchon appellant, alij madel-
 con: lacryma est * saracenice arboris. Pro * vox adul-
 batur gustu amarum, translucidum, taurini glu- terina Mar-
 tinus in morē. intus pingua, liquefcens facile, ligni cello.
 ac sordis expers, suffitu odoratum, vngui simile.

D 3

Est etiamnum bdellij genus sordidum, nigrū, vberioribus glebulis in offas conuolutū, aspalathi odore, ex India aduectum. Defertur etiā à Petra opido siccum, resinosum, liuescens, sed facultate secundū. Adulteratur gummi, sed ita vitiatum non perinde gustui amaritudinē repræsentat, nec vsque adeo suffitionibus odoratū. Calfacit et emollit duritias, & turgētia guttura, humidāsque her-nias discutit, cum ieiuna salina dilutū: vulnē spiracula laxat appositū & suffitū, & partus humiditatesque omnes extrahit, calculos potu comminuit vrinam mouet, tussietibus & à serpente percussis, vtilissimè datur: valet ad rupta, vulsa, laterū dolores, & discursantes spiritus: malagma- tis inferit, quæ cōtra duritias et neruorū nodos p-sunt: cōtusū resoluit affuso vino aut aqua calida.

Thus.

CAP. LXX.

* ὑπόκις-
ῖος, id est,
subrusum
est.

* ὁ Ἀρα-

βίας ἡ ὁ

ἔρ Σμίλῳ,

id est, Ara-

bias dictū,

& quod in

tunditatem

contrahat:

verum huiusmodi thus tē-

Smilo pro-

uenit.

THus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatū tenet in eo genere masculum, stagonias appellatū, suapte natura rotundum: tale autem indiuiduum est, candidū, cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum vero & fuluescit, & colore liuet, sed rotundū industria faciliat: nam in quadrangulabias dictū, res formas dissectum fictilibus versant, donec rotunditatem contrahat: verum huiusmodi thus tē- Smilo propore flauescit, quod atomum aut syagrum appellant. Secundum locum habet & Arabicum,

&

& in Smilo nascens, quod aliqui copiscū vocāt,
 minus multò & fuluius. Est & genus aliud. cui
 amomite cognomen est, alioqui candidū: quod dū
 molitur, masthiches more digitis cedit. Adultera
 tur * in itinere, pini resina & gūmi, quod facile * *ΜΕΤΟΔΕΥΟ
 deprehendi potest: siquidē suffitum gūmi flammā ΜΕΥΘ, id
 non ei aculatur, & resina in fumū euanescit, thus est, artificio
 verò statim ardet: idē maleficiū odor prodit. Ad sē cōforma-
 calfaciendū & astringendū pollet, oculorū caligi- tum. Sic
 nem discutit, caua vlcera complet & ad cicatri- Marc.
 cem perducit, cruēta vulnera glutinat, infrenatq;
 cunctas sanguinis eruptiones, etiam si cerebri mē-
 branis effluat: vlcera quæ cacoēthe vocantur, &
 sedis & reliquarū partium permulect tritū cum
 eo & lacte linamentū, formicantes verrucas in-
 ter initia, impetiginesq; , ex aceto & pice illitū,
 tollit: ambrusta igni, pernionesq; cum suillo adipe
 aut anserino, & vlcera in capite manātia cum
 nitro, si infricetur, sanat: paronychijs cū melle, au-
 ribus fractis cū pice, medetur: ad reliquos auriū
 dolores cum dulci vino infunditur, inflammata à
 partu māmæ cū cimolia & rosaceo magna uti-
 litate perunguntur, additur ad arteria viscerūq;
 medicamenta, prodest sanguinis excreationi po-
 tum: sed in secunda valetudine haustū insaniam
 mouet, & largius cum vino potū interfuit. In fi-
 ctili mūdo thus crematur, flagrāte glebula sucie-
 sum à lucerna, donec exuratur: post perfectam

ustionem operire oportet, vsq; dum restinguatur: sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam aeneo vase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginē, vt in eius mētionē mox ostendemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam nouo viuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem vaporēve emittat. facile enim comminuitur quod perustum non est.

Thuris cortex.

CAP. LXXI.

Praefertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, laevis, minime scaber, sine membranis. Adulteratur admisto pini aut nucis eius cortice, sed horū index ignis est: siquidē reliqui cortices suffiti nequaquā incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris verò cortex ardet, & cū odoris fragrantia vaporē ei aculatur. Thuris modo vtitur, & vis eadem quae thuri, sed validior astringentiorq;. Quare potu cruentis excretionibus, vuluis fluxione laborantibus in pessa confert, ad cicatrices oculorū, & caua sordesq; efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

Manna thuris.

CAP. LXXII.

Manna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris contusi adulterant: sed haec igne deprehendun-

tur.

ur. Neque enim aequè suffitu aërium vaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & permixtum suaueolentia halitus virus habet.

Thuris fuligo. CAP. LXXIII.

Fuliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis accensas singulatim thuris glebas, in novam fictile ollam cōcavā imposito: & aëreo vase in medio perforato, deterfa diligēter sorde, obtegitto: alterā admoneto, ex altera eius parte aut utraque, subiectis quaternū digitorū altitudine lapillis, quò facilius perspicī queat, si vrantur: & quā locus capax fuerit, glebularum alias supponito. et antea quā prorsus prior gleba resinguatur, aliā imposito, donec sufficientē fuliginē videaris coëgisse. Continuo tamen externæ aramenti partes spōgia, aqua frigida madefacta, abstergātur: ita enim tēperato aris feruore, fuligo omnis inhaerebit: quæ alioqui per leuitatē decidua, thuris cineribus admiscetur. Derasa itaq; fuligine, cinis cremati thuris seorsum subtrahendus est. Idem opus, quoad satisfactū tibi videtur, obeundū. Oculorū inflammationes mitigat, fluxiones suspendit, ulcera purgat, cana explet, carcinomata sistit. Simili modo è myrrha, resina, styrace, reliquisq; lacrymis, vligo excipitur, ad eadem conueniens.

Picea & Pinus. CAP. LXXIIII.

Pinus & Picea generi eidem ascribuntur, sed quādam flagitant specierū distinctionem,

80 DIOSCORIDIS

arbores vulgò cognita: quarū cortex astringit,
 prodest tritus & illitus intertrigini, vlceribus
 summū corpus occupatibus, ambustisq; cū spuma
 argenti & manna. Vlcera delicatulorum acrimo-
 niam recusantiū, cerato myrtino exceptus, ad ci-
 catricem perducit: tritus cū sutorio atramēto ser-
 pentia cohibet, suffitu partus & secundas eūcit,
 potus aluum sistit, vrinam mouet. Folia eorū tri-
 ta & illita inflammationes leniunt, vulnera ab
 inflāmatione vindicant, trita autem & decocta
 aceto, fernēti collutione, dentiū dolores mulcēt: he-
 paticis vtilia sunt, drachmæ pondere in aqua aut
 mulsa pota. Pineæ nucis cortex & folia potu idē
 præstant. Teda earum particulatim secta si in ace-
 to coquatur, & decocto dens colluatur, dolores le-
 uat. Ex his etiam fit spatha acoporū pessorumq;
 cōpositionibus idonea. Quinetiam earum crema-
 tarum fuligo ad librarij atramenti cōfectionem
 excipitur: ea circumlitionibus efficacissime impo-
 nitur, quibus palpebras ornant, coloremq; mētun-
 tur, callibrephara Græci vocant: arrosis oculorū
 angulis, callosis glabrisq; genis, & collacrymatio-
 nibus opitulatur. Pityides appellantur pinorum
 piceæq; fructus, qui in conis inueniuntur. Vim a-
 strictoriam habent, & aliquantum excalfacien-
 tem: tussi & pectoris vitijs auxiliātur, per se, aut
 ex melle sumpti. Nuces pineæ cū Strobili repurga-
 tæ māduntur, aut cū passō aut cucumeris semine
 bib

Pityides.

bnntur, vrinam cient: acrimonias in renibus & asca hebetant, stomachi rosiones leniunt: datae cum portulacæ succo, virium infirmitatem roborant, corruptorum quoq; humorum labem obtundunt. Pineæ nuces integræ recenter arboribus decerpæ, in passo franguntur, & decoctæ vetustæ assæ ac tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

Lentiscus. CAP. LXXV.

Lentiscus nota arbor est, cui toti vis inest astringendi: semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatæ insunt vires. I. quamētū autem fieri solet. Folia, cortex & radix in aqua coquunt, & ubi abunde cocta refrigerataq; sunt, folia abijciuntur: aqua denuo coquit, donec mellis habeat crassitudinē. Lentiscus sua astringēdi doctore, valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Itē cōtra eruptionē sanguinis ē vulua, & eiusdē aut sedis prociētia. In totū acaciæ & hypocistidis vicē repræsentat. Idē facit succus ē tritis folijs. Decoctū fotu caua explet, et fracta ossa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomas arcet, vrinā pellit, motus dentium collutione stabilit. Virētes surculi calamulorum vice dentibus repurgandis affricantur. Fit ē semine olcū, ΣΥΠΤΙΚΟΝ. Quod prodest cū quid astringi opus est. Lentiscus resinam gignit, quæ lentiscina cognominatur, & ab aliquibus, & mastiche. Pota utilis est cinis.

(sang

sanguinem reijcientibus, & tussi veteri: stoma-
cho auxiliatur, sed ructum mouet. Additur in de-
tificationibus & illitiones faciei, ad nitore cuti concilian-
dum. Palpebras oculis incommodas replicat, ma-
ducata halitum oris commendat, gingiuas con-
Interpretu ab trahit. Optima & copiosissima in insula Chio
prouenit. Praefertur [nitendulae modo] resplen-
descens, & candore Tyrrhenicae cereae similis, adul-
ta, retorrída, friabilis, odorata, stridorem edens.
Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, re-
sinaeque pineae nuci miscitura.

Terebinthus. CAP. LXXVI.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia, et
semen, & cortex astringunt, & ad eadem ad
qua lentiscus conueniunt, simili parata modo sum-
ptaque. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduer-
satur: excalfacit, urinam mouet, venerem excitat,
contra phalangiorum morsus conuenienter in vino
bibitur. Resina eius ex Arabia petraea defertur.
Prouenit etiam in Iudaea, Syria, Cipro, Aethiopia et
Cycladibus insulis: sed praevalet candida, perluci-
da, vitreo colore & in caeruleum vergente, odora-
ta, terebinthum olens. & Terebinthina resinas o-
mnibus antecedit: proxima lentiscina, & est pinus,
& abiete: has sequitur est picea & pineis nuci-
bus resina. Natura omnibus calfacere, mollire,
discutere, expurgare. tussi ac tabi conueniunt
per se, aut in eclegmate ex melle, vitia pecto-
ris

Officinis
Terpetma.

pectoris expurgant, urinā cient, cruda concoquūt, ventrem emolliunt, palpebras commodissimè replicant, lepras tollunt, cū æruginē ac sutorio atramento, utroq; : auribus saniem emanantibus cum melle & oleo, item in pruritu genitalium vtilēs: malagmati, acopisq; admiscuntur. Laterum doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.

Resinæ aliæ. CAP. LXXVII.

Liquida resina è pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuehi solet, atq; olim à Colophonia petebatur: hinc Colophoniam sibi cognomentum vendicauit. A Gallia quoq; subalpina: quā vernaculo nomine laricē appellāt incolæ. Ea in linctu, & per se, magnopere prodest tussi veteri. Colore inter se distāt: siquidē alia cādida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, ut larigna. Cupressus etiā liquidā fundit resinā, quæ ad eadem pollet. Quæ verò aridarū generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, alia abiete, alia picea & pinu exierūt. Eligi debet longè omnium odoratissima, translucēs, non retorrida, neq; diluta, quandā ceræ faciem præbens, & friabilis. Epicea & abiete resinæ cæteras antecedunt: odoratæ enim sunt, atq; thus odore imitātur. Præstantiores à pityussa insula deferuntur, quæ secundum Hispaniā sita est. Sed quæ è picea, nucibus pineis & cupressò manarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. Veruntamen eorundem gratia quorum & illæ

illa sumi solet. Lentiscina terebinthinae respondet.
 Vritur resina omnis liquida in vase quadrupla
 capacitatis ad humorem, qui infunditur: itaque resi-
 na coctius, in duobus aquae pluviae coquitur, sub
 Etis leuibis prunis, resina assidue movetur, donec
 omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrida
 reddatur, ac digitis cedat. Ceterum ubi refriguit
 in fictile non picatum, quod aconitum vocant, id est n-
 illitum reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resi-
 na omnis eliquata praeoletur, quod faculenta sor-
 des excernatur. Vritur quoque sine aqua, primi-
 lento igne: & ubi coire experunt, maior carbon-
 strues supponitur, & triduo citra intermissione
 discoquuntur, usque dum ante dictas naturae suae no-
 tas exuerint: mox, ut dictum est, reponuntur. Arida
 unius diei spatium decoxisse satis est. Vt et odorati-
 malagmatibus, & acopis, & unguentorum color-
 tionibus magnopere utiles sunt. E resina perina-
 ctque thure fuligo excipitur, ad circulations idonea
 quibus palpebras fucant, & colorem mentiuntur.
 Prodest glabris genis, collacrymationibus, erosio-
 quorum oculorum angulis. ex ea fit atramentum scriptorium.

Pix liquida. CAP. LXXVIII

Pix liquida, quam alij conum vocant, & pin-
 guissimis pini piceaeque lignis congregatur.
 Optima est splendens, sincera, levis. Contra
 verena, phthisin, purulentam excreationem, tu-
 ses, suspiria, & pectoris humores qui difficile ex-
 tussantur.

tuſſiuntur, officax eſt, eclegmate cyathi meſſura
cum melle dato. Tonſillarū & vnae inflāmatio-
nes, anginae q̄; vtiliter perungūtur: purulētis auri-
bus infunditur cū roſaceo, & illinitur cū trito ſa-
le ſerpentiū morſibus: adiecta verò pari cera ſca-
bros vngues extricat, impetigines q̄; emendat: vut-
uæ duritias ac ſedis tubercula diſcutit: cū farina q̄;
hordacea & pueri impubis vrina decocta, ſtru-
mas rumpit: cohibet vlcera quæ ſerpiūt, cum pineo
cortice, aut ſulphure, aut furfuribus illita. Cate-
rūm cū thuris manna & cerato profundos vlce-
rū ſinus conglutinat, rimis ſedis & pedū, magno
auxilio illinitur: vlcera replet, et cū melle purgat:
quin & cū vna paſſa, & melle carbunculos, &
putrida vlcera emarginat, diſrumpit q̄; erodenti-
bus medicamētis, quas ſeptas vocāt. p̄be immiſcet.

Picinum oleum. CAP. LXXIX.

E Pice fit quod piſſelaon appellāt, ſeparato li-
quore aquoſo, qui ſupernatat picis, ſicut ſerū
laſti. Nam expaſa, quandiu pix coquitur, ſupra
cortinam vellera pura madefcunt, accepto q̄; ha-
litu eius exprimuntur in vas. * Quas pix liqui-
da, præbet vtilitates. alopecias capillo replet cum
farina hordeacea illitum, quibus & liquida pix
medetur, iumentorum vlcera ſcabiem q̄; emendat.

Fuligo liquida picis. CAP. LXXX.

F It hoc modo ē liquida pice fuligo: In lucerna
nova quæ ellychnium habeat nonnihil picis
incen-

Hæc de ſunt,

καὶ τὸ

ἀπὸ γίνετ

ἐφ' ὅσον

ἀπὸ χρόνου

ἢ πικρὰ

ἐκ τῆς

incen

incendito, lucernamq; fictili vase in clibani specie conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore nouum infundito, quoad sufficientem vsui fuliginem collegeris. Vis ei astringens, acrisq;. Vsi est ad pigmenta quibus palpebras linunt & venustant, & ad circumlitiones. Item ubi glabris genus pilos restitui oportet, ad imbecilles lacrymososq; oculos, insuper ad eorundem vlcera non inutilis est.

Pix arida. CAP. LXXXI.

Iquida pix decocta in spissam coit, quam vocant aliqui palimpissam: quo in genere quaedam visci modo lentescit, boscas cognominata: altera sicca est. Probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæq; simul naturam habentes. Calfactoriam vim habet: dura emollit, pus mouet, tubercula pannosq; discutit, vlcera replet, vulnerarijs medicaminibus commodè permiscetur.

Zopissa. CAP. LXXXII.

Zopissam aliqui aiunt clerasam nauibus resinam cum cera, quam alij apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerata sit. Alij pineam resinam hoc nomine vocauerunt.

Bitumen. CAP. LXXXIII.

Bitumen Indicum ceteris antepositur. Cuius prob

probatio est, vt purpura modo splēdeat, sitq; ponderosum, ac validum odorē vibret. Nigrū autem & sordidū, vitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phoenice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Li-
quidū inuenitur in Agragantino Sicilię, fontibus innatās, quo vtūtur ad lucernarū lumina, olei vice. Hallucinātur, qui id Sicilicum oleū nominant: nanque liquidū bituminis genus esse constat.

Pissasphaltum. CAP. LXXXIII.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurum, quę pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetū fluminis rapitur, aestuq; in litus expuntur, illic coacta in glebas, mistā bitumini picem redolet.

Naphtha. CAP. LXXXV.

Naphtham vocant Babylonij, bituminis colamen, colore candidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita vt ex spatio protinus in eam trāsiliant. Ad suffusiones oculorum, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur: vulnarum procidentia, strangulationesq; olfactu, suffitu, imposito, emēdat: comitiales morbos suffitum apprehendit, gagate lapidis more: purgationes mulierū cum vino, & castorio potiū elicit, tussim veterem & anhelitum adiuvat, serpentium morsibus, coxēdicum laterumq; doloribus auxiliatur, datur coeliacis in catapotio deuorandū, cum aceto potum

E

discutit sanguinē concretum, dysentericis cū ptis-
na liquatū infunditur, destillationibus suffitione
medetur, mitigat dentium dolores oblitum, cate-
rum pilos incommodos siccum replicat, specillo im-
positum: concalsactum autem, & cum farina hor-
deacea, nitro & cera illitū, podagris, articulorum
doloribus, lethargicisq; prodest. Pissasphaltos ea-
dem, quæ pix & bitumen, si misceatur, potest.

Cupressus.

CAP. LXXXVI.

Cupressus refrigerat, & astringit. Cuius fo-
lia ex passō, & exiguo myrrhæ pota, vesicæ
rheumatismis, & vrinæ difficultati auxiliatur.
Pilulæ autē ex vino tusæ in dysenteria, alui fluxio-
ne, tussi, & orthopnœa, aut si reijciatur sanguis,
cōueniētissimè bibūtur: earū decoctū eosdē præbet
effectus: tusæ cū sico duritias emolliūt: nariūq; po-
lypo medetur: in aceto coctæ, & cū lupinis detrita
scabros vngues eijciūt, hernias intestinorū plapsu
erūpētes illitu reprimūt. Folia eadē præstāt. Pilu-
læ cū arboris coma suffitæ, culices ahigere existi-
mātur. Folia trita & imposita, vulnera congluti-
nāt: sanguinē supprimūt, capillū ex aceto tingūt,
illinūtur per se, aut cū polēta ignibus sacris, vlceri-
bus q̄ serpūt, carbūculis & oculorū inflammationi-
bus, admota cum cerato stomachum corroborant.

Iuniperus.

CAP. LXXXVII.

Iuniperi genera duo: altera maior, altera mi-
nor, vtraq; acris est. Excalscit, & vrinā mo-
uet,

met, accensa serpentes fugat. Baccarum nonnullæ
nucis inglandis magnitudine nonnunquam gran-
descere, aliæ & nucem Ponticam æquare inueniun- *Auellanæ
tur: rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, suba- intellige.
maræ, quæ arceuthides etiam, id est baccæ iuni-
peri, nominantur. Modicè calfaciunt, & astringunt, stomacho vtilis: cōtra pectoris vitia, tussim,
inflationes, tormina, & serpentium ictus effica-
cissimè bibuntur: vrinam cient, vnde ruptis, con-
uulsis, & vuluæ strangulatui subueniunt. Folia
acrimoniam habent: idè tam ipsa, quàm eorum
succus ex vino contra viperarū morsus illini aut
bihi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras
eximit. Ramenta ligni deuorata interficiunt.

Herba Sabina. CAP. LXXXVIII.

Sabina duorum generum est. Vna folijs cu-
presso similis, spinis horridior, grauitè olens,
acris & feruens: arbor est coacta breuitatis, quæ
se se magis in latitudinē fundit: huius folijs nōnul-
li pro suffitu vtuntur. Altera tamarici folio simi-
lis est. Vtriusque folia nomas sistunt, collectiones
illitu mitigant, & cum melle nigritias sordesq;
repurgant, carbunculos cum vino pota rumpunt,
sanguinem per vrinam eliciunt, partus apposita
extrahunt, & suffitu idē præstant, vnguentis cal-
facientibus immiscetur, & priuatim gleucino.

Cedrus. CAP. LXXXIX.

Cedrus arbor magna est, ex qua picem colli-

Cedrus
mortuorū
vita di-
eta.

gunt, quæ cedria vocatur: iuniperi modo baccas
parit: baccarū myrti magnitudine, rotundas. Ce-
dria optima est crassa, perlucida, grauis odoris:
quæ dum effunditur, guttatim non dissipata coit.
Cui ea vis inest vt defuncta corpora conseruet, &
viuentia corrumpat: quæ ex causa mortuorum vī
tam aliqui appellauere. Vestimenta quoq; & pel-
les eximia calfaciendi & siccandi dote, corrūpit:
magni ad ocularia medicamenta vsus, quippe illi
ta oculis claritatem affert, albugines cicatricesq;
detergit, instillata autē cum aceto vermes aurium
necat, cum hyssopi decocto infusa sonitus sibilosq;
sedat, canis dentium indita eos frangit, & dolo-
res leuat, idem facit cum ex aceto colluitur: perun-
cto ante coitum genitali abortiuum fieri constat,
angine ea perunguntur, tonsillarum inflamma-
tionibus auxilio est, lentes pediculosq; illitu ene-
cat, cerastæ morsibus cum sale imposita subuenit,
cōtra hausta leporis marini venena, in passo sum-
pta, auxiliatur: in elephātia, aut linctū, aut per-
unctione proficit: pulmonum vlcera purgat, & si
cyatus eius sorbeatur, persanat: vermes & tineas
subter indita necat, & partus extrahit. Fit &
oleū, à cedria separatum, dum coquitur, velleribus
supra halitū eius expansis, vt in pice. Eiusdem ad
omnia vsus: priuatim vehementer perunctum sca-
biem quadrupedū, canum, boum q; persanat: inhe-
rentes ricinos enecat, vlcera quæ ex tōsura accepe-
runt,

runt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus vocantur. Calfactoriam vim habent, stomacho aduersantur, auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguriæ: menses ciunt, ex polline piperis poti: contra haustum leporē marinum in vino sumuntur, serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino aut medulla, corpore: in antidota adduntur. Fuliginem, quomodo ex pice, congeri oportet, quæ eandem, quam picea fuligo vim præbet.

Laurus.

CAP. XC.

Laurus quædam tenui folio constat, altera latiore. Vtraq; ex calfactoriam naturā habet, & emollientem. Vnde decoctum earum in mulieres infessus additū, vuluæ & vesicæ vitij conuenit. Virētia folia sensim substringunt: illita quoq; ac trita vesparū apiumq; ictibus opitulantur, eadem cū polēta & pane illita inflammationem omnē mitigant, sed pota stomachū effundūt, & vomitiones mouent. Lauri bacca magis, quàm folia calfaciūt: ergo in eclegmate tritæ cū melle vel passo prosunt tabi, orthopneæ, & omnibus thoracis rheumatismis: cōtra scorpionū ictus ex vino bibuntur, vitiliginēs emaculāt. Succus baccarū utilis: imē auriū dolori, & grauitati instillatur, cū vino vetere, & rosaceo. In medicamenta autē adiūciuntur, quæ neruorū lassitudines reficiūt, ac opavocāt: & ad vnguēta, quæ calfaciūt, & discutiūt. Cortex radis calculos rumpit, partus necat, hepaticis

prodest, tribus obolis in vino odorato potas.

Platanus. CAP. XCI.

Tenerrima platanī folia in vino decocta, mox illita, oculorū fluxiones sistunt, tumores, & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dētes in dolore colluit. Virides pilulæ in vino potæ, serpentīū morsibus auxiliātur: exceptæ autem adipe, igni ambusta sanant. insulens foliorum pilularūq; lanugo, oculos & aures offendit.

Fraxinus. CAP. XCII.

Fraxinus arbor nota est, cuius foliorum succus, & ipsa peruncta, aut ex vino pota, viperarum icibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus leprās eximit. Ligni ramenta, scorbemq; potu perniciem asferre tradunt.

Populus. CAP. XCIII.

Potus albae populi cortex vniæ vnius pondere, ischiadicis ac vrinae stillicidio prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino rene bilatur. Folia quoq; cū vino post purgationes pota, idē pręstare prodūtur. Tepens foliorū succus vtiliter aurīū dolori instillatur. Pilulæ, quæ primo foliorū partu exiliunt, illitæ cū melle, oculorū hebetudini medētur. Memoriae prodiderūt, corticē albae populi, & nigrae particulatum casum, & sulcis stercoreatis mandatū, omni tēpore anni edules fungos proferre. Populi nigrae folia cū aceto illita, magna vtilitate podagricis doloribus illinūtur. Resinam

popu

populus fundit, quæ in malagmata additur. Semē potū ex aceto comitialibus vtile est. Lacrymā populorū cōmemorāt, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinum, quod electrum De ortu ele
vocat, alij chrysophorum. Id attritu incundum Etri multa
odorem spirat, & aurum colore imitatur: tritum lib. vltimo,
potumq; stomachi ventrisq; fluxiones sistit. cap. 3. et 4.
apud Plin.

Macer. CAP. XCIIII.

MAcer ex Barbaria aduehitur, cortex flavescent, crassius, gustu perquam astringens: qui contra cruentis excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

Vlmus. CAP. XCV.

VLmi & folia & cortex & rami, vim habet spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur, vulnera glutinant, sed multo magis corticis tilia, si fascia loco intorqueatur: nam in lori more flecti potest. Crassior cortex in vino aut aqua frigida vnciatim potus, pituitas trahit: fracta ossa celerius solide sciūt, si decocto foliorū corticis aut radicis foveatur Humor in folliculis enascens prima germinis eruptione, cuti illitus nitore inducit, faciemq; splendidiorē præstat. Qui dum siccatur, in animalia abit, quæ culicum formam gerunt. Folia cum tenerescunt cocta, olerum more ad obsonia vsurpantur.

ELignorum marcor. CAP. XCVI.
EX candicibus lignisq; veteribus caries cōge-

ritur, quæ farina modo illita, vlcera purgat, et ad cicatricem perducit: serpentia colibet, si cum pari aniso & vino subacta, linteisq; imposita illinatur.

Harundo. CAP. XCVII.

IN harundinum genere quedam nascos, id est farctior, vocatur, ex qua sagitte factitari solent. Alia femina, qua tibiæ ligulas efficiunt. Alia quod fistulis addicta sit, syringias: cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concaua, apud omnes nascens: quæ à quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. Alia phragmites seu vallatoria, gracilis, candicans, vulgò cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosq; corpore extrahit: luxata, lumborumq; dolores cum aceto mulcet. virentia folia tusa & imposita ignibus sacris medentur, & ceteris inflammationibus. Corticis cinere peruncta cum aceto alopecie sanantur, panicula lanugo si aures intrauerit, exsurdet. Eundem effectum implet harundo quæ cypria dicitur.

Papyrus. CAP. XCVIII.

Papyrus qua chartæ fiunt, nullis non cognita, præcipue in medicina vtilitatis, ad laxandas fistulas: madefacta lino inuoluitur, vsque dum inaruerit: constricta enim atque immissa in hiatum, humore completur, & intumescendo fistulas operit. Habet nescio quid alimeti radix: itaq;

Aeg

Aegyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & māsam expuunt. Ipsius radicibus pro ligno vtuntur. Cremata papyri cinis depascētia vlcera cum omnium partium, tum oris maximē, cohibet: verum melius id combusta charta præstat.

Myrica. CAP. XCIX.

MYrica seu tamarix arbor vulgo cognita Officinis est, cum apud pigras & stagnantes aquas Tamari- enascatur, fructum quasi florem, ferens compage scus. muscosum. Aegyptus Syriaq; alteram gignunt mitiorem, syluestri cat. ra similem. Fructum parit gallæ proximum, inaequaliter astringentem gustu: quo conuenienter vtimur vice gallæ in medicaminibus oculorum orisq;. Datur cruenta ex- creationi in potu, & cæliacis, & cōtra profluvia feminarum, regium morbum, & phalangiorum morsus: illitus tumores inhihet. Cortex in eosdem vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino po- tum, lienem absumit: ad dolorem dentium in col- lutionibus salutare, & mulieribus fluxioni vulua opportunis in desefisionibus, phthiriasi lendibusq; circumfusum prodest, abundantia feminarū sistit impositus arboris cinis, potorios calices è caudice lienosis moliuntur, quò datus in his potu proficiat.

Erica. CAP. C.

Erica * fruticosa arbor, myrice similis, longē * Plin. fru- minor: cuius flore apes reprobiū mel efficiunt, ticē dicit. tā flos quā comā serpētū iētibus illitu medetur.

Acacalis.

CAP. CI.

Acacalis fructus est nascētis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadamtenus similis: cuius aqua in qua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

Rhamnus.

CAP. CII.

Rhamnus fruticat in sepibus, ramos ferens rectos & aculeos in acutæ spinæ modū, folijs paruis, oblongis, suppinguib, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus latioribusq; folijs constat, & quadamtenus rubētibus: cuius rami quinūm ferè cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus minusq; rigētibus aculeis. Fructum ædit latū, candidū, tenuem, folliculari specie, & verticillo similē.

* τοικὸς ἄ-
σφοδ' ἔλω,
id est, a-
sphodeli fru-
ctui similē.

Omnium folia igni sacro, & serpentibus vlceribus, efficaciter illinuntur. Fam. i est ramos huius valuis fenestrisve impositos, veneficia depellere.

Halimus.

CAP. CIII.

Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis rhamno, sine spinis, folijs oleæ, sed latioribus: nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Radix, conuulsa, rupta, torminaq; mitigat, drachmæ pōdere in aqua mulsa pota: eadem lactis vbertatem facit.

Paliurus.

CAP. CIIII.

Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum in-

nep

venitur: quod potum tussi opitulatur, vesicæ calculos comminuit, serpentium ictibus aduersatur. Folia & radix astrictoriam vim habent: quorū decoctum potu aluum sistit, vrinam trahit, contra venena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresq; omneis discutit, rita & imposita.

Acuta spina.

CAP. CV.

Acuta spina, quam pyrinā aut pityanthem *Officinarij* aliqui vocant, arbor est pyraastro similis, *Berberis.* spinosa valde & minor, baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem multifidam, altè descendentem. Huius bacca potu aut cibo, alui profluuium, & abundantiam feminarum sistunt. Radix illita aculeos & spicula extrahit, abortum fieri tradunt, si ter radice venter, aut sensim feriat, aut perungatur.

Rubus canis.

CAP. CVI.

Rutex est arboris instar, rubo longè maior: folia fert multò latiora myrto, robustis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: feruefacti enim in vino, mox poti, arteriam infestant.

Ligustrum.

CAP. CVII.

Ligustrum arbor est oleæ folijs circum ramis similibus, latioribus, mollioribus, & *Alcanna* colore

colore viridioribus: flore candido, muscoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope & Ascalone. Folia astringentiam vim habent: quare commanducata ulceribus oris medentur, illita fevuidis inflammationibus, carbunculisq; prosunt, decocto eorundem igni ambusta foveuntur, capillum rufant trita folia, quæ in radicle succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat Cyprinum oleum quod ex eo fit odoratum, excalfacit, emollitq; nervos: si quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

Tilia.

CAP. CVIII.

Χρίμα.* **Tilia arbor est ligustri magnitudine, folijs oleæ, nigrioribus & latioribus, fructu **lenitisci*, nigro, subdulci, racematim coherente, asperis nascitur. Huius folia astringunt: ad eadem uti lia ad quæ oleaster, cum astringente est opus: maxime ad oris ulcera, commanducata, aut si decocto colluantur: pota urinam ac menses cient.

Cistus.

CAP. CIX.

Cistus, quæ aliqui citharon, aut cissarō vocāt, Cramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascēs, folijs rotundis, acerbis, hirsutis. ** Vox ex flos * masculo ut mali punice, fœminæ albet. Vis astringēs: unde flores in vino austero bis in die positi, p sunt dysentericis, & nomas per se illiti cohibent, vetustati ulcerū, & igni ambustis cū cerato medetur. Hypocistis, orobethrō, aut cytinus à nō-*

nul

ullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur,
oris punice similitudine. Quædã rufa, altera her-
acea, tertia candida. Liquatur acaciæ modo. Ali-
ui tamẽ exiccãt, fractãq; macerãt, & incoquũt,
eliquaq; vt in Lycio prosequuntur. Vires acaciæ
abet, verum aliquanto magis siccatur, & astringit.
Prodest dysentericis, coeliacis, sanguinem ex-
creantibus: foeminarũ profluuiũ & pota et indita.

Ladanum.

CAP. CX.

Est & alterum cisti genus, ledon à nonnullis
appellatum, frutex simili modo nascens, lon-
gioribus folijs & nigrioribus: quæ verno tempo-
re quiddã contrahũt pingue. Foliorum vis astringens,
ac eosdem quos cistus effectus præbens. Fit
ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti *Colligendi*
frondes pascuntur capræ, hirciq; pinguitudinem ladani mo-
conspiciuẽ barba carpunt, & suo lentore villosius
cruribus adhaerentem reportant: quam depe-
stentes incole, colantesq; cogunt in offas, & ita
recondunt. Alij verò attractis funiculis, insiden-
tem fruticibus lentorem abstergunt, conglome-
rantq; in ladanũ. Maximẽ probatur odoratum,
subuiride, facile mollescens, pingue, quod arenas
non collegit nec squalore obsitũ est, resinosum qua-
le in Cypro gignitur. Arabicum verò Libycumq;
vilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, mollien-
di: ora venarum patefacit, capillum fluentem con-
tinet, addito vino, myrrha, & myrteo oleo: cicat-
trici

tricibus decorem reddit, cum vino illitū: medetur aurium doloribus, cū hydromelite aut rosaceo infusum: suffitus secundas eicit, pessis immistū vna duritiem sanat, in medicamenta quæ dolore tuncq; finiūt, & malagmata vtiliter inferitur: aurium sistit cū vino vetere potum, & vrinam cito

Ebenus.

CAP. CXI.

Ebenus optima habetur æthiopica & nigra. Nullos habet venarum discursus, factitij coloris leuore: cū frangitur densa apparet, mordacitatem, atque leniter astringens. Suffitur incuncto odore supra carbonēs, sine fumi tædio. Recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem rufescit. Altera est indica, internatis segmentis candicantibus, & modicè fuluis, item frequentibus maculis: cæterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdā sesamina aut spinea ligna consimilia pro ebena vaneunt quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resolvuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentia in suffitu præferentia. Caliginem oculorum absterget, ad veteres destillationes pustulasq; mirū in modum proleat: si quispiam facta ex eo coticula collyrijs vtatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentave vino Chio die noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli prætrita ipsa excolant, reliquaq; eundē in modū peragūt. Alij pro

vi

ino aqua vtuntur. Vritur in fictili nouo, donec
carbones redigatur. Lauatur plumbi vsti mo-
do, & ita siccis scabrisq; lippitudinibus conducit.

Rosa.

CAP. CXII.

Rosa refrigerat & astringit, sed sicca mul-
to magis. Succus recentibus folijs exprimi-
ur, defectis forfice vnguibus (sic appellatur can-
didæ foliorum partes) reliquum in pila premi &
eri debet in vmbra donec cogatur, & ita ad o-
culorum circumlitiones recondi. Siccantur etiam-
um folia rosarum, continuo versata, ne muceat,
neve situs in ijs insideat. Aridis rosis & in vino
lecoctis expressus liquor, facit ad dolores capitis,
iurium, oculorū, gingiuarum, sedis, recti intesti-
ni ac vuluæ, penna illitus aut infusus. Eadem sine
expressione tusa, præcordiorum inflammationibus,
humidis stomachi vitijs, igni sacro illini prodest:
siccis ac tritis femina asperguntur. Misceri solent
vulneratijs antidotis, atq; cōpositionibus, quas an-
theras vocant. Folia vruntur in calliblephara.
Rosas qui in medijs rosis inuenitur, siccatus, gingi-
uarū fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita
pota citam aluiū, & cruentas reiectiones sistunt.

Rosei pastilli.

CAP. CXIII.

Pastilli quos rhodides vocant, hac ratione
conficiuntur: Rosarum viridium, quæ nul-
lo antea humore madefactæ extabuerint, dra-
chma quadraginta, Indicæ nardi drachmæ de-
cem

Quid vn-
guis in ro-
sa.

cem, myrrhae drachmae sex, tritae digeruntur in
pastillos, qui trium obolorum pondus aequent: sicca-
tiq; in umbra, in fictili non picato, atq; obturati
reconduntur. Alij adijciunt costi drachmas duas
iridis Illyricae totidem, & vinum Chium cum me-
le miscent. Mulieribus monilium vice collo circun-
dato vsui sunt, ad retundendum graue sudoris vi-
rus. Tritis etia vtuntur ad illitiones & diapaema-
ta, quae sunt ad sudores coercendos, ita vt a balnei
inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

Lycium. CAP. CXIII.

Lycium, quod aliqui pyxacanthan vocant,
arbor est spinosa, ramis trium cubitorum,
aut longioribus: folijs buxi, densis: fructu pipe-
ris, nigro, leui, amaro, densoq; cortice pallido, non
dissimili lycio madefacto: radicibus multis, obli-
quis, lignosis. Nasclitur plurimum in Cappado-
cia, Lycia, & plerisq; alijs locis. Aspera loca a-
mat. Succı extrahendi ratio haec est: Rami cum
radiculis tusi & ante per multos dies macerati
coquuntur, tum abiectis lignis itidem liquor, do-
nec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium,
adiecta decoctioni amurcae, aut absinthij succo,
aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquen-
dum exempta, oculorum medicamen: is additur:
reliquo ad alia vtuntur. Simili modo fit lycium,
semine expresso & insolato. Optimu quod vri po-
test, restinctumq; rubetem spumam ostendit, gle-
bis

bis extrinsecus nigris, intus, cum fregeris, rufis,
 & odore minimè viroso, cū amaritudine adstringit. * Ita ex Plē
 gens, crocino colore (cuiusmodi Indiciū est) ceteris nio.
 prāstātius atq; efficacius. Lyciū adstringit, cali-
 ginem oculorū discutit, genariū scabiem, pruritus,
 veteresq; fluxiones sanat: facit ad purulētas au-
 reis, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorū fissu-
 ras, sedis rimas, attritusq; illitū: celiacis, dysente-
 ricis, potiū inditumq; cōuenit: datur sanguinē ex-
 creantibus & tussi, ex aqua: contra rabiosi canis
 morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua libi-
 tur: flauos facit pilos: reduuijs, vlceribus quæ ser-
 punt aut putrent, medetur: foeminarū profluvia
 appositū sistit: rabiosorū iclibus ex melle potum,
 aut vice catapotij deuoratum, auxiliatur. * Tra-
 dunt Indicum fieri lyctum, ex frutice lonchitide
 appellato: ea spinarum generi ascribitur, ramos
 rectos habens ternū cubitorum longitudine,
 maioresve, rubo crassiores, à radice numerosos.
 Fractus cortex rubescit, folia olea similia. Herba
 in aceto decocta proditur lienis inflāmationibus
 & regio morbo mederi, & foeminarū purgatio-
 nes elicere. Assēuerāt etiā crudam in potu, eosdem
 effectus prāstare. Semen cyatho dimidio potum,
 pituitam expurgare: venenis quoq; auxilio esse.

Acacia.

CAP. CXV.

Acaria in Aegypto nascitur spina instar ar-
 boris, fruticosa, non se in rectum attollens.

F

* Videntur
 Marcello
 quæ hinc se-
 quuntur, no-
 tha.

* Non est
 genuina ofe-
 ficinarum
 Acacia,
 quāuis ea-
 dem vi ac
 natura præ-
 dita,

Florem habet candidū, & semen lupino simile in
 folliculis, ex quo succus expressus siccatur in um-
 bra, niger ex maturo semine, subrufus ex viridi.
 Eligat modicè rufus et odoratus, ut in hac arbo-
 re esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs & semi-
 ne succū. Manat et gummi ex ea spina. Vis ei ad
 spissandū, refrigerandūq; efficax. Succus oculo-
 rum medicamētis utilis: valet ad ignem sacrum:
 ulcera quæ serpūt, perniones, pterygia, et oris ul-
 cera: procidētes oculos reprimat, mensū abundan-
 tiam sistit, prociduā vuluā colibet: citā aluū sup-
 primit, aut potus aut subter inditus: capillos deni-
 grat. Lauat oculorū medicamētis, trito in aqua,
 mox effuso quod cōcreuerat, donec pura extet a-
 qua: et ita cogitur in pastillos. Vritur etiā in cru-
 da fidelia, donec fictile formacibus percoquatur:
 torreturq; in carbonū halitu perflata. Spina de-
 coctum solutos artus fotu committit. Praefertur
 eius spinæ gummi, quod in vermiculorū speciem
 contrahatur, & vitri modo perlucet, ligni ex-
 pers: proximum est candidum: sordidum verò ac
 resinofum inutile. Cutis meatus obstruit, & me-
 dicamentorum quibus admiscetur, acrimoniam
 hebetat, ambustis ex ovo illitum, pustulas non pa-
 titur erumpere. Alterum acaciæ genus in Cap-
 padocia Pontoq; provenit, Aegyptiæ spinæ si-
 militudine, longè minus, tenerius, humile: aculeo-
 rum vallo munitur, folia habet rutæ. Semen len-
 ticula

ticula minus fert autumnis, in loculis cōnexis, ternum quaternumve capacibus. Succus eius adstringit, viribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

Vitex.

CAP. CXVI.

Vitex siue lygos frutex est in arborem assurgens, nascitur in fluminū ripis, asperisq; locis, ac torrentiū alueis: ramos gerit longos, fractu peruiaces: folia oliuæ, sed molliora. Duo genera eius, vna harū album florē mittit cū purpureo: altera tantū purpureū, & semen, vt piper. Excalfactorias vires habet, & adstrictorias. Semen eius potū venenatis ichibus, aquæ quæ cutē subijt, lienosisq; auxiliatur: lac euocat, menses ciet: drachmæ pōdere in vino potū: genitura exoluit, caput tentat & soporē affert. Decoctū herba & seminis in desessione, mulieribus vuluæ malo opportunis opitulat, itē inflammationibus: purgationes mouet semē cum pulegio potū, etiā suffiū vel appositū: capitis dolorē dissoluit illitum, instillatur cum aceto & oleo capiti in lethargo & phrenitide. Folia suffitu aut substratu fugant venenata: illita quoq; serpentiū morsibus auxiliantur: testium duritias cū butyro & folijs vitū emolliūt: rimas sedis semen cū aqua illitum mitigat, & cū folijs medetur luxatis, vulneribusq;. Virgam qui manu teneat dum iter facit, negatur intertriginē sentire. Agnum, quasi dicas castum, vocant Grægi ratio.

Barbaris
agnus castus.

Nominum
agni & lygi ratio.

ci, quoniam matronæ in thesmophorj's Athenien-
sum castitatem custodientes, folijs huius cubi-
tus sibi sternunt. & lygon quasi vimen, propter
inuiictam ferè ramorum flexilitatem.

Salix.

CAP. CXVII.

Salix vulgo nota est: cuius semen, folia, cortex
& succus spissandi vim habet. Trita folia cū
exiguo pipere & vino pota, ileosis subueniūt: sum-
pta per se & cū aqua præstāt mulieribus ne cō-
cipiant. Salignum semen in potu sanguinem ex-
pulentibus prodest: cortex eosdem præbet effectus.
Corticis cinis admisto aceto maceratus, illitu
clauos & callos tollit. Ex folijs & cortice succus
cū rosaceo in calyce punici calfactus, aurium dolo-
ribus auxiliatur. Decocto eorum podagras foueri
vtilissimum: furfures purgat in corpore. Excipi-
tur succus qui manat ex ea cum floret, exciso cor-
tice. in plaga enim cōcretus humor inuenitur, qui
ad purgāda, quæ obstat oculis, suam vim præbet.

Sylvestris olea.

CAP. CXVIII.

Sylvestris olea, quam Latini oleastrum appel-
lant, alij Aethiopicam oliuam, folia astrin-
gunt: trita autē & imposita ignem sacrum, vl-
cera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, re-
duuias nomasq; colibent: crustas emarginant
cum melle illita. Quinetiam sordida vlcera repur-
gant: inflammationes panosq; cum melle impo-
sita discutunt: cutem à capite vulsam conglu-
nant:

nant: oris vlceribus, & priuatim infantium, cō-
māducata medentur. Succus & decoctū eisdem
habent effectus: sanguinis eruptiones, ac muliebre
profluuiū, admotus succus inhibet: vna oculorū,
pustulisq; prodest: vlcera & veteres defluxiones
sistit, (quapropter in collyria additur.) ad gena-
rum erosiones perquā vtilis. Exprimatur succus
tuis folijs, affuso vino aut aqua, siccatusq; sole in
pastillos digeritur: sed longè validior ad recōden-
dum succus habetur, qui cū vino quā cum aqua
expressus est. Auribus subuenit, siue vlcerentur, si-
ue pus effluat. Folia cōuenienter celiacis cum fa-
rina hordeacea illinuntur: Vruntur cū floribus fo-
lia, vt spodij vicē cinis prāstet, in cruda olla, obli-
to ore luto, vsquedū figlinum percoquatur: restin-
et aq; vino & rursus subacta, eodem modo vtun-
tur, postremo cerusæ modo elota coguntur in pa-
stillos. Huiusmodi cinerem in medicamētis ocu-
lorū constat spodio nō cedere, sed eisdem viribus
præditū esse putandū est. Foliorū sativæ oleæ ea-
dem vis intelligitur, sed aliquanto inferior: vnde
ocularibus medicamentis ob suam mitiorē vim cō-
uenientior est. Sudor ligno virenti accenso ma-
nans, illitu sanat lichenas, furfures & scabiem.
Oleaginum semen illitum medetur furfuribus, et
vlceribus quæ depascūt vorantq;: quod autem in-
tra nucleum est, ex adipe & farina scabros un-
gues excutit. Colymbades trita & ambustis il-

litæ pustulas gigni prohibent, sordida ulcera purgāt, muricæ succus collutas gingiuas cōtrahit, & motus dentiū firmat. Oliua flaua & recēs stomacho vtilior est, vētri difficilis: nigra autē et matūra corruptioni opportuna est, stomacho aduersat, oculis nō cōuenit, capitis dolorem mouet, arefacta illitu depascētia ulcera sistit, et carbūculos emarginat. Oleū syluestris oliuæ gingiuis putri vligine laborātibus colluitur, dentiū mobilitates stabilis, calfacti fatus gingiuis fluxiōe laborātibus vtilis est: lanā enim specillo circumligatā oleo madefacere oportet, et gingiuis admouere, donec albæ spectetur. Lacryma æthiopica olea.

CAP. CXIX.

Lacryma quam æthiopica olea stillat, scammonio similis quodātenus est, fulua, stillis exilibus constans, mordax: quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates olea, olea syluestrisq; similem lacrymā sudant, quæ commodè ad oculorum hebetudines illinitur: cicatrices albuginesq; illitu emendat, vrinam & menses ciet, cauis dentium impressa ad dolores efficax est: inter venena scribitur: partus pellit, lepras & impetigines sanat. Appellatur autem æthiopica & agrestis olea.

Amurca.

CAP. CXX.

Amurca (expressæ oliuæ recrementum) decocta

cocta in cupreo vase ad crassitudinem mellis adstringit, ceteros præbēs lycij effectus. Insuper dentium dolori et vulneribus, cū aceto, vino aut mulso cōmodè illinitur: additur in medicamēta ocularia, & meatus inductu suo obstruētia. Vetustate meliorē fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, ac viduæ exulcerationi. Si verò cū omphacino recoquatur ad mellis crassitudinē, cariosos dentes extrahit: iumentorū scabiē cum decocto lupini, & chamæleonte illitu sanat. Cruda & recenti amurca podagras articulariosq; dolores foueri, vtilissimum: peruncta in villosa pelle, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimat.

Quercus, glans, fagus.

CAP. CXXI.

Quercus omnis adstrictoriam vim habet, præsertim liber qui cortici & ligno intercedit: quinetiam tunica putamini glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysentericus, coeliacis, sanguinem excreantibus. Trita in peso, feminis fluxione vuluæ laborantibus subijcitur. Glandes eodem effectus exhibent: urinam ciunt, capitis dolorem & flatus in cibum sumptæ pariunt, resistunt esitate venenatorum ictibus. Decoctum earum & corticis cum lacte vaccino potum, prodest contra toxica: intritæ crudæ, inflammationes illitu leniunt: ad duritias quas caecothæ vocant, & malefica vlcera cū salsa axun-

F 4

gia conueniunt. Iligneæ glandes viribus quernas antecellunt. Fagus & ilex quercus generi assignantur, & consimile munus obeunt. Iligneæ radicis cortex cum aqua coctus, dum mollitus intabescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium trita & trita tumoribus prosunt, & imbecillas membrorum partes corroborant.

Castaneæ.

CAP. CXXII.

Sardianæ glandes, quas aliqui castaneas, aut slopima, aut glandes Iouis appellant, adstringunt, similesq; effectus præbent: præsertim tunica quæ carnem et corticem media intercurfat. Caro his qui ephemerum biberunt, conueniens est.

Galla.

CAP. CXXIII.

Galla fructus est quercus, Aliqua omphacitis appellatur, parua quidē sed tuberosa, solida, nullo foramine peruiā. Altera plana, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior est. Vtriusq; vis vehemēter adstringere. Trita excrecētia in carne, fluxiones gingiuarū & ruc, atq; oris vlcerationē cohibent. Nucleus, dentiū caueris inditus dolorem sedat. Crematæ carbonibus donec igne flagrent, & vino aut aceto aut acidamuria extincta, sanguinē supprimunt. Decoctum quibus insidere expedit, efficax est, & cōtra vulnas procidentes, fluxionesq;. Capillos denigrant, aceto aut aqua macerata, dysentericis cæliacisq;

cum

cum vino aut aqua trita cōueniēter illinūtur, aut bibuntur: obsonijs addi debēt, aut integræ in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum est: quod his affectibus conferat. In summa, his vtendū ad adstringenda, aut succanda quæ opus sunt.

Rhus.

CAP. CXXIIII.

RHUS quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus *Officinis* erythros appellata, semē est coriarij fruti- *sumach,* *Arabum* cis, sic vocati, quoniā coriorū infectores eo vtunt, *more.* ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris nascēs, binū ferē cubitorū altitudine, folijs oblongis, sub- rubētibus, in ambitu serratis, acino vuarū graciliū denso, magnitudine terebinthi, quadāmtenus lato: cuius corticosa tunica perquā vtilis est. Folia vine habent adstringendi, & acaciæ effectus præbēt. Decoctū capillos denigrat, dysentericis infunditur, & in potus eorū infususq; adiicit: instillatur auribus purulentis. Gangrēnas & pterygia cohibēt folia ex aceto aut melle illita. Lique- mentū fit ex aridis folijs, ad crassitudinē mellis in aqua decoctis, at eadē, vt lyciū, conueniēs. Semen eosdē effectus exhibet: cæliacorū, dysentericorūq; obsonijs inspergitur: fracta, desquāmata, liuidaq; illitum ex aqua, ab inflammatione vindicat: lingue asperitates cum melle abstergit, candida fo- minarum profluvia sistit, hæmorrhoidas sanat, cum querno carbone intrito admotum. Aqua in quo semen maduit decocta, cogitur coitq; effica-

cior ipso semine. Gummi defert, quod dentium ca-
vis imprimitur, ad dolores finiendos.

Palma.

CAP. CXXV.

Palma in Aegypto gignitur. Ea medio matu-
ritatis vigore, autumnno decerpi solet, Arabici
myrobalani similis, pomatis cognomine, colore vi-
ridi, & odore mali cotonei: quod si ad maturita-
tem peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet. Pal-
ma acerba est & adstringēs: cōtra alui fœmina-
rumq; profluaia, in vino austero hibitur: hæmor-
rhoidas sistit, vulnera glutinat illitu. Phœnicoba-
lani recētes plus siccis adstringūt, capitis dolorem
asserunt, cōpiores in cibo inebriāt, sicciores san-
guinem excreatibus, stomachicis, & dysentericis
vtilis in cibo: illinūtur cū cotoneo et cerato ænan-
thinovescæ vitij. Cariotæ, præsertim esu, faucium
asperitati medentur. Thebaicarū decoctū potu æ-
stuationē sedat, vires recreat cum hydromelite ve-
teri sumptū: cibo idem faciunt. Fit ex eis vinū ad
eadē conueniens. Decoctū per se potu & gargari-
zatione magnopere adstringit, & colibet. Nuclei
palmarum, caterorū more, cremati in crudo sicci-
li, & vino restincti, cinere loto, spodij vicem effi-
ciunt: miscenturq; in calliblephara. Quod si non
iustā vstionem acceperint, denuo cremandi. Vim
adstringēdi habent, et spiracula cutis obductu suo
claudunt: contra oculorum ruam & pustulas,
palpebrarum defluuia, cum nardo effectum præ-
bent:

hnt: corporis excrescentias cum vino reprimunt,
 vlcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas
 vtilis ex palmis humilibus Aegyptiae.

Palma elate. CAP. CXXVI.

Palma, quā aliqui elatē aut spathā appellāt,
 fructus palmarū adhuc florentiū, inuolucris
 est calix q; in quo in spissamētū vnguentarij vti-
 tur. Optima habetur odorata, adstringēs, pōdero-
 sa, praelusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria: si-
 stit vlcera quae depascunt, laxatos artus cōmittit,
 trita miscet cataplasmatibus & malagmatis: pro-
 dest prae cordijs, imbecilli stomacho, et iocineri affe-
 cto, mista cōferētibus cataplasmatibus. Eius decoctū
 subinde detersum, capillos denigrat: datur bibēdū
 congruē, renum, vesicae, et viscerū vitijs: vuluae ac
 vētris fluxiones sistit: scabiē cū resina, & cera sa-
 nat, si viginti diebus recens apponatur. Inuolu-
 tus q; in ea elate fructus, quē suo amplexu fouet,
 elate etiā vocari solet, & ab aliquibus borassus.
 Adstringit, & spathae effectus praestat, nō sic vn-
 guentis expetitus. Alba medulla caudicis recens
 ni cibo, aut decocta eadem facit, quae borassus.

Malum punicum. CAP. CXXVII.

Malum punicum omne boni succi est, stoma-
 cho vtile, perexiguum sufficiens alimen-
 tum. Dulcia stomacho vtiliora habentur, sed
 aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes
 pariunt, vnde in febre abdicantur. Acida ad-
 stric-
 Vulgò ma-
 lum grana-
 tum.

stringunt, æstuantî stomacho auxiliatur, & multo magis contrahunt, ac urinã cient. Ora gingivasq; lædunt. Vinosa verò mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorũ acidi punici in sole siccati, & obsonijs insparsi, concoctive, fluentem aluum stomachumq; sistunt, Cælesti aqua madescunt, bibunturq; comode sanguinẽ excreantibus: ad desensus dysentericorum feminarumq; fluxione vulvae laborantiũ vtilis sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, virilitatis, & sedis vlcera, nomas, reduvias, & ea quæ in corpore extuberant, aurium dolores, & narium vitia:

Cytinus. præsertim acidorũ. Huius flores cytini vocantur: qui adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant, quas punicũ, præstant utilitates: humida gingivarũ vitia mobilesq; dentes decocto colluuntur, herniã prolapsu intestini erumpentẽ cataplasmate repellunt, memoriæ tradunt, qui tres, quàm minimos cytinis deuorauerit, nullã eo anno lippitudinem passurum: eliquatur hypocistidis

Malicoriũ. exemplo. Malicorium, asperum est mali punici putamen, quod aliqui sidion appellant. Id spissandi vim habet, & quos cytini, præbet vsus. Decoctum radicis potu latas vètris tineas pellit, &

Balaustiiũ. easdem euocat. Balaustium sylvestris punici flos est, cytino similis, cuius complura genera reperiuntur: candidum, fuluum, colore rosaceo. Succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo, cui

adstr

adstrictoria vis inest, eadem faciens, quæ hypoci-
stis, & cytinus.

Myrtus.

CAP. CXXVIII.

MYrtus sativa nigra utilior est medicina
quàm cædida, et in hoc genere multò ma-
gis montana: semen tamen imbecillius parit. Vis
& myrti & seminis adstringit. Semē viride aut
aridum in cibo datur sanguinē excreantibus, et ve-
sicæ erosionibus. Succus virentibus baccis expres-
sus eosdē effectus exhibet: stomacho utilis, urinam
cit: prodest cōtra phalangij morsum, & scorpionis
iclus in mero: seminis decoctū capillū tingit, ius
decocti in vino vlcera in extremis membris nata
sanat, oculorū inflānationes illitum cū polline po-
lentæ lenit, cōtra egilopas illinitur, crapulā arcet
præsumptū vinū, quod feruefacto aliquantū eius
semine exprimatur: aliàs enim acorē cōtraheret.
Præstat idem seminis effectus. Utile procidentie
vulvarū in desensionibus, sedis vitij, & fæminis
fluxione vulvæ laborantibus: purgat fursures, vl-
cera capitis manantia, atq; eruptiones papularū,
fluentes capillos continet. Additur quoq; in me-
dicamenta, quas liparas vocant, uti oleum quod
ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad
desensiones balnearum convenit, & contra laxa-
tos artus, & malè solidecentes. Eo fracta ferru-
minationi repugnātia utilissimè fouentur, vitili-
ginem emendat, purulentis auribus infunditur, &
capē

capillos denigrat. Succus eadē efficit. Trita folia,
 & ex aqua illita humidis vlceribus, & parti-
 bus omnibus fluxiōe laborātilibus, celiacisq; pro-
 sunt: et admisto omphacino oleo, aut exiguo rosa-
 ceo cū vino, ad vlcera serpentia, ignem sacrum, te-
 stium inflammationes, & epinyclidas, & condylo-
 mata. Arentiū foliorū farina vtiliter inspargitur
 paronychijs, pterygijs, & cōtra alarū feminūq;
 perfusiones: cardiacorū sudores colibet. Folia cru-
 da seu cremata cū cerato, ambustis, paronychijs,
 pterygijsq; medentur. Exprimitur folijs succus
 adfuso vetere vino aut aqua cœlesti, cuius recētis
 vsus est: nam exiceatus planē cariem sentit, &
 vires amittit. Myrtidanū dicitur, adnatum inæ-
 quabile, verrucosum intumescensq;, & concolor:
 quod perinde quasi manus myrti caudicē ample-
 ctitur. Magis quā myrtus adstringit: tu sum ad-
 dito austero vino reponitur, coactumq; in pastil-
 los siccatur in vmbra, multo efficacius, & folio et
 semine, cerato, pēsis, in fessionibus, cataplasmatibus
 admistum, vbi adstringendum aliquid est.

Cerasia.

C A P. C X X I X.

Cerasia aluo vtilia sunt, si viridia sumātur:
 eadē siccata, illam sistunt. Gummi quod
 cerasi resudarunt, cum vino diluto tussi vetustæ
 medetur: colorem commendat, visum ex acuit, ap-
 petentiam inuitat: idem ex vino potum calculo-
 sis auxilio est.

Siliq

Siliquæ.

CAP. CXXX.

Siliquæ recētes stomacho aduersantur, aluum Graecis Cæ
soluunt: eadem siccata sistunt, stomachoq; ratia: arbor
tiliores fiunt. Vrinam ciunt, sed præcipuè, quæ autem ipsa
inaceis condiuntur.

Galeno cera.

Mala.

CAP. CXXXI.

tonia dicta.

Folia, flores, & germina cū omnis mali, tū tur.
maximè cotoneæ adstringunt. Pomis acer-
is adstringendi vis inest: maturis verò longè se-
us. Ex ijs vernabilē gignūt, nervos omneis lādūt,
nflationes pariunt. Cotonea stomacho utilia, vrī
am cient: verū tosta mitiora habentur. Prosunt
aliacis, dysentericis, purulenta extusientibus,
holicis, præsertim cruda. Maceratorū liquor cō
nodè in stomachi aut ventris fluxionibus, potui
latur. Succus crudorū assumptus orthopnoicis sa-
utaris est. Decocto fouetur vuluæ, & sedes si pro-
idāt. Cotonea quæ melle condiuntur, vrinā mo-
uent: mel autē sibi constringentē illorum vim, &
inspissantē adsciscit. Quæ cū melle coquuntur, sto-
macho atq; ori gratiora sunt, sed minus inspis-
cant. Cruda cataplasmatibus adijciuntur, ad cōhi-
bendū aluum, aut si stomachus æstuet, aut in vo-
mitiones effundatur, ad mammarum inflamma-
tiones, præduros lienes, & cōdylomata. Fit vinū
ex ipsis tuis expressisq;: sed quò perduret, quin-
decim sextarijs succivnus mellis adiungitur, alio-
quin in acorem degenerat. Prodest ad omnia.

qua.

quæ dicta sunt. Fit & oleū ex ijs, quod melinu
 vocauimus, quo vtimur quoties astringenti ol
 est opus. Eligi oportet vera, quæ sanè sunt rotūdi
 parua & odorata: quæ verò Struthia dicuntur
 magna quidē sunt, sed minus vtilia. Flos & v
 ridis & siccus cataplasmatibus imponitur: ijs cōue
 niens, quæ adstrictionē desiderāt, inflāmatroni
 bus oculorū, reiectionibusq; sanguinis. Cōtra cit
 aluum, & mensium impetus, in vino bibitur. M
 limela ventrē molliunt, & ab eo animalia expel
 lunt, stomacho negotiū exhibēt. Aestiosa. Ea mu
 tis dulcia mala vocantur. Epirotica mala, quæ
 Latine orbiculata dicunt, stomacho vtilia: sistun
 aluum, vrinas euocant, malis tamen cotoneis inue
 lidiora. Syluestria mala similia sunt vernis, &
 adstringunt. Sanè in hunc vsum immatura o
 mnia opus sunt. Persica poma matura tā stoma
 cho, quā vētri vtilia sunt. Acerba aluum cōhi
 bent, sed sicca vehemētius. Decoctū ē siccis alui sto
 machiq; fluxiones sistit. Armeniaca, quæ à La
 tinis praeocia dicunt, minora sunt supradictis, et
 stomacho vtiliora. Medica mala Persicave aut
 cedromela, quæ Latini citria vocant, nemini non
 cognita. Arbor ipsa omnibus anni tēporibus po
 mifera, alijs deciduis, alijs subnascētibus. Malū
 oblongū est, rugosum, colore aurū imitās, cū gra
 uitate odoratū, semen habet pyri. Id in vino potū
 venenis resistit. aluū mouet, oris suauitatem com
 mendat

mendat, decocto eius colluto, aut succo: estur in malacia mulieribus: vestiarijs impositum ab erosionis vitio vestes vindicare existimatur.

Pyra.

CAP. CXXXII.

Pyrorum multa genera, quæ tamen omnia adstringunt: proinde adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum è siccis & cruda ipsa aluum sistunt: ieiunos esitata ledunt.

Achras pyrastræ genus est, quod tardissime ematurescit. Vim pyro adstringentiorē habet, & ad eadem conuenit: stringūt etiā eius folia. Ligni pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Mespilus.

CAP. CXXXIII.

Mespilus, quæ à nonnullis aronia vocatur, spinosa arbor est, folio pyracanthæ: fert pomum suaue, exiguo malo non dissimile, tribus intus ossiculis: quæ ex causa id nonnulli triccon appellauere. Tardè maturescit, esu adstringit, stomacho gratum est, aluumq; supprimit. Alterū mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui setanium, alij epimelida vocant. Arbor folijs mali, sed minoribus: pomum fert rotundum esui aptius, umbilico latiore: quod adstringit, seroq; maturescit.

Lotus arbor.

CAP. CXXXIIII.

Lotus arbor est vastæ magnitudinis, ferēs, baccam pipere maiorem, dulcem, cibis gra-

G

tam, stomacho facilem. Aluum sistit baccis. Ramentorum ligni decoctum siue potu, siue infusione dysentericis ac feminis fluxione vuluæ laborantibus, auxilio est, rufat capillos, citam aluum cohibet.

Cornus.

CAP. CXXXV.

Cornus dura arbor est, baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primū virent, dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem representant. In cibo adstringunt, profluvio alui atq; dysenteriae salutare, siue in edulio, siue in defruto exhibeantur. Muria, vt oliuæ, cōdiuntur. Sanies, quam virentia folia torrendo resudarunt, in peti-
gini conuenienter illinitur.

Sorba.

CAP. CXXXVI.

Sorba colore luteū referētia prius, quā maturescāt, dissecta & sole siccata mādunt, vt albū sistāt. eadē est functio molitorū farinae, si po-
lēta loco sumat: quod et decoctū eorū in potu præstat.

Prunus.

CAP. CXXXVII.

Prunus arbor est nota, cuius pomū estur: sed stomachū malè habet, aluum mollit. Syria ca pruna, & præcipuè quæ Damasci gignuntur, exlicata stomacho vtilia sunt, aluum adstringūt. Folia pruni in vino decocta collutione, & gargarizatu ruam, gingiuas, & tōsillas fluxione laborantibus reprimunt. Præstant idem syluestriū prunorum baccae, post maturitatē exiccatae: cum sapa verò decocta, stomacho vtiliores redduntur,
aluum

aluumq; magis adstringunt. Gummi prunorum
 agglutinat, potum in viuo calculos cōminuit: ex
 aceto quoq; illitum, lichenas infantium sanat.

Arbutus. CAP. CXXXVIII.

ARbutus siue vnedo arbor est cotoneæ malo
 nō dissimilis, tenui folio: *cuius fructus pri
 u magnitudinē implet, nullo intus nucleo: huic
 nemaculo cognomē est: maturus aut flauet, aut
 rubescit, in esu acerosus, stomacho aduersatur, ca
 pitisq; dolorem mouet.

Amygdalæ. CAP. CXXXIX.

AMygdalæ amarae radicū tritarū decoctum
 vitia cutis in facie corrigit: illitæ nuces idē
 munus præstāt, menses admotæ ciūt, capitis dolori
 auxiliant, illitæ fronti aut tēporibus cū aceto vel
 rosaceo: epinyctidas sanāt ex vino, itē putrescētia
 vlcera, & quæ serpiūt, & morsus canū cū melle:
 arū autē esu dolores finiuntur, aluum emolliūt,
 omniū faciunt, vrinā cient, cōtra sanguinis reie
 ctiones cū amylo assumuntur, renū vitij, et pul
 monū inflammationibus ex aqua in potu aut ecle
 rmate cū resina terebinthina dātur: calculosis dif
 ficiliq; vrinæ in passo auxiliantur, & illinctu cū
 nelle, & lacte hepaticis, tussi, & inflationibus co
 li, nucus auellanae magnitudine: quinis septenisve
 praesumptis ebrietatem non sentiunt potiores: vul
 nes si cum quadam esca eas vorauerint, emoriū

* Prunis
 magnitudi
 ne quidem
 hic fructus
 nequaquā
 cedit: cæte
 rum effigie
 adeo ex
 pressè re
 fert fraga,
 vt nil que
 at expres
 sius.

tur. Gummi eius calfacit, & adstringit: reijciē-
bus sanguinem, potū auxilio est: impetigines quae
summum corpus occuparunt, illitum cum acet-
to tollit: tussi vetustae cum diluto vino potum med-
etur: calculosis cum passō bibere prodest. E nucibus
gracis, dulces cibo idoneae, sed multo minus valent
in remedijs, quam amarae: attamen extenuant,
urinam ciunt, recentium esu cum suo putamine,
humida stomachi vitia emendantur.

Pistacia.

CAP. CXL.

Pistacia, quae constat in Syria gigni, pineis
nucibus similia sunt, & stomacho amica:
trita cum vino contra serpentium ictus prosunt,
sive edantur, sive bibantur.

Nux iuglans.

CAP. CXLI.

Nux iuglandes, quas nonnulli Persicas vocant,
sunt difficiles concoctu, stomacho inutiles,
biliosae, capitis dolore inferentes, tussientibus inimi-
cae, et vomituris ieiunis in cibo aptae. Cū ruta verò
& ficis praesumptae, et à summo cibo, venenis resi-
stunt: nec minus si à veneni haustu comedant: lar-
gius esitatae tineas latas pellunt, illinunt māmariū
inflammationi, abscessibus, luxatisq; cū mellis exi-
guo, et ruta: cū cepa autē, sale & melle, canis ho-
minisq; morsui proficiunt: tormina: cū calyce suo
perusta, et umbilico admotae, sedant. Putamen cō-
bustum tritūq; in oleo, et vino, infantium capite per-
uncto, nutrit capillū, alopecias repletq;. Sifunt mē-
ses

es nuclei vsti, si triti ex vino admoueantur: idem
 veteribus, illiti carbunculis, gangranis, & agi-
 opis medentur: alopecijs commanducati, & im-
 positi praesenti sunt remedio. Nucibus tussis oleū
 exprimitur. Recētes stomacho innocentiores sunt,
 utpote suauiores: itaq; allio mista eximunt acri-
 moniam. Liuores in corpore illitu tollunt.

Nuces auellanae. CAP. CXLI.

Nuces auellanae, quas & leptocarya vocant,
 stomacho infestae sunt: ipsae tamē tritae, &
 in aqua mulsa potae, tussi veteri medentur: tostae
 & cum exiguo piperis potae destillationem con-
 oquunt, crematarū cinis cum axungia aut adi-
 ue vrsi perunctis alopecijs capillum reddit. Aiunt
 nonnulli vsta earum putamina, & in cineris spe-
 ciem redacta, cum oleo, castorum oculorum pupil-
 lis infantibus demigrare, perfuso sincipite.

Morus. CAP. CXLI.

Morus arbor nota est, cuius fructus aluum
 soluit, stomacho inutilis est, & facile cor-
 ruptionē sentit. Hoc idē praestat mori succus: de-
 lectus autē aereo vase atq; insolatus, adstringen-
 sior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & ton-
 illarū inflammationes, addito mellis exiguo. Sed
 uolefcit vis eius, adiecto scissili alumine, galla,
 roco, & myrrha: itē myricae semine, iri, & thu-
 e. Immatura mori poma siccant, tusaq; acinorū
 hois vice obsonijs miscetur, ut exliacos iuuēt. Ra-

dicis cortex decoctus in aqua & potus alium refect
uit, latus ventris tinea excutit, his quoque auxiliatur
qui aconitum hauserunt. Folia trita ex aceto il-
lita, ambustis igni medentur, tinguntque capillum
vitiū & fici nigrae frondibus simul coctis in aqua
celesti. Succus foliorum cyathi mensura potus con-
tra phalangiorum morsus auxilio est. Feruefacti
corticis & foliorum iure dentes aptissime in dolore
colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in
ambitu scrobe, succum emittit, qui postmodum con-
cretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax
est: tubercula discuit, & aluum purgat.

SYCOMORUS. CAP. CXLIIII.

SYCOMORUM aliqui etiam sycaminum, id est, morum, vo-
cant, cuius fructus sycomorum etiam propter in-
efficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico si-
milis, frondosa, multo lacte abundans: folijs mori,
pomum ter aut quater anno fert, non ramis, ut ficus,
sed caudice ipso, caprifico non dissimile, dulcius
grossis, sine granis interioribus: quod non mature-
scit, nisi ungue aut ferro scalpatur. Nascentur plu-
rimum in Caria, Rhodo, locisque non multi tritici se-
racibus: ubi prouentu facundo restibilibusque iuuamen-
tum adfert, cum annonae caritas premit. Pomum alio
utile est, sed perquam exile praebeat alimoniam. Sto-
macho aduersatur. Succus primo vere tenera ar-
bore, antequam fructum ferat, eximitur, lapidis ictu
summo cortice desquamato: si enim altiore plaga

viol

violetur cortex, nihil effluet. Spongia aut vellere lacryma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta fictili vase reponitur. Vis succi emollit, vulnera conglutinat, discutit collectiones coctionem repugnantes: bibitur etiam aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones. Celerrimè teredinem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quæ cum sit vlmus, prædita tamen est folijs sycomori, fructu primi magnitudine, multo dulciore, supra dictis cætera similis.

Fici.

CAP. CXLV.

Fici maturæ recētes stomachū ledunt, aluiū solvunt: sed faciliē contracta ab eis fluxio sistitur. sudorē euocant papulasq; sitim sedant, colorem restringunt. Siccis natura excalfaciendi, vires alunt, sed sitim magis stimulant aluo vtilis, rheumatismis vētris & stomachi cōtraria: gutturi autē, arteriæ, renibus, vesicæ, & ijs quos longa valetudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus aptissima, feruefacta cū hyssopo & potæ, thoracē purgant: tussi veteri, diuturnisq; pulmonum vitijs conueniunt: aluum molliunt tussæ cū nitro & cnico, dein māducata. Decoctū arteriæ & tonsillarū inflammationibus gargarizatu prodest. Cum hordeacea farina cataplasmatim miscentur, & in muliebres fetus cum fenograceo & ptisana. Cæterum cum ruta coctæ torminti

bus infunduntur. Coctæ illitæq; duritias discutiunt, parotidas & furunculos emolliunt, panos ad maturacionem perducunt, maximè nitro, iri aut calce addita. Cruda si cū antedictis tundant, eadē efficiunt: cū malicorio, pterygia purgāt: cū atramēto sutorio, deploratis ferè tibiariū fluxionibus, et cacoethicis vlceribus medentur: quin & cū vino decoctæ addito absinthio & hordeacea farina, vtilissimè hydropicis illinunt, Crematæ cū cerato sanāt per-niones, prurigines, sonitusq; si cruda terant, & sinapi liquoreq; aliquo exceptæ auribus instillant. Tam syluestris, quàm satiuæ fici lacteus succus coaguli modo lac cōtrahit, cōcretumq; dissoluit, ut acetū: exulcerat corpora, meatus aperit, soluit aluum, vuluā recludit cū detrita nuce græca potus, menstrua ciet cū luteo oui appositus, aut Tyrrhenica cera: podagricorū cataplasmatibus cū farina fænigræci & aceto vtilis: lepras, lichenas, vitiligenes, vitia cutis in facie, psoras, vlcera in capite manātia, cū polēta expurgat: instillatus plagæ, percussis à scorpione, venenatorū ictibus & rabiosi canis morsibus auxiliatur: prodest dentium dolori lana exceptus, et cauis eorū additus: verrucarum informicationes tollit cum adipe, circūlita in ambitu carne. Hoc idem præstat succus è teneris ramis syluestris fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo, tusi exprimuntur, & siccatus in vmbra reponitur. Et lac & succus imponuntur

tur exulceratorijs medicamentis. Decocti cum bul-
bulis carnibus ramuli ficulni, facile afferunt deco-
ctionem. Lac efficiunt quod magis soluat, si inter
coquendū ficulneo surculo spathæ loco moueatur.

Grosi.

CAP. CXLVI.

Grosi, quæ crinei nonnullis vocantur, coctæ,
illitæ strumas nodosq; omneis emolliunt: cru-
da formicas, verrucas & thymos, nitro farinaq;
additis, tollunt. Folia eadem possunt, illita cum sa-
le & aceto vlcera in capite manantia, epinycti-
das, & furfures sanant: ijs ficsa extuberationes,
& genarum scabritia perfricantur. Nigræ ficus
folijs cauliculisq; candidæ vitiliginis perunguntur,
faciunt ad canis morsus, & vlcera quæ ceria, id est
fauos, vocant. Grosi cum syluestris papaueris fo-
lijs ossa extrahunt, furunculos cum cera discutiunt,
contra muris aranei morsus, & scolopendræ vene-
na, cum eruo & vino illitæ, auxiliantur. Fit ex ci-
nere ficus tam syluestris quàm satiuæ lixiuiū, cre-
matis ramorū cauliculis: quod subinde macerari
opus est & inueterascere: siquidem inter causti-
ca intelligitur. Gangrænis prodest: nanque ex-
purgat & consumit, quæ excrescunt: eoq; sic uten-
dum est: Spongia assidue hoc lixiuiū imbuta su-
perponitur. Interdum dysentericis, & in fluxio-
nes vetustas, & sinus cuniculatim exedentes, ma-
gnosq; instillari conueniet. Etenim purgat, con-
glutinat, carne replet, & oras cōmittit, non secus

G 5

atq; emplastra quæ cruentis vulneribus injiciuntur: enema vocât. Bibitur ad discutiendû sanguinem concretum, & cōtra præcipitationes, rupta, cōvulsa, cum cyatho aquæ recenter colatû: addito olei exiguo, celiacis, dysentericis per se cyathus datus prodest: nervorû vitij, convulsionibus commodè illinitur ex oleo, utpote quod sudores moveat: aduersus gypsi potum, & phalangiorû morbus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiuia, præsertim quernum: omnia tamen adstringunt.

Persea.

CAP. CXLVII.

Persea arbor est, in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho utilem: in quo phalangia cranocolapta nomine inveniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinâ redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc proderunt aliqui in Perside exitiosam esse, trāslatamq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

Iberis.

CAP. CXLVIII.

Iberis siue cardamantica, folia habet nasturtij, vere virētiora: caulē cubitalē, aut minorē: in incultis nascitur, æstare lacteum florē promit, quo tēpore efficacior est. Radices duas nasturtio similes habet, calfaciētes & adurētes: ipsæ enim ischia dicis cum salsa axungia emplastrum modo utiles, quaternis horis alligatæ, ut dein in balneas descendantur, & postea oleo cū lana locus perungatur.

PRIMI LIBRI FINIS.

P E D A N I I
DIOSCORIDIS
ANAZARBEI, DE
Medicinali materia,
Liber I I.

Ioanne RVELLIO Sueſſionenſi
interprete.

IN primo chariſſime Aree libro, quē
 de medicinali materia condidimus,
 de aromatibus, oleis, vnguentis, arbo-
 ribus, & naſcentibus ex eis ſuccis, la-
 crymis ſeminibusq; diſſeruimus. In hoc autem ſe-
 cundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frugi-
 bus, atq; oleribus explicabimus, ſubnexi herba-
 ceis quæ acri prædita ſunt facultate, vtpote quæ
 cum ipsis cognatione iuncta ſint: qualia allium,
 cepa, ſinapi, intelliguntur. Idq; ideo, ne cognato-
 rum vires diſiunxiſſe videamur.

Echinus ſiue erinaceus. C A P. I.

Marinus echinus ſtomacho ventriq; utilis
 eſt: vrinam cit, huius teſta cruda inſa-
 ſata commodè medicamentis admiscetur, quæ
 pſoras abſtergunt: crematæ verò cinis ſordida
 vlcera expurgat, luxuriantem carnem reprimit.

Terr

Terrestris erinacei coriū cōbustū alopecijs cū pice liquida aptissimè illinitur, assiccātū corpus & cū aceto mulso potum, renum vitijs auxilio est: item aquæ quæ cutē subijt, conuulsionibus, elephantia, & malè habitis, quos cachectos vocant: viscerum fluxiones exiccat. Eiusdem iecur fictili solibus excocto arefactū, ad eosdē vsus vtilissimè recōditur.

Hippocampus.

CAP. II.

Hippocampus marinū animal est exiguum cuius cremati cinis exceptus cum liquida pice, aut axungia seu amaracino vngueto illitus, alopecias replet.

Purpura, buccina, eorumq; volutæ.

CAP.

III.

Purpura vsta exiccat, dentes abstergit, excre-
scētias in carne colubet, vlcera purgat, & ad
cicatricem perducit. Eadem præstant concrema-
ta buccina, sed vehementius vrunt: si quis salis
plena, fictili crudo adurat, dētifricio conueniunt:
ambustis vtiliter illinuntur, quibus solui medi-
camentum non oportet: nam postea quā vulnus
cicatricem duxerit, ipsum in testæ modum indu-
ratū, spōte sua decidet. Fit etiā calx è buccinis, vt
in eius mētiōe demōstrabimus. Cionia vocātur
purpurarū buccinorūq; mediæ partes, circa quas
testæ volumen clauiculatim intorquetur. Cremata
simili modo, maiore purpuris buccinisq; facultatē
vrendi cōsequuntur, quoniā apprimēdi naturam
obtin

LIBER SECVNDVS.

obtinent. Buccinorum carnes ori grate sunt, & stomacho vtilis: sed aluum non molliunt.

Mituli.

CAP. IIII.

Mituli laudatissimi in Ponto. Cremati eundem buccinis effectum præbent. Priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle vtilis habentur: genarum crassitudines absumunt, albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginem offundunt: carnes eorum ad canis morsus vtilissimè imponuntur.

Tellinæ.

CAP. V.

Recentes tellinæ aluo vtilis, sed maximè ius earum: salitæ vruntur, tritæq; in cinerem & cum cedria instillatæ, auulsos pilos * renasci * τῶν βλεφάρων. non patiuntur.

Chamæ.

CAP. VI.

Chamarum conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet: id cum vino assumitur.

Vnguis odoratus.

CAP. VII.

Vnguis siue onyx conchilij tegumentum est, ei simile quo purpura integitur: quod in India nardiferis lacubus inuenitur. suauè ideo spirans odorem, quod conchylia inibi nardi pabulo vescantur. Colligitur posteaquàm stagnantes aquæ æstiuis squalloribus inaruerint. Laudatissimus qui à rubro mari defertur, candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atque minor conspicitur.

citur. Ambo odoris gratia suffiuntur, sed aliquānus castoreum olent. Iidem suffitu excitant feminas vuluæ strangulatu oppressas, comitialesq; poti ventrem molliunt. Crematum conchylium eadem efficit quæ purpura & buccinum.

Cochleæ.

CAP. VIII

Terrestris cochleæ stomacho vtilis sunt, & non facile corrumpunt. Optimæ Sardonica, Africana, Astypaleica, & quæ in Sicilia, atque Chio gignunt, et quæ in Liguria alpibus, pomatia, id est operculares, cognominatæ. Marina stomacho idonea, & facile aluo excernit: fluuiatilis virus olet. Quæ verò, reprobis fructetisq; glutinata coheret, quæ vocat nonnulli sesilon, ventrem et stomachum turbat, vomitiones excitat. Crematæ omnium testæ excalfaciendi & vrendi naturam sortiuntur: purgant lepras, vitiliginis, dentesq; emendant oculorum cicatrices, & vitia cutis in facie, albugines, ac visus hebetudines, si cum carne sua vstæ tritaq; ex melle illinant. Cruda cum tegumentis imposita, aqua inter cutem tumores exugit: sed non antè solvatur, quàm omnis hauriatur humor. podagricas inflammationes leniunt, impactos corpori aculeos illitæ euocant, menses trita et admota ciunt. Carnes earum cum thure & myrrha illitæ, cum vulnera alia, tum maximè quæ nervi acceperunt, conglutinant: trita in aceto, sanguinem naribus erupentem infrenant: vincta corpus, et præsertim Africana

na

LIBER SECVNDVS. 113

et cum aceto deuoratum, stomachi dolores miti-
at, trita cum testa, vino & myrrha, si exiguum
ide bibatur, coli vesicæq; cruciatus sanat. Terre-
ris pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu-
ntore eius, pilum attingat.

Cancrī.

CAP. IX.

Cancrorum fluuiatilium exustoriū cinis qui
duo cochlearia expleat, adiecto dimidio ra-
icis gēlianae modo, triduo potus cū vino, magno-
re prodest canis rabiosi morsibus: rimas pedum
disq; perniunculos, & carcinomata, cū decocto
ielle lenit: triti crudi, potiūq; ex asinino lacte, au-
ilantur contra serpentium phalangiorumq; mor-
us, atq; scorpionum ictus: decocti autem & cum
ure esulati, ijs prosunt qui tabe cōficiuntur, aut le-
orem marinum hauserunt: necant scorpiones tri-
, & cum ocymo admoti. Possunt eadem mari-
i, verū inefficacius omnia præstant.

Terrestris scorpīo.

CAP. X.

Terrestris scorpīo tritus & impositus, suæ
plagæ remedium est: quin estur assatus,
de eadem.

Marinus scorpīo.

CAP. XI.

Marini scorpionis fel conuenit ad suffusio-
nes oculorum, albugines, & hebetudines.

Draco marinus.

CAP. XII.

Draco marinus dissectus & apertus imposi-
tusq; ictus spine suæ qua ferit, medela est,

Sco

Scolopendra.

CAP. XIII

Scolopendra in oleo decocta si illinatur, auellit
capillos: sed contactu pruritus facit.

Torpedo piscis.

CAP. XIII

Marina torpedo diuturnis capitis doloribus
admotā, cruciatus vehemētiā mulcet: ea
dem apposita euersam sedē prociduatq; coëriet.

Viperæ.

CAP. XV.

Viperinæ carnes si cocta edantur, claritatem
oculis afferunt, neruorum vitij auxiliantur
increscētes strumas reprimunt: detracta autem
cute, caput caudaq; quoniā carne vacant, ampu-
tari debent. quippe commentitium est quod præci-
pitur, certam vtrinq; mensuram præcidi oportere.
Reliquum verò corpus exēptis interaneis elo-
tum dissectumq; discoquitur cum oleo, vino, salis
exiguo, & anetho. Aiunt ijs qui viperas escent,
pediculos procreari: quod planè à veritate abhor-
ret. Adijciunt aliqui longam senectutem agere,
qui eo cibo vescuntur. Sal ex eis ad eadem confici-
tur, sed inefficacior est. Viua autem vipera in fi-
ctile nouum demittitur, adijciuntur salis carica-
rumq; tritarū, singulatim quinq; sextarij, mellis
cyathi sex, mox fictilis operculum luto oblinitur,
& fornacibus inassatur, donec sal in carhones re-
digatur, qui postea tritus in pulueris faciē, recon-
ditur. Plerūq; vt ori gratior fiat, immiscetur nar-
di spica, aut folium, aut malabarhri momentum.

Senect

LIBER SECVNDVS. 115

Senecta anguim. CAP. XVI.

Senecta anguim in vino decocta dolori aurium, infusu: & dentiū collutione, auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed præcipue viperinam.

Lepus. CAP. XVII.

Lepus marinus loligini parue similis est, qui per sese tritus, aut cum vrtica marina illitus capillos euellit. Terrestris leporis inassatu cerebrum manditur, inuandis tremoribus qui valetudine contracti sunt: affrictu aut cibo facilem infantibus dentitionem præstat: exustum caput & cum adipe vrsino aut aceto illitum, alopeciarum inantibus medetur. Leporinum coagulum post triduum à concubitu potum, conceptu adimere, partusq; spem intercipere proditur: vuluæ & alui fluorem sistit, comitiales inuat, contra venena ex aceto bibitur, præsertim aduersus concretu lac, & viperarū morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, vitia cutis in facie, vitiliginē, lentiginesq; sanat.

Pastinaca. CAP. XVIII.

Marina pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squamuis reflectitur, dentium dolorem mitigat: nā eos frangit, & euocat.

Sepia. CAP. XIX.

Sepiæ coctæ dum estur atramentum, agrè concoquitur, aluum mollit, collyrijs è testa factis conuenienter genarum scabritiæ perfricatur:

H

ustum in sua testa donec id quod crustosum est
abscedat, postea tritum, expurgat vitiligines, fur-
fures, dentes, & vitia cutis in facie: elotum in me-
dicamenta oculorum addi solet: contra albugines,
oculis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia
oculorum absumit, cum sale tritum & iniectum.

Mullus piscis.

CAP. XX.

Mullorum assiduo cibo, aciem oculorum he-
betari constat. Is marini draconis, aranei,
ac scorpionis moribus medetur, si crudus atq; dis-
sectus admoueat.

Hippopotamus.

CAP. XXI.

Hippopotami testes exiccati ac triti contra
serpentium morsus bibuntur.

Fiber.

CAP. XXII.

Fiber ancipitis vite animal, plerumq; cum pisci-
bus & cæcis ex aqua victum capeſcit. Huius
testes serpentium venenis aduersantur, sternutamen-
ta mouet, et in vniuersum varios obtinet vsus: si-
quidem menses ac partus ciunt, duabus drachmis
cum pulegio poti partus secundasq; eiciunt: contra
inflationes, tormina, singultus, venena, ixiāq;
ex aceto bibuntur: letargicos, & vtiūq; veterno
obdormiscētes excitant infusi: cum aceto autē & ro-
saceo, olfactu & odoris suffitu, idem faciunt: poti
& illi profunt tremulis, conuulsionibus, & o-
mnibus neruorum vitis. In summa, calfactoriam
vim habet. Eligi debet testes qui ex vno ortu con-

LIBER SECVNDVS. 117

rexi sunt (fieri enim non potest, vt gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiantur) liquore intus veluti ceroso, odore graui & virus redolente, gustu acri, mordete, ac friabili, naturalibus tunicis circūdato. Quē fraude aliqui corrumpūt, conijcientes in follem gummi, aut ammoniacū cū sanguine & castorio subactū, & ita exiccantes. Vanū est quod traditur, testes ab ipsis euelli, & a sese abijci, quū venatu vrgentur: siquidē tangi nequeūt, ita, vt in sue, substricti. Operæ autem pretium est, diuisa pelle melleum liquorem cum eueniente tunica assumere, & siccatum potui dare.

Mustela vulgaris. CAP. XXIII.

Mustela quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale, in vmbra siccatur. Ea binis drachmis cū vino pota, aduersus omnia serpentium venena præsentaneo est remedio: toxico, simili sumpta modo, resistit. Eius ventriculis coriandro farctus inueteratusq; percussis à serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fictili podagricis cōfert, cinere ex aceto illito. Sanguine perunctæ strumæ, inuantur: comitialibus etiam prodest.

Ranæ. CAP. XXIIII.

Contra omniū serpētū venena pro antidoto sunt ranæ, si ex sale & oleo decoctæ edantur, usq; earum itidem sorbeatur: contra inueteratos tendinum rigores pollent. Illitus earū cinis pro-

fluentis sanguinis impetus sistit: explendis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. Viridium ranarum cruor auulsos genis pilos renasci prohibet, in vestigia euulsorum instillatus: decocta in aceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.

Silurus.

CAP. XXV.

Silurus recens in cibo nutrit, & facilem praebet aluum: sale vero conditus, minimū suppetat alimentum. Arteriam expurgat, & vocem expedit. Illita saliti caro, aculeos & infixa corpori spicula extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in desidentium fetus adiuciat, fluxiones siquidē ad summa cutis elicit: ischiadicis infusa medetur.

Smarides.

CAP. XXVI.

Smaridis piscis caput exustum, excrecentes ulcerum oras puluillosq; reprimat: nomas cohibet, thymos clauosq; absomit. Caro non secus atque salsamentum prodest a scorpione percussis, aut a cane demorsis.

Mænæ.

CAP. XXVII.

Mænarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas abolet. Eius etiam garum oris putrilagines collutione sedat.

Gobius.

CAP. XXVIII.

Gobius recēs in suillum vêtre coniectus, si cōstita rima in duodecim aquæ sextarijs, donec duo supsint, decoquatur, excolatus & sub diuo refri-

LIBER SECVNDVS. 119

igeratus potui detur, alius sine molestia deicit.
 illitus cōtra serpētium canūq; morsus auxilio est.

Thunnus. CAP. XXIX.

Conditanēi thūni caro, quam omotharichon
 vocant, sumpta ijs auxiliatur, quos vipera
 nomine præster momorderit: sed opertet vinum
 quamplurimum subinde cogantur haurire, ita vt
 vomitione reddatur. Cōtra acrimontias esitatorū
 maximè valet, canū morsibus vtilissimè illinitur.

Garum. CAP. XXX.

Garum omne, quod ex piscibus carnibusq;
 sale maceratis liquamen est, si ex eo fotus
 at, depascentia vlcera sistit: morsus à cane mede-
 ur, dysentericis atque ischiadicis infunditur: non-
 nullis, vt exulcerata adurat: alijs autem, ad lace-
 nda, quæ vlcera non senserunt.

Ius piscium. CAP. XXXI.

Recentium piscium ius, modo per se, modo
 ex vino potum, aliu subducit. Prinatim ad
 unc vsum conficitur è phycidibus & scorpion-
 us, & iulide: è percis, & recentibus alijs saxa-
 libus, nec virus respicientibus, simpliciter cum
 aqua, oleo & anetho.

Cimices lectularij. CAP. XXXII.

Cimices qui in cubilibus enascuntur, canis fa-
 charum inclusi, si ante febrium significatio-
 es septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt: &
 intra fabas sumpti, percussis ab aspidē profunt;

H 3

vulvarum examinationes olfactu reuocant: potum cum vino aut aceto, adherentes sanguisugas abigunt: triti & vrinaria fistulae impositi, vrinae angustias leuant.

Millepeda. CAP. XXXIII.

Millepeda, quae sub aquario vase stabulatur, animalia sunt multis pedibus nentia, quae contacta manu contrahuntur in orbem: haec ex vino potum difficili vrinae, et regio morbo auxiliatur. Millepedas illini anginis cum melle utilissimum. Trita, & in cortice mali punici calfacta, doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillatur.

Blata pistrinaria. CAP. XXXIII.

Blata eius quae in pistrinis inuenitur, interanea trita aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

Pulmones CAP. XXXV.

Podagras perniciosae; emendat pulmo marinus recens, tritus & illitus. Suillus et agninus vrsinusque; pulmo impositu attritus a calceamentis contractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus vero si arefactus bibatur, suspiciosos adiuuat. Adeps quoque; liquefactus, infususque, auris dolorem finit.

Genitale cerui. CAP. XXXVI.

Genitale cerui tritum & in vino potum, a viperis demorsi auxiliatur.

Vngula asini. CAP. XXXVII.

Vngularum asini cinis per dies multos binis

ochlearibus potus proditur comitiales adiuuare,
eadem oleo subacta strumas discutiunt: & illitæ
bernionibus medentur. Caprinariū cinere perun-
ctæ ex aceto alopecie sanantur.

Lichenes equorum. CAP. XXXVIII.

Lichenes sunt in equorum genibus, & * su-
per ungulas in flexu harum partium indu-
rati calli: qui triti & in aceto poti, comitialibus
mederi traduntur.

κατ' ἐπι-
γναφὴν πῶ
ἐπιτρύχ-
φῆν.

Iocinera. CAP. XXXIX.

ASini iecur inassatum esu comitialibus pro-
dest, veruntamen ieiunis edendum præcipi-
tur. Capræ verò inassati decidua sanie, inungi lu-
sciosos prodest: & dū coquitur, apertos oculos halū
tu eius vaporari: prodest in cibo tostū ad eadem.
Tradūt hircini iocineris cibo comitiales deprehen-
di. Apriniū recēs si arefactū teratur, ex vino potiū
contra serpentiiū volucruq; morsus auxilio est. Ie-
cur canis, qui rabie exagitur, tostū & in cibo
ab emorsis sumptū, ne tēletur metu aquæ tueri cre-
ditur. Utūtur autē ad arcēdos aquæ pauores den-
te eo, qui caninus dicit. hūc à cane, qui momordit
exēptum, & folliculo inditū, pro amuleto brachio
adnectunt. Inueteratum autem sale mergi iecur,
ex hydromelite binis ligulis potiū, secundas pellit.

Coria veteramentaria. CAP. XL.

VEteris corij cremati illitus cinis ambusta
igni, intertrigines, necnon calceamentorum

atritus sanat.

Gallinæ.

CAP. XLI.

Dissecta gallina, & adhuc calentes appo-
ta, serpentium morsibus auxiliatur: si-
identidem alias sufficere oportet. Earum cerebellum
vino bibendum datur contra serpentium morsus, sang-
nem à cerebri membrana profluentem sistit. Quae in
teriore venticuli galli sinu residet membrana, sec-
ta in laminas cornu specie similis (ea verò inter co-
quendum abijci solet) siccatur, tritaq; in vino conue-
nientissime stomachicis datur in potu. Ius è veteri
gallinaceo alium deijcit. Abiectionis itaq; interaneis
lem cõijci oportet, & cõsuto ventre decoqui in vi-
ginti sextarijs aquae, donec ad treis heminas redi-
gantur: totum id refrigeratum sub diuo, datur. Alii
qui incoquunt olus marinum, mercurialem, cnicum
aut filiculam. Crudos humores crassosq; atram bi-
lem, & strigmenta elicit: prodest longis febribus, susp-
rijs, articularijs morbis, & inflatiõibus stomachi.

Quorum natura.

CAP. XLII.

Orum molliculum plus alit sorbili, & du-
rum plus molli. Luteum oui, contra oculo-
rum dolores utile est: inassatum sedis inflamma-
tionibus prodest, cum croco, & rosaceo: & con-
dylomatis, cum meliloto: cum vicia autem fruticis,
eius, quem rhoa dicunt, aut galla in patinis frigi-
tur, ut cibo aluos sistat: per se etiam offerri solet.

Candidum oui crudum refrigerat, spiramenta
cutis

cutis occludit, inflammationes oculorū infusum lenit, ambusta, si statim eo perungatur, pustulas nō sentiunt: faciem à solis adustione tuetur, fronti impositū cum thure fluxiōes arcet, auertitq; inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo, melle & vino, mitigat. vtiliter contra hæmorrhoidis serpentis morsus crudum sorbetur: summè tepidum prodest vesicæ rosionibus, renum exulceratiōibus, gutturis scabritiæ, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.

Cicadæ. CAP. XLIII.

Cicadæ, quæ inassatæ manduntur, vesicæ doloribus prosunt.

Locustæ. CAP. XLIIII.

Locustæ odoris suffitu vrinæ difficultates adiuuāt, præsertim q̄ fæminas male habet: earū carnes nullo sunt in vsu. Est & quoddā genus locustæ, quæ asiracos aut onos dicitur, sine pennis, prælongis cruribus. Exiccata autē si ex vino bibatur, cōtra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abundè vescuntur Aphri, qui Leptin incolūt.

Ossifragus. CAP. XLV.

Venter eius auis, quam Latini ossifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

Galerita. CAP. XLVI.

Galerita auicula est parua, apicem in vertice, pavonis modo, gestans: quæ assa, & in cæ

ho sumpta, cœliacos adiuuat.

Hirundines. CAP. XLVII.

Diffectis crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorū lapillos offendes: è quibus duos, vñ colore variū, alterū purū eximes: ij priusquā terrā attigerint, in iuuentæ corio, aut ceruina pelle brachio aut collo adalligati, comitialibus proderūt, et sæpe prorsus eos recreabūt. Hirūdines, vti ficedulæ, in cibo, aciei visus medicamentū præbent. Tam pullorū, quā matrū in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert, angina eo commodè perunguntur: vna & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ et pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant, qui angina morbo conflictantur.

Ebur. CAP. XLVIII.

Eboris scobe illito paronychia sanantur. Vim adstringendi ebur obtinet.

Suillus talus. CAP. XLIX.

Svis talus comburitur, dum è nigro albescat: qui tritus & potus inflationibus colli, lōgisq; torminibus medetur.

Ceruinum cornu. CAP. L.

Ceruini cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, cœliacis, regio morbo, & vesicæ doloribus cum tragacantha: feminis fluxione vuluæ labor

borantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu contusum, crudo fictili, luto circumlito, & in furnū indito, vritur donec albescat: id cadmiæ modo elotum, vlceribus oculorum, & de fluxionibus salutare est: infriatum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur: feruefactum in aceto, si eo gingiua colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit.

Eruca. CAP. LI.

ERUCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, à venenatis bestijs feriri negantur.

Cantharides. CAP. LII.

EFRUMENTIS congestæ cantharides ad reconduendum idoneæ sunt, quæ fictili vase non picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super aceti feruentis, quam acerrimi halitum, donec æstu exanimentur: postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes variæ, luteis lineis, quas in penis transversas habent, promissoq; corpore crassæ ac blattarū modo perpingues: sed inertes ac imbecillæ, quæ vnius sunt coloris.

Buprestes, & pinorum erucæ.

CAP. LIII.

SIMILI modo recoduntur buprestes, genera quædam cantharidum, & pinorum erucæ: quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intosta, reponuntur. Vis omnium cōmunis erodere,
ulce

ulcerare, calorē elicere: qua de causa admiscuntur medicamētis quæ lepras, ferasq; lichenas & carcinomata sanāt. Menses ciunt pēssis emollientibus addita. Aliqui cantharidas antidotis impositas, aquæ subter cutē auxiliari prodiderunt: argumento, quod urina moneant. Alij pennas pedesq; contra potarum veneficia, remedio esse tradiderunt.

Salamandra. CAP. LIIII.

Salamandra lacertæ genus est, iners, varium, quod frustra creditum est, ignibus non vri. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Additur, vt cantharis, in medicamenta, quorum vis est exesse, & lepras abolere: similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus & capite in melle seruatur ad eundem vsum.

Araneus. CAP. LV.

Araneus, quem holcum, alij lycon, id est lupum vocant, subactus cum splenio, & linteo illitus, prolatusq; vtriusq; temporibus aut fronti, tertianos circuitus persanat. Tela eius imposita sanguinem sistit, vulnera quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria vindicat. Est & alterum aranei genus, qui candidam, tenuem, densamq; telam orditur: quem in aluta ligatum, & lacerto appensum, quartanis circuitibus mederi narrant. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

Lac

LIBER SECVNDVS. 127

Lacerta. CAP. LVI.

Lacerta caput intritum, & appositum, aculeos, & omnia corpori infixæ extrahit: varos, fornicantes verrucas, & pensiles, quas acrochordonas vocant, tollit. Iecur exesis dentibus coniectum dolores finit. Si diuulsa admoueat, ictis scorpione leuamentum præstat.

Seps. CAP. LVII.

Seps, quam aliqui lacertam chalcidicam vocarunt, in vino pota morsus suos sanat.

Scincus. CAP. LVIII.

Scincus aut Aegypti, aut India, aut rubri maris alumnus, quamvis inueniatur in Lydia Aauritania. Est autem terrestris crocodilus, sui generis, sale inueteratus cum nasturtio. Aiunt Ἰδιόγενὴς
ταριχεύον
μὲν ἐν
καρδάμω. quæ renes amplectantur, id sibi virium vendicasse, ut si drachmæ pondere bibantur, venem accendant. Verum decocto lentis cum melle ut semine lactucæ cum aqua poto, veneris cupi-
tates inhibentur. Additur in antidota.

Terreni vermes. CAP. LIX.

Terreni vermes impositi, præcisos nervos glutinant, tertianas discutiunt: decocti cum asserino adipe, & infusi, affectis auribus medentur: cum oleo autem decocti, si in contrariam aures instillantur, dentium doloribus præstant auxilium: triti in potu ex passo urinam ciunt.

Mus araneus. CAP. LX.

Mus

MVs araneus dissectus, & impositus, suus
morsus veneficia luit.

Mures.

CAP. LXI.

MVres, qui in domibus, oberrant, concisos
scorpionum plagis utilissimè imponi, in
confesso est: si inassatos infantes ederint, oris sa-
liuam exiccare promittunt.

Lac.

CAP. LXII.

LAc generatim omne boni succi est: corpus
alut, aluū emollit, stomachū & intestina in-
flatione vexat: vernū tamen dilutius æstivo habe-
tur, & è viridi pabulo aluū magis emollit. Proba-
tur autē candidū, æquali crassitudine, quod vngui
instillatū cogitur. Aluū minus tentat caprinum:
quoniā pecus hoc adstringentibus pabulis, robore,
lentisco, & oleaginis frōdibus, & terebintho ma-
gna ex parte vescitur: inde stomacho accommodatis-
simum reddi solet. Ouillū autē dulce, crassum, &
præpingue, nō vsq; adeo vtile stomacho. Bubulum
tamen, asininū, & equinum, vētri magis idonea:
sed ipsum turbāt. Quibus in locis pecora, scammo-
niam, veratrū, clematidē, aut mercuriale pascun-
tur, lac omne ventrē & stomachū subuertit. qua-
le in Iustinis mōtibus esse, à nobis proditū est. Si-
quidem capræ, quibus candidū veratrum pabulo
fuerit, primo foliorū partu euomūt: & eorum lac
hausrū nausēā creat, & stomachū in vomitiones
effundit. Vētrē adstringit lac omne decoctū, præ-

cip

alque; cādentibus calculis marinis exustū: & in
 summa, omnibus auxiliatur internis exulceratio
 nibus, præsertim faucium, pulmonis, interaneorum,
 vesicæ, & renū: foris verò cōtra pruritū cutis, eru
 ptiones papularū, & vitiatos corporis succos, recēs
 ū melle crudo, addito sale, datur exigua aqua di
 utū. Minus inflat quodcūq; semel feruefactū. De
 coctū cum calculis marinis ad dimidias, vlcerosas
 ventris fluxiones adiuuat. Lac quodcūq; s. rum
 cōtinet implicitū, quod vbi discessit, à lacte, multo
 potētissimū ad purgatiōes redditur. Datur quibus
 ine acrimonia volumus deiectionē moliri, vt me
 lancholicis, comitialibus, lepris, elephātis, et erūpen
 tibus toto corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod
 chistū, id est scissile, appellāt. Lac aut scissile nouo
 feruet, ramoq; ficulneo recenti mouetur, insparsis,
 postquā bis aut ter efferbuerit, totidem aceti mulsis
 yathis, quot sunt heminae lactis: ita enim serefcēs
 liquidū ab eo diuidit, quod in caseū concreuit. Sed
 ū feruet, ne superfundatur, cōueniet spōgia ex fri
 da cōtinuò scissilis labris detergere, sextariūq; ar
 genteū frigida aqua plenū demittere. Bibitur he
 minis per internalla singulis, vsq; ad quinas, ita
 vt intercedētibus spatijs, potātes ambulet. Lac au
 tem recens efficax est cōtra rosiones vstionesq; ab
 exitialibus medicamentis factas: vt à cātharidi
 bus, aut salamandra, bupreste, aut pinorū eruca,
 hyoscyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero: pfer
 unt

tim bubulū ad id eximie confert. Gargari^zatur
autem exulceratis faucibus, tonsillisq; Asininis pe-
culiariter collutos dentes gingivasq; stabilit. Flu-
xiones alui, si vlcera sentiantur, tenesmosq; ouil-
lum, bubulum aut caprinum cum marinis lapillis
decoctū, sistit: per se autem & cum hordeacea pti-
sana aut halicaceo cremore infusum magnopere
intestinorū rosiones mitigat: exulceratæ vuluæ im-
mittitur. Humanū lac dulcissimū est, & maxime
alit: māmis autē exuctū, prodest tibi, & stomachi
rosionibus: contra haustum leporem marinū præ-
sidio est: oculis cruore ex ictu suffusis, cū ihuris pol-
line instillatur: podagricis vtile est, cum meconio,
& cerato illitū. Lac omne respuendum splenicis,
hepaticis, comitialibus, vertiginosis, & nervorum
vitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus,
nisi si quis interdum purgationis gratia, vt osten-
dimus, schistum præbeat. Primiparæ canis lacte
perunctos narrāt glabrescere: potū contra venena
antidoti vicem obtinet, abortus mortuos expellit.

Caseus.

CAP. LXIII.

Caseus recens sine sale sumptus alit, stoma-
cho vtilis est, & facile in membra delega-
tur: corpus auget, aluum modicè emollit: alius ta-
men alio præstantior, pro natura lactis à quo con-
ficitur. Decoctus autem, & expressus, deinde in-
assatus, aluum sistit: illitus, oculorum inflamma-
tionibus, & sugillatis prodest. Qui verò recens
salit

salitus est, minus alimēti præbet: corpus aptè minuit, stomacho aduersatur, negotiū ventri interaneisq; exhibet: vetustiore sistitur aluus. Sero quod à caseo manauit, quamoptimè canes aluntur. Quod hippacem vocant, casus est equinus: ea virus redolet, magnopere alit, bubuloq; proportionē respondet. Nec desunt, qui hippacem, equinum coagulum appellarint.

Butyrum & eius fuligo. CAP. LXIIII.

ELacte pinguisimo probatū fit butyrū, quale ouillū est: fit & ex caprino, agitato in vasis lacte, donec pingue separet. Butyrū natura oleosum est & emolliens: vnde largius epotiū, ventrē resoluit: prodest, vbi oleū non adfuerit, cōtra venena. Cū melle si infricetur, dentitiones adiuvat: gingivarū pruritus, & oris vlcera infantibus emendat. Illitū foris capaciora alimentorū facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scatētibus asserit. Cōtra inflāmationes & duritias vuluæ, quod nec virus resipit, nec vetustatē sentit, butyrū efficax est: dysentericis, & colli exulcerationibus infundit: in medicamenta addi solet, quæ pus mouēt: vtile præsertim cū nerui, aut cerebri membrana, vesicæ ceruix, vulnera acceperit. Id autē purgat, replet, carnē creat, ab aspidē percussis vtilissimè imponit. Recens obsonijs additū olei vicē pensat, et adipis vice fungit in bellarijs. Colligēdæ ex eo fuliginis ratio hæc est: Butyrum in lucernā no-

uam ingestum accenditur, fictiliq; operculato quod supernè in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, & subinde aliud in assumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris: penna post deraditur ad vsus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exiccare et adstringere: fluxiones cohibet, & ulcera celcriter ad cicatricem perducit.

Medicina lanarum. CAP. LXV.

Succidæ lanæ molles, è collo feminibusq; laudatissimæ habentur. Subueniunt inter initia vulneribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fractis, aceto, oleo aut vino imbutæ: siquidè facile succos cohibunt quibus immerguntur, & ob pecudum sordè (sic enim æsypum vocat) emolliunt: capitis, stomachi, aliarumq; partiū doloribus, cū aceto & rosaceo efficaciter imponuntur. Crematarū lanarū cinis crustas obducit, excrescētiās in carne cohibet, & ulcera ad cicatricē perducit. Mundæ autem et carptæ, in fictili crudo, cæterorum more, vruntur. Nec secus sim. briati marinarum purpurarū flocculi cremari solent. Aliqui cum sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemq; modo vrunt. Alij in fictili oris patuli, verucula inter se distantia componunt, & concertas carminatasq; lanas oleo ita suffusas, vt ne stillare quidem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem lanisq; permuta-

tim

tim interstratis, leuiter succendunt, & vstas tollunt: quod si è teda pix, pinguitudine vlla profluxit, collecta recoditur. Lauat ad oculorum medicamenta: cinerē in labellis, aqua addita, manibus cōfricant, & considerare patiuntur: idq; sepius, mutant aquā donec linguam adstringat, nec mordeat.

Oesypum.

CAP. LXVI.

Oesypum vocant Græci, succidarum lanarū pinguitudinē. Cuius parandi ratio hæc est: Succidæ molles, radiculā non curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunque sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoq; impetu ligula, vti respūmet, agitur, aut linea rude validiusculè conturbatur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur: confidente pingui quod supernatabat, collectoq; in altero fictili vase, denuo aqua in labellum fusa agitur: spuma iterum mari perfunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum œsypum manibus emollitur, & si qua incedit spurcitia, confestim demitur: exclusaq; sensim omni aqua, recenti q; affusa, manibus misceatur, donec admotum linguæ œsypum adstringat leuiter, nec mordeat, atque pingue candidumq; spectetur: tum in fictili vase conditur. Verum omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigi-

da aqua eluunt, & manibus, nō secus atq; ceratū mulieres, confricāt: ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis & sordibus quibuscunq; exēptis, ac lento igni in aeneo vase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectū, aqua, vt diximus, lauant: colatumq; in fictile patellam, quæ calidam aquam cōtineat, linteo operiūt, atq; soli mandāt, donec candulū fiat, et satis crassum. Alij biduū spatio aquam effundunt, nouamq; adiūciunt. Melius est leue, radícula non curatū, quod succidarū virus oleat, & si manu in concha fricetur cū aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut concreti habens: veluti quod cerato aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, explet vlcera, & emollit: præsertim sedis ac vuluæ, cū meliloto & butyro: in vellere appositū, menses & partus euocat, vlcera non aurū modo sanat, sed et genitaliū cū anserino adipe: cōtra erosos angulos oculorū, scabiososq; genas quæ occalluerunt, & ciliorū defluuia, efficax est. In testa noua torretur, donec redactū in cinerem pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligitur, vti demonstrauimus: quæ in oculorum medicamenta commodè addi solet.

Coangulum. CAP. LXVII.

Leporis coagulum tribus obolis ex vino, venenatorum morsibus, exliacis, dysentericis, & fœminis fluxione vuluæ laborantibus, ac reiectionibus à pectore, auxiliatur. Sanguinē in grumos

mos concretū discutit. Post menstruas purgationes appositū vuluæ cum butyro, præstat mulieribus vt concipiāt: potū verò partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulū, quā hippacen aliqui vocant, priuatim cæliacis dysentericisq; conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capreæ laticornis, & dorci, apri, cerui, vituli, bubaliq; coagula similes naturas sortiuntur: contra aconiti potum in vino, & concretū lac in aceto, conuenienter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotū, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei vires representat: comitialibus, strāgulatis vuluis, potu conferre existimatur. Sed si sit vituli marini, hoc experimētum est: aqua inspergitur, qua paulisper cum alterius animantis, tum præcipuè agni coagulum, maduerit: nam si erit syncerum, statim liquefcit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natare possunt. In summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

ADEPS. CAP. LXVIII.

Adeps anserinus aut gallinaceus recens & sine sale conditus, ad vuluæ vitia proficit: sale inueteratus, & qui temporis spatio acrimoniam concepit, vuluæ inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipis, quem curare institueris, obstructo diligen-

ter vase, flagrantissimo soli exponitur: eliquescent
inde humor in fictile alterū excolat, donec adeps
omnis absumatur, mox loco vehemēter frigido re-
conditur, & ad vsus digeritur. Alij fictile fulciūt
super aquā calidam, aut tenuē & elanguidā pru-
nam, quæ solis vicē penset. Est & alia curandi ra-
tio. Exemptis mēbranis teritur, coniectusq; in ollā
eliquatur, adiecto minuti salis momēto: mox lineo
colo transfusus reponitur. Utiliter in medicamen-
ta additur, quæ lassitudines & fatigationes le-
uant. Suillus adeps & vrsinus hoc curantur mo-
do. Recens, præpinguis, renibus potissimū detra-
ctus, in largiore aqua cælesti & quā frigidissi-
ma, exēptis tunicis, diligētissimē manibus cōfrica-
tur, & exprimēdo fermē siccatur, subindeq; nona
aqua abluitur: cæterum fictili capacitatis duplæ
inditus, in equam demergitur, & subditis leui-
bus prunis spatha mouetur: eliquatusque, colo
trāsfunditur in aquam: vbi verò refrixit, & gut-
tatim aquam omnem exclusit, in prælotum ficti-
le demittitur, & infusa aqua leniter eliquari de-
bet, & manu deprimi, quo facilius faculentū vi-
rus pessum eat: postea in pilam spongia madesa-
ctam transfunditur. Vbi coire cepit, residens in
imo sordes eximitur. Tertio citra aquam eliqua-
tur, repurgatusq; fictili bene operculato, perquā
frigidis locis reponitur. Hircinum seuū, ouillum,
ceruinumq; ita curato: Elotum ex his quodcunq;

tunicis, (vt in suilli mentione dictum est) exemptis, pila emolliendū tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentū virus excernat, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectet. Deinde in ollā fictilē cōiuncto, & adiecta aqua vt supereminet, leui pruna liquefacito, & moueto, atq; in aquā colato: cumq; refrixerit, iterum in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus facito. Tertio sine aqua liquefactū, in perfusam liquore pilam colato, refrigeratūq; vt in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum autem seuū, renibus maximè detractū, exemptis mēbranis, aqua marina ex alto petita eluendum est: mox in pila tundendū diligenter, affusa maris aqua. Cum verò dissolutū fuerit, in fictilem ollam coniiciendū, & marina aqua, quæ non minus dolante supereminet, proluendū, decoquendū donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas, quaternis Tyrrhenicæ ceræ drachmis: excolatumq; detractis quæ pessum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum: operatumq; soli interdū credendum, vt ad candorē, reducatur, & odoris virus euanescat. Priuatim taurorum pingue sic curari debet: Renibus euulsum pingue profluente amnis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo, postquam exiguum salem insperseris, liquefacito: dein in nitentē aquam excolato, & ubi concrefcere cœpit, manibus ite-

rum confricando vehementer lauato, aqua sepius
infusa refusaq; donec quā optimè elotū videatur:
rursus in olla cū pari modo vini odorati decoqui-
to, & cū iterū efferbuerit, depto ab igni vase, ibidē
sinito pnoctare: postridie si grauiter adhuc oleat,
noua olla repetitū, vincto odorato perfundat: eadē
quæ prius fiant, dū omne virus euanescat. Colli-
quatur & sine sale, præsertim affectionū earum
causa, quibus sal aduersari solet, sed ita paratū nō
magnopere albescit. Eodem modo pardorū ac leo-
num pingua curari oportet. Taurinū autem &
vitulinū pingue, necnō ceruinū, atq; etiam huius
animalis medulla, odoramētis imbuitur, hac ra-
tione. Pingue quod odoratū reddi debet, demptis,
quæ diximus modo, membranis, elotum & vino
quāmodoratisimo, nulla maris aqua diluto, fer-
uesactū, pernoctare sinitur: alterū id genus vinū
eadē mensura infunditur, colliquat, & exquisitē
colatur: nouemq; eius heminis, iunci Arabici se-
ptem drachmæ adijciuntur. Quod si ipsum odoris
fragrantioris fieri voles, quadraginta floris eius-
dem drachmæ, cū paribus palmæ, calami, & ca-
ssiæ modis adduntur: et xylobalсами, aspalathi sin-
gule drachmæ: cinnamomi, cardamomi, et nar-
di, singule vnciæ: omnia exactius tunduntur, &
assuso vino odorato, in vase operto, quod supra car-
bones firmiter collocatū sit ter effervescent, & se-
moto ab igni vase inibi pernoctant: postridie vi-
num

um effunditur, aliudq; generis eiusdē adijcitur.
 er simili modo benè conferuescat. Deinde matu-
 nis exempto adipe vinū effundatur: & abluto
 ase, si quid imo subsidens hæsīt, detergatur. Po-
 remò eliquatum pingue & excolatū, ad vsus re-
 nditur. Hoc autē modo odoramentis imbuitur,
 quod antea curatū est. Verū antè dicta prius in-
 bissari solent, quò facilius sibi odoramentorū vi-
 es adsciscant. Itaq; assumens quodcunq; horū vo-
 is, cum vino feruesfacito, impositis vnà myrti ra-
 nulis, serpillio, cypero, item aspalatho plenius tu-
 o. Aliqui tamē ad hūc vsum, vno duntaxat horū
 ontenti sunt. Cum autem ter efferbuit, exemptū
 eniter, & lintheo colatū, aromatis, vti expositū
 st, imbuitur. Adipibus spissamenta sic fiunt (quē-
 unq; acceperis, oportet vt recens tundatur) Synce-
 us & sanguinis expers adeps, reliquas habens
 otas quas sæpe retulimus, in ollam nouam de-
 mittitur, infuso vino albo, vetere, odorato, quod se-
 nipedis altitudinem superet: lento igni feruescat,
 lum vernaculus odor aboleatur, planeq; vinum
 edoleat. At vbi deposito vase refrixit, duæ adi-
 is minæ in ollam mittuntur, & duo vini eiusdē
 sextarij, & seminis loti, eius inquā cuius è ligno
 udicra abia facitiant, tusi minæ quatuor adij-
 iuntur: lento igni subinde miscendo decoquuntur:
 ūq; odoris virus euanuerit, excolatusq; adeps re-
 fixerit, vna contusi aspalathi mina, cū amaraci-

ni floris minis quatuor, et vetere vino subigitur. Nocte vna hac odorē rapiunt, cōhibēntre. Postridie in fictilē ollam tricongialē ea omnia cū adipe iniecta, additis sextarijs tribus vini, vnā feruescūt, quousq; & vim & odorē spissamentorū adeps ipse contraxerit: qui eliquescent colatur, et reponitur. Quòd si maiorē odoris fragrantia efflagites, drachmas octo quā pinguisimā myrrhæ vino macerate, qđ multos in annos asseruatū est, misceito. Gallinaceus anserinus sic odoribusq; imbuī solēt: Cuiusuis eorū percurati sextarij duo fictili olla excipiūt: erysīseptri, xylobalsami, palmæ elatæ, et calami planē cōtusi, singulorū sescuncia admiscet: vini Lesbij veteris ciathus vnus adijcitur: ea ter effervescent prunis, mox vase sublato ab igne, die noctūq; refrigerātur: postridie liquata per lintē crassum, mundū in vas excolātur. Vbi verò adeps coierit, concha excipitur, fictiliq; nouo densius operto perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet: æstate siquidem pingua non coguntur. Nec desunt qui Tyrrenicæ ceræ momentum adijciant, quò facilius in vnum corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps & vrsinus cæteri q; id genus, odoramentis imbuuntur. Verum sampsuschi odorē adeps ipse representabit hoc modo: Curati quā optime adipis, præsertim taurini, mina vna, tēpestiuiq; sampsuchi exquisitē cōfracti sescuimina misceant

tur, & insperso largiore vino digeruntur in of-
 fassis, quæ in vase cooperto nocte quiescunt: matuti-
 ne in fictili olla leuissculo igni, affusa aqua, leni-
 coquunt: dumq; suum adeps odorem exuerit, defae-
 ctus ac bene opertus, nocte tota permanet: poste-
 die deterfa sorde quæ pessum ierat, sampsuchi,
 dictum est, cotusi iterum sesquimina priori pastillo
 incutitur: eodemq; modo in offas cogit: alijs quæ
 prius peractis, decoquitur et colatur: & si qua
 quando hæsit spurcitia, deraditur, et frigido loco re-
 ducitur. Siquis tamẽ incuratum adipem anserinum, gal-
 laceum, aut vitulinum, à putredine tueri velit, ita fa-
 ciendum est: Quemuis adipem diligenter elotum & sicca-
 tum in umbra super cribrum, per lintea munda ma-
 nibus vehementer exprimatur, linoq; consutum umbro-
 so in loco suspendatur, & post multos dies noua
 carta inuolutum, frigido loco recodatur. Pinguia au-
 tem indito melle vindicantur à putredinis vitio.
 Quis omnium est ex alfacere, mollire, rarefacere. Tan-
 tum adeps, bubulus, & vitulinus aliquantum ad-
 iungunt: earundem virium copiosus leoninus: nam resi-
 re eum aiunt ijs qui insidias moliuntur. Ceruino,
 elephantinoq; perunctos, serpentes sugiunt. Ad-
 iungentior est caprinus: qua ex causa decoctus
 in polenta, rhoë, & caseo, dysentericis datur, &
 in ptisanæ succo infunditur. Ius decocti phthi-
 sis in sorbitionibus prodest. Datur quoque utili-
 ter ijs qui catharidum venena hauserunt hircinus, ut
 qui

qui validissimè discutiat: podagricis auxiliatur
 cū fimo caprae & croco impositus: huic proporti-
 ne respondet ouillus. Suillus verò cōtra vuluæ et se-
 dis vitia idoneus est: ambustis igni medetur. E su-
 vetustissimus quisq; sale conditus excalfacit, &
 emollit: elotus vino pleuriticis prodest. Cinere au-
 calce exceptus, inflātionibus, fistulis, ac tumo-
 ribus succurrit. Asiniū tradunt cicatrices corpori
 cōcolores reddere. Anserinus gallinaceusq; cōue-
 niunt mulieribus malis, & ad labiorū rimas, an-
 manganizandā faciē, et contra auriū dolores. Vr-
 siniū constat raptos vitio alopecie capillos resti-
 tuere, pernioibus subuenire. Vulpinus medetur au-
 rium doloribus. Fluiatiliū piscium pingua per-
 unctis oculis claritatē afferunt, si in sole liquecāt,
 & melli admisceantur. Vipera adeps contra ocu-
 lorum hebetudines suffusionesq; efficax est, addita
 cedria, melle Attico, & pari oleo vetere: pilos alis
 euulsos perunctis radicibus recens & per se illitus
 obliterat, atq; renasci non patitur.

Medulla.

CAP. LXIX.

Laudatissima est ceruina, mox vitulina, post
 hanc taurina, dein caprina, & ouilla Colli-
 giuntur æstatis exitu, cūm appetit autumnus: quip-
 pe cūm alijs annī temporibus concrementum san-
 guinis, & veluti caro friabilis, in ossibus inuenia-
 tur: nec facile cognosci potest, ni quis eam ossibus
 extrahat & recondat. Omnes medullæ molliūt,
 calfa

ulfaciunt, rarefaciunt: vlcera explent, ceruina
 erunctos venenata fugiunt. Curantur recentes,
 dipis modo, aquæ respersu subactæ, selectisq; ossi-
 bus tantisper elotæ, & in linteum expressæ, do-
 ec aqua sincera emanet: & deterfa sorde pēna,
 qua innatet, liquatæ in duplicato vase in pilam
 exprimuntur: & vbi coire, omni face, quæ ad ima
 idit, derafa, fictili nouo reponuntur. Quod si libet
 incuratas reponere, facito omnia quæ de anserum
 & gallinarum adipe demonstrauimus.

Fel.

CAP. LXX.

FEl omne curatur hoc modo: Recens præliga-
 to ore folliculi lino tādū demissum in feruē-
 tem aquā, dum quis spatiū trium stadiorū percur-
 aret, mox exemptū siccatur vmbroso loco, aspergi-
 nem nō redolētē. Sed quod ad oculorū medicamen-
 ta adijci solet, ligatū lino in vitreū vas, quod mel
 habeat, immittitur: circumuoluto ad os vasis lini
 principio, et operto vase reconditur. Est enim vis
 omnium acris & excafaciens: intensus tamē & re-
 missis viribus differunt: siquidē præstātius in effe-
 ctu esse videt fel marini scorpionis, et piscis qui cal-
 lionymus appellat, marinæ testudinis, hienæq;
 item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & jyluc-
 stris capræ: quod priuatim prodest contra suffu-
 siones incipientes, & oculorū caligines, argemas,
 & genarū scabritias. Ouillo, suillo, hircino, atque
 vrsino, taurinū multò efficacius. Felle omni perfa-
 ctū

cilem, præsertim infantibus, deiectione quis me-
tur, si intinctum eo tomentum aut fimbriam sedi sub-
ciat. Priuatim taurino angina cum melle perung-
tur: sedis ulcera sanat, et ad cicatricem usque pera-
cit. Idem auribus fractis, & purulentis cum mulie-
ræ lacte aut caprino instillatum, medet: & sibilo eor-
dem ex porri succo. Admisceri insuenit vulnera
emplastris & circumlitionibus, quæ contra ven-
enata paratur. Phagedænicis ulceribus, & colicis
scroti doloribus, ex melle prodest: lepras, furfuris
cum nitro et terra cimolia quam optime purgat. Oli-
um & ursum contra eadem pollent, verum ineffic-
cius hæc præstāt. Ursum eclegmate comitiales a-
iuuat. Fel testudinis angiris, & in ore infantium
nomis, prodest: naribus inditum comitiales erigit. S-
uestrium caprarum felle peculiariter peruncti luscii
sanantur. Hircinum idem obit munus, thymia ab-
let, & luxuriantes elephantorum extuberati-
ones illitu reprimunt. Suillum autem contra aur-
ulcera, reliquaque omnia, magno usu assumitur.

Sanguis.

CAP. LXX

Sanguis anseris, anatis & hœdi, utilissime
antidota miscentur. Palumbi autem, turtur
& columbæ, necnon perdices, oculis cruore suffu-
sis, & recentibus eorum vulneribus, lusciosis
illuntur. Peculiariter columbæ sanguis, cruor
membranis cerebri erumpentem inhibet. Hirci
capra, cervi & leporis sanguis inassatus sartagi-
ne

e, dysenterias & coeliacorum profluvia sistit: in
 ino potus cōtra toxica efficax est. Leporinus san-
 uis ita vt tepet illitus, vitia cutis in facie, lentigi-
 esq; emaculat. Caninus cōmodè ab his bibitur
 uos efferata in rabie bestia momorderit: contra
 potum toxicum auxilio est. Testudinis terrestris
 inguinem epotum tradunt prodesse comitialibus.
 Larina autem testudinis cū vino & leporis co-
 gulo cuminoq; contra serpentium morsus, &
 austa rubeta venena, cōuenienter bibitur. Tauri
 us cum polēta illitus, duritias discutit, emollitq;
 anguis equarum quæ admissuræ expertæ sunt,
 & medicamenta additur quæ erodunt, septica vo-
 ant. Sanguine chamæleonis genariū palpebras e-
 celli creditum est. Hoc enim viridium ranarum
 iungine præstatur. Menstruus sanguis fœmina-
 um, circūlitu conceptū inhibere existimatur, aut
 omninò mulier mēstrua superegreddatur, leuat
 odagrea dolores & ignem sacrum illitus.

Fimum.

CAP. LXXII.

ARmentaria bonis fimum si recens admo-
 ueatur, vulnerum inflāmationes mitigat:
 olijs autem inuoluitur, & calfactum cinere fer-
 entī superponitur. Coxendicis cruciatus fotu
 ompescit: illitum ex aceto duritias, panos, &
 lrumas discutit. Priuatim suffitu fimi, quod ā
 nasculo bouæ redditum est, procidentes vuluæ
 eprimuntur: accensi nidore culices abiguntur.

Fim

Fimum caprarum, præsertim in montibus
gentium potum in vino, regium morbum emendat:
ses cit cum odoramentis haustum, & partus o-
cat: tritum in farinam, & impositum lanis cum t-
re, feminari profluvia sistit, cæterosq; sangu-
impetus ex aceto cohibet: modetur alopecijs e-
stum, & cum aceto aut oxymelite illitum: cum ax-
gia verò impositum, his qui podagra tentantur,
xilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur
serpentium morsibus, ulceribus quæ serpunt, igni
cro, & parotidibus. Vtilem ischiadici vrsionem
hunc in modum accipiunt: In eo interstitio
pollex brachiali committitur, cava veluti lacus
subsidet, in qua lana oleo imbuta subternitur,
inde sigillatim feruentes stercoris caprini pile
imponuntur, dum vapor per brachium ad coxam
sentiat peruenire, & coxendicis dolorem mi-
gare: adustio id genus Arabica appellatur. On-
lum ex aceto illitum sanat epinyctidas, clau-
pensiles verrucas, thymos, & ambusta igni, ro-
ceo cerato exceptum. Fimum suis sylvestris ari-
in aqua aut vino potum, reiectiones sanguinis
stit: vetustum lateris dolorem mulcet, adrupta
conuulsa ex aceto bibitur, luxatis cum cerato ro-
ceo medetur. Tam asinorum quam equorum
mum siue crudum siue crematum, addito aceto, sa-
guinis eruptiones cohibet. Armentarij, qui her-
pascitur, siccum fimum liquatum in vino, m-
potum

potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinū vehemētius & excalfacit, & vrit, cum hordeacea farina mixtum strumas ex aceto discutit: carbūculos emarginat, tritum cum melle, lini semine et oleo: ambustis igni medetur. Gallinaceum verò omnia eadem, sed inefficacius præstat: priuatim tamen cōtra venena fungorū, & coli cruciatus ex aceto aut vino bibitur. Ciconiæ fimū, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, alopecijs medetur: cum thure & mulso calculos expellit: subditæ infantibus muscerdæ, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cū vino aut aqua potum, sistit aluum. Humanum stercus illitum, vulnera ab inflāmatione vindicat, & obiter intumescere nō patitur: sed ea statim glutinat. sicco ex melle angina perungi commodissimè traduntur. Terrestris crocodili fimū, crocodileam vocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; seruat. Optima est cādidissima & friabilis, amyli modo, minimè pōderosa, in humore statim eliquescent: quæ cū teritur, fermenti acorem quadāntenus refert. Adulterant eam sturnorū fimmo quos captos oryx a pascūt, ipsumq; nō dissimile vendūt. Alij amyllum aut cimoliam miscēt, & adscito anchusæ colore per rarum cribrū paula-

K

tim exprimunt, ut se contrahat in vermiculorum speciem: qui siccati pro crocodilea vaneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum stercus caninumq; gutturi impositum, anginis auxiliari.

Vrina.

CAP. LXXIII.

Humanam urinam suam cuiq; bibere, contra viperæ morsus, ac venena, incipientemq; aquam inter cutē proderit: scorpionis, viperæ marinorū, draconisq; morsus ea conuenientissimè fouentur. Canina ad perfundēdos canis morsus idonea est: pruritus & lepras nitro addito expurgat, sed vetus vlcera capitis manātia, surfures, pforas, & feruidas eruptiōes, multò magis abstergit: nomas, & precipuè genitaliū, cohibet: auribus infusa manūs pus supprimit: decocta q; in calyce mali punici, earū vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta vrina, orthopnoicis auxiliatur: decocta in aereo vase cū melle emendat cicatrices, argema, caliginesq; ex ea & cupro idoneum aurī ferrumen cōficiunt. Quod in vrina subsidit, illitu ignē sacrum mitigat: feruesfactum cū cyprino, inditumq; vuluæ dolores mulcet: strangulatus lenat, genas detegit, oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cū myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina viribus eisdem prædita est: priuatim comminuit vesicæ calculos, & potu expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subyt, cum nardi spica quotidie binis cyathi cū aqua bibitur, urināq; per aluum extrahit.

extrahit, aurium doloribus instillata medetur.

Asinina trahitur renū vitij mederi. Lyncis urinam, quam lyncurium appellant, simulac excernitur, glaciari coirēve in calculi duritiam, vulgo creditum est: quare quod de ea proditum est, vanum esse conuincitur. Est enim quod à nonnullis vocatur succinum pterygophoron, ideo dictum quod pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua, stomacho aluoq; fluxione laboranti conuenit. Asininae urinae potu renum vitia sanari traduntur.

Mel. CAP. LXXIIII.

PRincipem locum obtinet mel, quod Atticae regionis est, precipue ex Hymetio, mox Cycladibus insulis, & à Sicilia, cognomine hybleum. Magis probatur dulcius & acre, odoratus, subflauum, nec humectum, graue, & minimè fluxū, quod ob sequacem lentitiam non facile abrumptur, tractumq; resilit in digitos. Mel abstergendū vim habet: ora venarum aperit, humores euocat, qua ratione in sordida vlcera sinusq; commodissime infunditur. Decoctum atq; impositum, abscedentem cariem glutinat, medetur impetigini coctū cum liquido alumine & illitū, item aurium sonitui & dolori, cū fossili sale trito, tepidum instillatur: lendes & foeda capitis animalia illitū necat, nudā glandem recutitis operit, praesertim quae circuncisione aperta non est, si melle praeputium à balneo lineo triginta diebus emolliatur: oculorum cali-

Mellis probatio qualis.

ginem discutit, faucibus, tonsillis, anginae col-
lutum gargari. Latumve medetur: urinā ciet, au-
xiliatur tussi, & à serpente percussis: contra ha-
stum meconium, cum rosaceo calidum assumitur
aduersus venena fungorū, & rabiosi canis mor-
sus linctum aut potum proficit: crudum tamen a-
uum inflat, tussim lacescit, & ea de re despuma-
ti vsus aptior est. Primatum tenet in mellis gene-
re vernum, deinde aestiuum: hybernū verò, vi-
pote quod crassius constet, deterrimū reputatur,

Mel Sar- ceraginis halitum expirat. Quod in Sardinia gi-
doum ama gnitur mel, amarū est: quoniam apes inibi absin-
rum. thio vescatur: quo vitia cutis in facie & maculae

aptissimè perunguntur. Heraclia in Ponto qui-
busdam anni tēporibus, propria quorundam flo-
rum dote, mel conflatur: quod qui edēre, mēte ab-
alienantur, ac sudore diffluunt. Remedio sunt, esi-
tata ruta, & salsamenta, aut epotum mulsum,
resumpta, quoties vomitione reijciuntur. acre au-
tem est, & olfactu sternutamenta mouet. Quod
cum costo illitum, feminarū cutem emendat, &
cum sale sugillationes rapit. Est & aliud concre-

Saccharū. ti mellis genus, quod saccharō nominatur. In In-
dia verò, & felici Arabia in arundinibus inueni-
tur: salis modo coactum est, dētibus, ut sal, fragile,
alio idoneū, & stomacho utile, si aqua dilutū bi-
batur: vexata vesicae renibusq; auxiliatur, illitū
ea discutit, quae tenebras oculorū pupillis offendūt.

Cer

CEra optima est subfulua, suppinguis, pura, odorata, & halitum quadamtenus mellei referens, natione Pontica, aut Cretica. Secundum locum obtinet candicans, & suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo: Ex ea radunt album syncerumque, atque transfundunt in vas, quod satis habeat marinæ ex alto petiti, inspersoque nitri momento, decoquunt: cumque iterum tertiove inferbuit, separatim vas refrigerant, ac ceræ pastillum eximunt, deterfa sorde, si qua fortè adhæsit: tunc denuo indita noua maris aqua feruet, uti retulimus: & vase dempto ex igne, fundum ollulae nouæ aqua frigida madefectum, in ceram summam suspensa manu intingunt, quo celerius concreseat, & quamminima portio extrahatur. Suscepto primo ceræ orbiculo, iterum vasis imum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immitti debet, dum tota excipiat. Orbiculi lino consuti, interuacante spatio, suspenduntur, & interdum, continuo sub sole, noctu sub luna asperguntur, usque dum perfecte albescant. Verum si eximius ille candor desideretur, eadem faciliari, & identidem recoqui operæ pretium est. Nec desunt, qui pro marina, in muria quam acerrima semel aut iterum decoquant: dein laguncula tenui, rotunda, ansam habente, extrahunt: postea orbiculos, substrato affatim cespite herbofo, insolant, donec candorem summum contraxerint. Præcipiunt hoc obeundum munus vere,

cum sol remissa vehementia humorem pariat, non facile liquetur cera omnis molli, calfacit, modo dicere explet corpora: datur in sorbitione dysentericis, ac milii magnitudine decem grana ceræ hausta, lac in nutribus non patiuntur coagulari.

Propolis.

CAP. LXXVI.

Propolis eligi debet flaua, odorata, styracem referens, in vehementi ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit, & euocat aculeos, et omnia infixa corpori extrahit, in veteri tussi suffita proficit, impetigines admota tollit: ea in alueariorum foribus, cerosæ naturæ inuenitur.

Triticum.

CAP. LXXVII.

Optima est tritici generibus ad secundæ valetudinis usus habentur, quæ recetia, & iam perfecte adulta, colorem luteum referunt: dein sequuntur trimestria, quæ nonnullis sitania nominantur. Itaque cruda in cibis teretes tineas gignunt, canum moribus prosunt, mæsa & imposita: confectus eorum similagine panis, plus alit, quam cibarius: est trimestrium farina panis leuiorem cibum præbet, & qui facile in membra demandetur. Farina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduersus nervorum fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant. Item contra interaneorum inflationes, lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autem in acri aceto decocti, turgentes mammas sedant, viperarum ictibus auxiliantur, & torminosi prosunt. Farinacem
fer

fermentum calfaciendi, extrahendiq; vim habet: priuatim callos pedū, clauosq; extenuat, & cetera tubercula furunculosq; ex sale cōcoquit, & aperit. Sitaniorum farina, contra venenatos ictus cum aceto aut vino, cōmodissimè illinitur: eadē si decocta in glutini modū delingatur, cruētis excretionibus proderit: contra tussim, & exasperatas arterias, cū menta & butyro decocta, efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsa, aut hydrelæo decoquatur, omnē discutit inflammationē. Panis & crudus, & coctus cū aqua mulsa inflammationes omnes illitu mulcet: cū emolliat, et quadātenus refrigeret: sed herbis succisūe huic rei accommodatus admisceatur. Vetus panis aridus, adiectus conuenientibus, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus, illitu vetustas impetigines sanat. Glutinū ex similagine, & polline, quo chartæ glutiniantur, sanguinē excreantibus prodest, si liquidus ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

Hordeum. CAP. LXXVIII.

Hordeum optimum est candidum purumq;: id minus quā triticū alit. Ptisana tamen ob cremorem in decoctione redditū, plus alimentī prabet, quā polenta ex hordeo facta. Contra acrimonias atque gutturis scalritias, exulcerationesq; pollet: quibus etiam triticea ptisana praesidio est: sed plus alit, magisq; vrinam mouet. Lac abundē suppeditat, si cum feniculi semine deco-

repon.

Et sorbeatur. Hordeum absterget, urinā ciet, inflationē parit, stomacho aduersatur, tumores concoquit. Farina ordeacea decoquit in mulsa aqua cū fico, vt inflammationes collectionesq; discutiat: duritias cū resina, & fimo columbarū concoquit: cum meliloto autē, & papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciat: aduersus intestinorū inflationes cū lini semine, fenograceo, & ruta, illini iuuat, strumas cū pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri vrina, ad concoctionē perducit: & cum myrto, aut vino, aut malicorio, aut syluestribus pyris, aut rubo, alui profluūa sistit: podagricis inflammationibus, cū cotoneis aut aceto prodest: decocta in acri aceto, modo quo hordeaceū cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Cremor verò farine ex aqua, atq; cum pice, & oleo decoctus, puri mouēdo est: cū aceto subactus itidē, & cū pice, cōtra articulorū fluxiōes prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesq; mitigat.

Zythum.

CAP. LXXIX.

EX hordeo potus fit, cui Zytho nomen est. Is urinam cit, renes & nervos tentat, membranis, præsertim cerebrum vellentibus, officit: inflationem parit, vitiosum succum creat, elephātiāsin gignit: perfusum zytho ebur, obsequiosum & operi tractabile redditur.

Curmi.

CAP. LXXX.

FIt & ex hordeo potus, quē curmi nomināt, eoq;

eoq; sepe potu, pro vino vtūtur: verūm dolorē capitis mouet, malū succū gignit, neruis nocet. Consi-
milis etiam potus genera ex tritico fieri solent, in
Iberia, quæ occidentem spectat, & Britannia.

Zea, seu semen. CAP. LXXXI.

ZEa duorum generum est: vna simplex, al- Vulgò spel-
ta.
tera in geminis putaminibus grana bina
iuncta gerit, ob id diococos appellatur. Plus quàm
hordeum alit, ori grata: digeritur in panificia, mi-
nus quàm triticum alens.

Craſsior fariua. CAP. LXXXII.

Crimmon, craſsior est ex Zea triticoq; fari-
na, ex qua pultem faciunt. Abundè alit, fa-
cilè conficitur, aluum vehementius adstringit, si
Zea, ex qua fit, prius torreatur.

Siligo. CAP. LXXXIII.

EIdem generi siligo adscribitur, sed minus ali-
quanto nutrit: in panes, vt Zea, cogitur. Fit
quoque è siligine craſsior farina, quam Græci
crimmon vocitant.

Athera. CAP. LXXXIIII.

Athera ex Zea fit tenuissimè molita: est au-
tem sorbitio, quasi liquida pulicula, infan-
tibus conueniens, & cataplasmatibus efficax.

Tragos. CAP. LXXXV.

TRagos quandam halicæ frugis figuram ge-
rit: multò minus, quàm Zea nutrit, quòd
multum aceris habeat: quare ægrius conficitur.

aluumq; magis emollit.

Avena.

CAP. LXXXVI.

AVena genicula quædam habet, folio & stipula triticum imitatur, & in cacuminibus dependentes paruulas veluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, vtile ad cataplasmata, vti hordeū. Pulte huius aluus sistitur, prodest tussientibus in sorbitione succus.

Oryza.

CAP. LXXXVII.

ORyza frugum generis est, in palustribus riguisq; nascens. Mediocriter alit, sed aluum supprimit.

Halica.

CAP. LXXXVIII.

Halica fit ex Zea, quam dicoccon appellauimus: plus alit, quam oryza: aluum magis cohibet, stomacho longè vtior. decocta in aceto illitaq; lepras tollit, vnguiū scabritias extricat, incipientibus ægilopys medetur. Decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum, idoneum est.

Milium.

CAP. LXXXIX.

Milium in panes coactū, minus cæteris frugibus alit, sistit pulte sua aluum, vrinam cit. Torretur milium, feruensq; in sacco ponitur, vt torminibus, reliquisq; doloribus, si foveatur, auxilio sit.

Panicum.

CAP. XC.

Panicum frumentaceis seminibus annueratur, milio simile, eodemq; modo in panes.
sub

subigitur: eosdem habet vsus, minus tamen & nutrit, & stringit.

Sesama.

CAP. XCI.

Sesama stomacho inutilis cibus, halitus graui statem facit, quoties inter mandendum comisuris dentium inhaesit: neruorum crassitiem illitis discutit, medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerasae morsibus: capitis dolores, qui aestuatione concitantur, ex rosacea lenit: eadem efficit herba decocta in vino, praesertim inflammationibus oculorum doloribusque prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptij vtuntur.

Lolium.

CAP. XCII.

Lolium quod inter segetes nascitur, mollium, illi tu nomas, putrescentia vlcera, gangrenasque emarginat: sanat cum raphanis, sale et aceto feros lichenas: & ex aceto, & sulphure viuo, lepras: strumas quoque discutit, cum simo columbino, & lini semine decoctum in vino: rumpit, quae agrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsa, utilissimè ischiadicis illinitur: si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

Amylum.

CAP. XCIII.

Amylum ex eo appellatum est, quod sine amola fiat. Optimum ex trimestri, natione Creticum aut Aegyptium. Ratio faciundi amyli haec est: Purgatum trimestre triticum madescit quinquies die, & si fieri potest, nocte: cum

emol

emollitum fuerit, effunditur sensim, sine agitatione, aqua, quò minus cremor utilis vnà excludatur, vbi mollissimū esse videtur, mutata aqua pedibus calcari oportet: rursus infusa, teritur: tum demum enatantes ibi furfures incerniculo eximēdi, reliquumq; quallo sportisq; siccātū tegulis nouis confestim torreatur flagrantissimo in sole: nāque si paulisper vltimum maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cana q; vlcerā efficacax est: sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperatas fauces lenit, lacti atq; obsor.ys admiscetur. Fit etiam amyllum ex Zea, quæ maceratur, ac eluitur vno aut altero die, & subacta farina modo manibus subigitur: pressaq; feruētissimo in sole, vt antè retulimus, exiccatur: nullius in medicina vsus, ad alia tamen conueniens.

Fœnumgræcum. CAP. XCIII.

FOenigræci farina vim habet emolliēdi discutiēdiq;: in aqua mulsa decocta aduersus tam internas, quàm externas inflāmationes, efficaciter illinitur: lienem cum aceto, & nitro trita extenuat. Succus decocti eius fœminariū malis subuenit: et siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, fouētur, & insidēt. Fœnigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manātia capitis vlcerā purgat: locos dilatat, & emollit, si cum anserino adipe pessi vice subijciatur. Viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis, & vlcerā sen-

tens

LIBER SECVNDVS. 259

lentibus. Decoctum eius prodest aduersus tenes-
mos, fetidamq; dysentericorum proluuiem. Oleū
quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos & ge-
nitalium cicatrices absterget.

Linum.

CAP. XCV.

Linum vulgò notū est, cuius semen easdem quas
fœrum græcū vires habet. Discutit, & emol-
lit omnē intus forisq; inflammationē, cum melle,
oleo, exiguaq; aqua decoctum, aut melle cocto ex-
ceptum: vitia cutis in facie varosq; crudum tollit,
illitum cū nitro & ficulneo cinere, parotidas du-
ritiasq; discutit: vlcera quæ serpunt, fauosq; cum
vino decoctum expurgat: vngues scabros eximit,
cum pari modo nasturtij & mellis: vitia pecto-
ris extrahit, si ex melle in eclegmatis vicem sub-
stituatur: tuſsim lenit, venerem stimulat: si farina
biperis, & melle exceptū, pro placēta largius ad-
sumatur. Huius decoctū interaneorū vuluæ erosio-
nibus immittitur, alui excrementa euocat, ad vul-
uæ inflammationes in defectionibus perquā vtile.

Cicer.

CAP. XCVI.

Cicer sativum aluo idoneū est, vrinā ciet, in-
flammationē parit, colorē commendat, menses ac
partus expellit, lac auget, cū eruo decoctū illini-
tur ad inflammationes testiu, verrucosas informica-
tiones, ad scabiē, vlcera capitis manātia, impetigi-
nesq;: cōtra carcinomata, & vlcera, quæ cacoëthe Cicer arie-
vocatur, cū melle & hordeo prodest. Alterū genus tinum.

ariet

arietinum nominatur: utrumque cit urinas, dato, cum rore marino, hydropicis aut regio morbo laborantibus, eorum decocto. Lædunt ea exulcerata vesicam, & renes. In verrucarum formicantium pensiliumque genere, prima luna singulis granis singulas tangunt, eaque grana linteolo deligata abijci post se precipiunt, ita decidere eas arbitrantur. Sylvestris cicer, folijs satiuo simile est, odore acris, sed semine discrepat: idem quod satium præstat.

Faba.

CAP. XCVII.

Cyamos.

Faba inflationem excitat, acre concoquitur, tumultuosa somnia facit, tussi confert, carnem gignit, media calidi, frigidi que natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esitata, dysenterias, & coeliacorum profluvia sistit: contra vomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abijciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maioremque flatum parit. Lomentum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes quas vulnus excitauit, mitigat: cicatrices cocolores facit, turgentes grumoso latec mammas, etiam si inflammatione tententur, adiuvat: lac restinguit, furunculos, sugillata, parotidasque cum fœnigraci farina & melle discutit: cum rosa autem, ihure & oui candido, proci dentes oculos, tumores, vnasque, reprimat: subactum vino, suffusiones & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertendas fluxiones, fronti illinitur:

ur: decocta in vino testiu collectiones sanat: quò-
ardius pubes erumpat, pueris imo ventri illini-
ur: vitiliginem purgat. Fabarum cortice illiti ca-
villi, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt,
& minus alimenti capeffunt: cum polenta, scisso
alumine, & vetere oleo impositi cortices, strumas
discutiunt: decocto earum lanæ inficiuntur. Faba
dempto cortice in illas partes diuisa, in quas sua
te natura scinditur, imponi solet sanguinis de-
fluxionibus ab hirundine concitatis: nanque eas
supprimit, si semisecta apprimatur.

Faba Aegyptia. CAP. XCVIII.

Aegyptia faba, quam aliqui Pōticā vocāt,
in Aegypto *plerunq; prouenit: in Asia etiā *ωλῆς
Ciliciæq; lacubus, inuenitur. Folia habet ampla id est, pluri-
*etiā si ad arborum frondes cōparentur, caulem ma-
cubitalē, digiti crassitudine: florem roseum, dupla *Sic Plin.
papaueris amplitudine: & ubi flore exuitur, fert lib. 21. c. 15.
folliculos vesparū fauis similes, in quibus faba su. Græcus ha-
pra operculū, bullantis ampullæ modo, prominet. bet,
Ciborion, aut Cibotion idē nomināt, id est arcu- ως ωῖτα-
lā, quoniā seratur ipsa, humēti glebæ mādāta, et σορ, id est,
ita in aquā demissa. Radice firmatur harundine instar gale-
crassiore, q̄ cruda coctāve estur: ei colocastæ nomē ri-
est. Faba virens mādatur, & exiccata nigrescit,
vulgarē magnitudine superat. Adstringēdi facul-
tatē obtinet, & stomacho vtilē: dysentericis, cœlia-
cisq; prodest, in sparso, polētæ vice, lomento: datur
quoq;

quoque in pulte. Cortices in vino mulso decocti si terni inde cyathi bibantur, magis proficiet. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio ride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur.

Lens.

CAP. XCIX.

Lens frequenti cibo aciem oculorum obtundit. Lagrè coquitur, stomachū malè habet, eumq̃ & intestina inflat: sed aluū cum cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillimè coquitur, nihili in maceratione reddens. Vim habet adstringendi, quæ ex causa aluum cohibet, si detracto ante cortice discoquatur accuratè, primaq̃ aqua inter coquendū effundatur (quippe primū id decoctum ventrē resoluit.) Somnia tumultuosa excitat, capiti, nervis, ac pulmōni inutilis: melius suo fungetur munere cōtra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbisve, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plātagine, aut gallis integris: quæ post decoctionē abijciuntur, vel ruarū rhois quæ obsoniis inspargūtur: verū acetum cū eo diligenter percoqui debet, aliàs aluū conturbat. Cōtra subuersionem stomachi, triginta granula lentis delibrata deuorari proderit: decocta cum poleta, & illita, podagras lenit: sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, vlcera purgat, decocta in
acet

aceto duritias et strumas discutit, cū cotoneo aut meliloto medet inflammationibus oculorū, sedisq; edito rosaceo: sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis, quæ maius remediū exigūt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle, decoquitur: nomis quæ in gangranā euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, & his quæ serpūt, igni sacro, pernionibusq; ut antea dictū est: cōtra mammas in quibus lac in grumos coit, et præ nimia sui copia pfundit, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur. Phasioli. CAP. C.

Phasioli inflant, spiritus cient, agrè coquuntur. Virides cibo aluum emolliunt, ad vomitiones idonei.

Eruum.

CAP. CI.

ERuum paruus frutex omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in valvulis habet, ex quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi vsus conueniens. Eruū capiti onerosum est, aluum esu turbat, sanguinem per vrinam extrahit, elixibones saginantur. Parandæ farinæ ratio hæc est: Vberiora grana candida q; deliguntur, permiscendoq; aqua respergunt, donec sufficienter combibant: postea torrentur, vsque dum hians cortex disrumpatur: molitaq; farinario cribro incernuntur, postremo farina reconditur. Hæc aluo utilis est. vrinam ciet, meliorem colorem efficit, sanguinem per vesicant aut aluum cum torminibus eli-

Officinis
orobus, græ
ca appella
tione voca
tur.

L.

cit, si largius in cibo aut potu assumatur: vlcera
cū melle purgat, lentigines, & vitia cutis in fa-
cie, & maculas totūq; corpus emēdat: nomas, gā-
granas, duritiasq; serpere nō patitur: māmārun
duritias emollit, atra vlcera quæ theriomata vo-
cant, fauosq; emarginat, carbūculos rūpit: cū vi-
no subacta illitu morsibus viperarū, canū, homi-
nūq; medetur, vrinæ difficultates tenesmosq;
ex aceto mitigat. Eruā tabidis, qui alimentū non
senciunt, tostū, & ad nucis magnitudinem melle
exceptū, sumptumq;, conuenit. Eius cremor per-
niones, & pruritus in toto corpore, sanat fouēdo

Lupini.

CAP. CII.

Θιμνος.

Satius lupinus notus est: cuius farina cum
melle delinctu, aut potu, ventris animalia ex-
pellit. Ipsi quoque macerati, & cum sua amari-
tudine esiti, eadem efficiunt. Decoctum eorū idē
munus præstat, cum ruta & pipere potum: quar-
lienosis prodest. Eodem vlcera tetra, quæ therio-
mata vocant, gangranas, incipientem scabiē,
eruptiones pustularum, vlcera in capite manan-
tia, vitiligines, maculasq; fouere vtilissimum. Mo-
ses & partus extrahit, cū myrrha & melle sub-
ditum in vellere. Eorum farina cutem liuoresq;
corrigit, inflammationes cum polenta & aqua
mitigat, tubercula & coxendi cum cruciatu ex
aceto lenit, strumas in aceto cocta illitaq; dissi-
pat, carbūculos rumpit. Decocti coclesti aqua
do

donec in cremorem lentescant, faciem abstergunt:
medetur pecorum scabiei, cum radice nigri cha-
meleontis, ita vt tepente decocto abluantur. Cit
vrinam radix cum aqua cocta. Lupini triti, vbi
maceratu dulcescere coeperint, cum aceto poti, fa-
studium detrahunt, & cibi auiditatem faciunt,
Cignuntur & syluestres lupini, satiuis similes, sed
ominino minores, qui eadem quæ satiuu possunt.

Rapum.

CAP. CIII.

DEcocta rapi radix alit, inflationem parit,
humentem ac fluxam carnē creat, venerem
stimulat: decocto podagræ. pernionesq; fouentur,
contritoq; rapo atque imposito iuuantur: si exca-
uata radici rosaceum ceratum adigatur, & fer-
uenti cinere eliquescat, exulceratis pernionibus
proficiet. Cymæ eius decocta manduntur, & vri-
nam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præser-
tim quæ sensum doloris auferunt, anodyna vocāt,
idoneum est: potum contra venena salutare est,
venerem concitat. Rapum muria conditum, mi-
nus alimenti sufficit: sed multo magis appetētiā
recreat. Syluestre rapum in aruis nascitur. *fru-
ticosum in cubiti altitudinem assurgēs, ramosum,
leue in cacumine folia fert læuia, digitali latitu-
dine, aut maiora: & fructum in siliquis calycula-
tis: cumq; eorum inuolucra aperiuntur, alia intus
siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem
præbet, in qua semina paruula concipiuntur, fo-

* Vox ex
Plinio ad-
iecta.

ris nigra, intus alba. Additur in medicamenta quibus ad detergendā cutem in facie, totoq; corpore, utimur: praesertim quae ex lupini aut erui, iritici aut loli farina, fieri solent.

Napus.

CAP. CIIII.

COeta napi radix inflat, modicum alit. Semen eius potum venenorum vires hebetat, antidotis admiscetur, conditur sale radix.

Radix.

CAP. CV.

Radix (qua Gracis rhabbanus dicitur) ex-
calfacit, flatus gignit, ori suavis est: sed sto-
macho aduersatur, ructus ciēt, urinā pellit, aluo
aptior. *summo* tamē cibo jūmī debet, quō magis
eius distributionē adiuuet, quū aut praesumit, ci-
bum suspēdit: quare vomituris cōmodissimē dat
ante cibū. Sensuum acie excitat: decocta cōtra ve-
terem tussim, & pituita crassitiē in pectore, effi-
cax est. Cortex ex aceto mulso, celerius vomitio-
nes mouet: hydropicis cōmodissimē illinit, lienosis
utilis, sugillata cū melle rapit, et nomas. amolit:
cōtra viperarū ictus auxiliatur, alopecias ad pilū
reducit, lentigines cū loliacea farina emendat, his
qui fungis strangulantur, tam cibo quā potu sa-
lutaris est. Semen vomitiones facit, urinam mo-
uet, mēses ciēt, lienem extenuat, cum aceto illitum
gangrenas validissimē emarginat: coctum cum
aceto mulso anginis perquā utiliter gargariza-
tur, contra cerastis morsus, potum ex vino, auxi-

lio

LIBER SECVNDVS. 187

lio est. Sylvestris raphani, quam Romani armo-
raciam vocant, folia satiuo similia. sed magis lam-
pisanam imitantur: radix gracilis, & tenera sub- *μαλακή,
acris. Tam folium quam radix in olera recipitur: id est, mol-
sed hac excalfacit, urinam concitat: aestuosa est. lis.

Sifer.

CAP. CVI.

Sifer vulgo cognitum, cuius radix decocta ori-
grata est, & stomacho utilis: urinam ciet, &
appetentiam inuitat.

Lapathum, siue rumex. CAP. CVII.

EX generibus rumicis, oxylapathum vocant,
quod in acutum tendit, dura habes extrema, Officinis
in palustribus nascens. Alius est satius, illi disti- lapathium.
milis. Tertiū genus sylvestre, paruum, plantagini
proximū, humile et molle. Quartū est quod alij *Acetosa.
oxalida, alij anaxyrida, aut lapathon vocāt. Fo-
lia eius sylvestri ac exiguo rumici similia, caule
nō magno, semine subacuto, rubete, acris, in caude
& agnatis appendicibus, emicāte. Omnium deco-
cto olere aliis: emollit. Crudi illitu, melicerides,
rosaceo aut croco adiecto, discutuntur. Sylvestris
& oxylapathi, & eius quā oxalida nomināt, se-
mē ex aqua aut vino vtiliter bibitur, cōtra dysen-
terias, & coeliacorum affectus, stomachi fastidia,
scorpionū ictus. Quod si quis in potu praesumat, ni-
hil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto co-
cta aut illitae crudae, lepras, impetigines, & sca-
brofos vngues per sanāt: sed antea locus aceto &

L 3

nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis, decoctū earū sedat, si foveatur, aut in solijs balneariū confricetur. Coctae in vino & instillatae, aurium dentiūq; dolorē mulcēt, strumas parotidasq; discutiunt, lienē cū aceto extenuant. Aliqui amoliendis strumis radicū gestamine utuntur, eas collo appendentes. Trita & admotae feminarum profusua sistūt. cum vino autem potae regio morbo medentur, calculos vesicae comminuit, menses cient, scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathon olus est magnum, in paludibus nascens: easlem habet vires, quas supradicta rumicis genera.

Lampfana.

CAP. CVIII.

Lampfana syluestre olus est: plus alit quā rumex: & stomacho utilius. Cuius folia caulesq; coquuntur in cibo.

Blitum.

CAP. CIX.

Blitum estur oleris modo, aluo utile est, nullius in medicina vsus.

Malua.

CAP. CX.

malache,

Malua sativa esui longē aptior syluestri: stomacho aduersatur, aluū iuuat, sed multo magis caules: interaneis & vesicae utilis. Cruda folia cū salis exiguo māducata, agilopas ex melle sanāt: verū cū cicatricē trahere experint, ea demū citra salem utendū est. Contra aculeatos apuō vesparūq; ictus, illita efficax est: eadē cruda cum oleo trita peruncti, non feriuntur. Vlcera manan-

tiā in capite, fursuresq; cum vrina sanat. Sacris ignibus & ambustis decocta folia, tritaq; vtilissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum vuluas in-
fessione mollit: prodest erosionibus vesicæ: & inte-
stinorum, vuluæ, sedisq; clystere infusum. Ius de-
coctæ cum radice sua, contra omnia venena auxi-
liatur, si continuò à bibentibus reuomatur. Con-
tra phalangiorum morsus remedio est, lac euocat.
Semen in vino potum addito loti syluestris semi-
ne, vesicæ cruciatus lenit.

Atriplex. CAP. CXI.

A Triplicè aliqui chrysolacanon vocāt, cogni-
tum olus est. Duo eius genera, syluestre &
satiuū. Coctū est tur, vt olus. Aliū mollit, panos di-
scutit, siue crudū siue coctum illinatur. Semen cum
aqua mulsa potum, regium morbum sanat.

Brassica. CAP. CXII.

B Rassica satiuā alio est idonea, si modò leui-
ter feruefacta edatur (nam percocta aluum
sistit, sed multò magis bis cocta, aut quæ in lixi-
uio coquitur) stomachum autē malè habet: acrior
est æstiuā. In Aegypto propter amaritudinem non
estur. Cæcutientibus, & tremulis esse prodest:
summo cibo sumpta crapulā discutit, & vini no-
xam restinguit. Melior stomacho cyma, sed a-
crior, & ad ciendum vrinam validior. Ea condi-
ta stomacho inimica est, aluum conturbat. Cru-
dus succus cum nitro & iri deuoratus aluū emol-

crambe,

lit: cum vino quoq; epotus viperarū morsibus auxiliatur: cum fanigraci farina podagris & aricularū vitis illinitur: prodest et sordidis vlcibus & vetustis illitus: caput purgat naribus infusus: menses extrahit cū loliacea farina inditus. Folia per sese illita, aut cū polenta trita, cōferunt inflammationibus, tumoribusq;: epinyctidas, ignem sacrum, leprasq; sanant: carbūculos ex sale rumpunt, fluentes capillos retinent: cocta, addito melle, aduersus depascētia vlcera, gangrenasq; valent: lienosisq; ex aceto cruda prosunt. Mansa, deuorato succo, recusam vocē instaurāt. Decoctum eius potu, aliu & menses ciet. Flos post conceptionem in pessō subditus, partū abortu vitiat. Semen eius, praesertim quae in Aegypto nascitur, potum tineas repellit: in antidota theriaca additur. faciei cutē lentiginesq; expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci vetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant.

Brassica syluestris. CAP. CXIII.

Syluestris brassica, maritimis praeputisq; locis, magna ex parte gignitur: sativae similis, sed candidior, hirsutiorq; amara. cuius cyma in luxuria cocta, ori non insuavis. Folia illitu vulnera conglutināt, & inflammationes tumoresq; discutunt.

ANNOTATIO.

Cōtendunt doctissimi quique eā esse
her

herbam, quam vulgò Soldanā aut Sol-
danellā vocitāt, quæ certè aristolochiā
rotundā, vt à Dioscoride hīc depingi-
tur brassica marina, foliis adamussim
repræsentat. Quòd aut̃ in descriptione
prælōga quoq; adñciāt, niēdosum pla-
nè suspicamur, ac fortè pro μακρά, vt
Græci codices habēt, legendū μικρά, id
est, parua: quod & ipsum Soldanæ no-
stræ pulchrè respondet. Quomodo em̃
folia Brassicę marinę prælōga rectè di-
xeris, si aristolochię rotundæ foliis simi-
lia? quę cū ex ei⁹ descriptiōe, tū oculata
fide nō in lōgitudinē ptensa, sed circina-
tæ ferè esse rotūditatis, sepe cōperimus.
Suū tamen cuiq; in hac re esto iudiciū.

Brassica marina. CAP. CXIIII.

Marina brassica à satina prorsus abhorret,
quòd folia ferat rotundæ aristolochiæ, præ-
longa, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeūt,
singulari, vt hedera, pediculo: albo succo prædita
est, sed pauco, salso gustu, et aliquantū amaro, pin-
gui concretu. Herba in totum stomacho inimica,
acris: vehementissimè aluuna iet, in cibo cocta. Co-
quitur propter acrimoniam cum pingui carne.

Beta. CAP. CXV.

Beta duorum generum est: è quibus nigra co-
quitur cū lēticula, vt ventrē sistat: quod ma-

* Antiqui *gis radice eius præstat*. * Candida aluo utilis
 hoc genus est. Vtraque tamen propter nitrosum humorem,
 betæ, ut au *quæ habet in se, noxi succi est*. Vnde succus earum,
 thor est *cum melle naribus inditus, caput purgat, aurium*
 Theophras- *doloribus auxiliatur. Decoctum radice & foliorum,*
 tus, Sicu- *furfures lentesque; deterget, perimones fotu mitigat.*
 lum voca- *Crudis folijs vitiligines, nitro antea perfrictas: a-*
 runt quo- *lopeciarum inanitates, scalpello prius exasperatas:*
 rum exem- *atque depascentia ulcera, illini prodest. Eruptioni-*
 plo extrita *bus papularum, igni sacro, ambustisque; cocta medet.*
 vna tantum
 litera Sicla
 hodie dicunt,

Portulaca.

CAP. CXVI.

Portulacæ vis adstringit: capitis doloribus,
 inflammationibus oculorum, cæterisque; cum po-
 lenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igni,
 vesicæ doloribus, auxilio est: commanducata, den-
 tium stupores sedat: stomachi & intestinorum
 æstuationem, fluxionesque; mulcet: renes & vesicam
 adiuvat, etiam si erosionem sentiât: veneris impe-
 tus exoluit: succus epotus simili effectu prodest,
 in febribus valens. Contra teretes ventris tineas,
 cruentam excreationem, dysenteriam, hamor-
 rhoidas, & proflua sanguinis, percocta efficax
 est. Item contra sepius morsus. Ocularibus medi-
 camentis utilissimè commiscetur, interaneis flu-
 xione laborantibus, atque vulnarum erosionibus,
 infunditur: contra dolores, quos æstus excitauit,
 caput ex rosaceo & oleo fouetur: eruptiones pa-
 pularum in capite, cum vino emēdat: vulnibus

quæ

quæ ad syderationem spectât ex polenta illinitur.

Asparagi. CAP. CXVII.

Corruda sine sylvestris asparagus vulgaris Officinis
est notitia. Huius cauliculi in cibo cocti ven-
trem emolliunt, urinâ cient. Radicis decoctum con-
tra urinæ difficultatē, regni morbum, renum vitia,
& coxendicum cruciatus, in potu proficit: cū vi-
no autē, phalangiorū morsibus auxiliatur. Si de-
cocti succus super dēte cōtineatur, eius dolori me-
detur. Semen potū ad eadē valet. Canes, vt aiunt,
si decoctum bibant, emoriuntur. Asparagū etiam
nafei prodiderūt, arietis cornibus cōtusis, atq; de-
fossis: quod, quantum equidem sentio, planē à veri-
tate abhorret. * Altilis autē asparagus multis ra-
mis fruticat, folijs fœniculi, longis, numerosis: ra-
dice rotunda, grādi, spongiam habente. Huius te-
neri cauliculi triti in vino albo, renum dolores se-
dant. Assus autem coctus ve, urinæ stillicidium,
difficultatēq; ac dysenterias, mitigat. Radix cum
vino aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Deco-
cta cum ficiis aut ciceribus sumpta, regium mor-
bum sanat: coxendicis cruciatus stranguriamq; le-
uat. Alligata radix, aut haustum eius decoctum,
conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

Plantago. CAP. CXVIII.

Dvo plantaginis genera: minor folia habet
angustiora, minora, molliora, leuiora: &
tenuiora: cauliculo anguloso in terram inclinato:

fl.

* In græco
codice hæc
ad sylvestrē
quoq; as-
paragū refe-
runtur, nec
fit altilismē
tio. Marcel-
lo autem vi-
dentur adul-
terina.

floribus pallidis: semine summis caulibus emicāte.

Altera maior, latior, virentiorq; latis cōstans fo-

* Oleris *ly*s, * oleracei generis: cuius caulis cubiti altitudi-
 nomine per nem petit, angulosus, subruher, à medio ad verticē
 antonoma tenui semine circūdatus: radicibus nititur teneris,
 siam Bras- hirsutis, cādidis, digitū crassitudine aquantibus.
 sicā intelli- Nascitur in lacunosis, sepibus, & locis humidis.
 ge. Nec e- Multo vtilior magna est. Vim habet folia exicca
 nim simpli toriā, cōstringētē: quare omnibus malignis vlceri
 citer ad bus, et fluxioni opportunis atq; eleph. tūis, sordi-
 quaelibet disq; illita prosunt: pfluvia sanguinis, vlcera quæ
 olera quo- serpūt, epinyctidas, carbūculos, nomasq; cohibent:
 rum diuer- vetera vlcera & inæqualia cicatrice obducunt,
 sa admodū facies, folia chironia sanāt, sinus cōglutināt: morsibus canis,
 plantaginis ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidi-
 referri pos- bus, strumis. egilopis, illita cū sale prosunt. Co-
 sunt,

Etum cū aceto et sale olus, dysentericis, celiacisq;
 sumptū subuenit. Datur et in locū heta cū lenticu-
 la coctū. Et ad aquā inter cutē cui leucophlegma-
 tie nomē est, datur & herba decocta post aridas
 epulas, sic vt media antecedit: comitialibus & su-
 spiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta
 subinde oris vlcera, purgat: cum cimolia aut ce-
 rusa igni sacro medetur: fistulis infusus prodest,
 lippitudinibus & aurium doloribus idem succus
 instillatur. Additur quoque in oculorum collyria.
 Gingiuis cruore suffusis, & sanguinis reiectioni-
 bus, potu cōfert: clystere dysentericis infunditur,

otra tabe datur in potu, aduersus stragulationes
 vulua in vellere subicit, etia si vulua fluxione la-
 bore. Semē ex vino potū, alui fluxiones & san-
 guinis excreationes sistit. Decocta radix & man-
 lucatu, et colutiōe, dentiū dolores sedat: eadē cum
 olijs, vlceribus renū et vesicæ in passo dat. Ferunt
 reis radices cū tribus vini cyathis, & pari aquæ
 nodo, tertianis auxiliari: & quatuor quartanis.
 Sunt qui radices gestamine, discutiēdis strumis vti-
 tur. Lauer seu Sium. CAP. CXIX.

Sion in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, Officinis.
 folijs latis, olusatro similibus, sed minoribus, Berula.
 & odoratis. Quæ cruda cocta; esu, calculos rum-
 punt, atque excernunt: vrinas cient, menses &
 partus extrahunt, dysentericis in cibo auxiliatur.
 De sio Cratenas tradit, herbam esse fruticis spe-
 cie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quàm
 menthæ, nigra, & ad erucam accedentia.

Sisymbrium. CAP. CXX.

Sisymbrium (alijs serpillum syluestre vocant) Officinis
 in solo inculto nascitur, menthæ hortēsis simi- Balsamita.
 litudine, odoratius, latiore folio. Inseritur coronis.
 Calfaciendi vim habet: contra stillicidia vrinæ,
 calculosq; semen ex vino bibitur: tormina &
 singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut
 temporibus illinuntur: item contra vesparum a- Vulgo na-
 piumq; ictus. Vomitiones potu cohibet. Alte- sturtiū a-
 rum sisymbrij genus, quod aliqui cardaminam, quaticum.
 alijs

alijs sion appellant. Ea herba riguis gaudet, et eisdem in locis, quibus sion, provenit: quæ ideò nonnullis cardamina nominatur, quòd gustu cardamum, id est nasturtium, representet. Folia primum rotunda prodeunt, adulta erucæ modo fiunt. Id excafacit, urinas movet, crudum estur, purgat lentigines, cutisq; vitia in facie, noctibus impositum, matutinisq; detractum.

Crithmum.

CAP. CXXI.

CRITHMUM, seu potius, ut aliqui, crithamon, fruticosa & undique foliosa herbula est, cubiti altitudinem ferè petens. Nascitur in maritimis, & petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, latioribus, & longioribus, saiso gustu, flores candidi sunt, & semen, ceu roris marini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur: habet intus tritici modo nucleum: radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, et folia incocta vino, potu urinae difficultati & regio morbo auxiliantur: menses cient, estur crudum coctumve in olerè, servatur etiam in muria.

Fuchsio

Cornu cervi
vulgò dictum.* isopom.
rop, id est,
strata.

Coronopus.

CAP. CXXII.

CORONOPUS oblonga herbula est, per terram * repens, fissis folijs: coquitur in olerè: radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo coacta, cis facit. Provenit in aggeribus, & locis incultis, & secus vias.

Son

Sonchus.

CAP. CXXIIL.

Sonchi duo genera: syluestrior quidā est, & magis spinis horret: * alter teneritate quadam * Vulgò ro-
 mollescit, cibus expetitus, anguloso caule, * inani, strum porci
 interdū rubēte: folijs in ambitu per interualla dis-
 ctis. Vtriusq; vis refrigerat, modicè adstringit: * Vox ex
 inde aestuati stomacho & inflammationibus illiti Plinio re-
 rosunt. Succus eorū stomachi rosiones sorbitione posita.
 utigat, lac elicit, in vellere appositus sedis ac vul-
 & collectionibus opitulat. Tā herba quā radix il-
 ta vibratis à scorpione ictibus subuenit. Alter son-
 chus tenerior, arboris instar, latus cōstās folijs: caule
 in ramos exeuntē folia distinguunt, sed ad eadē pollet

ANNOTATIO.

Non video, quāuis & Græcus codex
 sic habeat, quomodo Seris satiua hor-
 tenfi, quod planè est idē, stomacho uti-
 or dicatur, vt subesse errorem non pa-
 rum suspicemur. Marcellus, qui aut in-
 tegriori vsus fuit exemplari, aut locū,
 quē & ipse corruptum iudicabat, resti-
 tuere conatus est, sic vertit, Latioribus
 folijs altera, satiua & in cibus gratior.

Seris sine intybus. CAP. CXXIIII.

Seris duūm generum est. altera syluestris, quā
 spicris & cichorion vocatur: * altera satiua, * Officinis
 latioribus folijs constat, stomacho quā horten-
 sis utilior. Quæ iterum in duas species digeritur:

vna

una folio latiore prodit, lactucarū simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraque refrigerat, & adstringit, stomacho utilissima: alui sistit cocta, si cum aceto adsumatur. Syluestres stomacho meliores: quandoquidem aestuantem ipsum. & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. Cardiacis, per se, aut cum polenta, utiliter illuminantur: podagris, & oculorū inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussis à scorpione subuenit, igni sacro cum polenta medetur. Succus cum cerusa, et aceto, valet ad illitus eorum, quæ refrigerationem desiderant.

Chondrilla.

CAP. CXXV.

Chondrilla, quā aliqui cichorion, alij serin appellant, caulē, flores, et folia habet cichorio similia: quia ex causa nonnulli sylvestris intubi specie esse pronuntiarunt, verum tenuior tota est: in cuius ramulis, gummi mastiches simillimū & tuberculo fabæ inueniri solet: quod cū myrrha tritū, et lintheo appositū, instar oliuæ, feminarū menses trahit. Tusa cū radicibus herba, adiecto melle, diuidit in pastillos, qui nitro admisti vitilignes emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat: quod itē tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admouetur. Contra viperas in vino pota proficit. Succus decocta, in vino, aut per sese potus, alui sistit. Aliud habet chondrillæ genus, foliū ferens oblongū, circūrosum, humi sparsum, caulem succo madentem lacteo:

* μεγέθη
κυμαίνον
id est, magnitudine
fabæ.

Cteo:

LIBER SECVNDVS. 179

leo: radice tenui, rotunda, leui, vegeta, flauescēte, succosa. Cuius & caulis, & folia cōcoquēdi vim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Nasctur in lētis, & cultis.

Cucurbita. CAP. CXXVI.

Cucurbita esui apta: cruda, trita illitu tumores, & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus cōtra capitis ardorē, quā syriasin vocāt, in sincipite illinūtur: oculorū inflāmationes podagrasq; refrigerant. Succus ē ramentis tusis per se, aut cū rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliaur: adustiones cutis in ardētī febre illitu adiunat: lotius feruefacta, & expressa succus, cum melle exiguo, & nitro potus, aluū leniter resoluit. Vinū in cucurbitam recentem excavatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu aluum lenigabit.

Cucumer satiuus. CAP. CXXVII.

Satiuus cucumis aluo & stomacho perquā utilis habetur: refrigerat, corruptionem non sentit, vesicæ prodest, olfactu reuocat, quos animus liquerit. Semen modicē vrinam mouet: cum aceto aut passo, vesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum vino folia, morsus canum sanant: & opinyctidas, cum melle. Peponis caro in cibis, vrinam cit: inflāmatioēs oculorum illita sedat. Ramenta eius cōtra adustionē infantum, quam syriasin vocant, sincipiti imponuntur: fronti adnota, oculorum fluxiones auertunt. Succus cum

M

semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in
 sinigmata, quæ faciem repurgat, & nitorem af-
 ferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota, drach-
 ma pondere, vomitione mouet. Si quisquam mode-
 ratè secundum cœnā vomere cupiat, geminis obo-
 lis sit contentus. Sanat quoq; illita cum melle vl-
 cera cœcreta in modum faui, quæ ceria vocant.

Lactuca.

CAP. CXXVIII.

opidas.

Lactuca satiuæ, quibus natura refrigeratrix
 inest, stomacho grata habetur: somnū conci-
 liat, aliu emolliūt, lac euocāt: verū decocta ma-
 gis alunt. stomachis illotas esse prodest. Epotum se-
 men, assiduas libidinū imaginatiōes in somno, cō-
 pescit, & veneri refragatur. Ipsæ verò frequēti-
 res in cibo, claritati oculorū officiunt: inflamma-
 tionibus, & ignibus sacris opitulātur, muria con-
 diuntur. Cū in caulem exierunt, vim quandā nan-
 ciscuntur, succo aut lacti syluestris lactuce similē.

Lactuca syluestris. CAP. CXXIX.

Syluestris lactuca satiuæ similis est, sed lon-
 gior caulis, & candidiora folia, graciliora,
 & asperiora: amaro gustu est, & viribus aliquā-
 tum papaueri similis: vnde lacteum eius succum
 aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum
 elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos:
 argemia caliginemq; repurgat, contra adustiones
 efficaciter illinitur, cū lacte mulierū. In summa,
 somnum allicit, doloris leuamētum præstat, men-

ses

ses trahit, contra scorpionum & phalangiorum
ictus bibitur. Semen, non aliter, quàm sativæ, libi-
dinū imaginationes in somno amolitur, ac vene-
rem arcet. Succus ad eadem valet, sed viribus in-
firmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea,
vt in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

Gingidium. CAP. CXXX.

Gingidium, aliqui lepidion, in Syria, & Cili Nostrum
cia & plerunq; nascitur: herbula syluestri pa Cerefoliū.
stinacæ similis, tenuior, & amarior: radice par * πλᾶσον
ua, candicante, subamara. Olus hoc crudū, coctū, id est, pluri-
conditū ve estur magna stomachi utilitate: vri mum.
nam cit. Decoctum ex vino potum vesicæ prodest. * τινροτε

Scandix. CAP. CXXXI. ρορ, νό πυ-

Scandix, syluestre olus est, anarum, subacre: κνότερορ.
Quod crudum coctū ve manditur, stomacho Scandix,
& ventri vtile. Decoctum in potu, vesicæ, reni- Aetio lib.
bus, & iocineri confert. j. authore,
agreste o-

Caucalis. CAP. CXXXII. lus est, gin

Caucalis, quam alij syluestre daucum vocāt, gidio simi-
cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhir- le, acre &
suto: folijs apio similibus, feniculi modo per ex- subamarū.
trema multifidis, hispidisq;: candida in cacumine
umbella, suauiter olente, Crudum coctū ve ole-
rum modo estur, urinam mouet.

Eruca. CAP. CXXXIII.

Eruca eruca venerem largiore cibo cōcitāt.
Semen eodem effectu prodest: urinam cit,

concoctioni prodest, aluo perquam commodata. Semina ad condimenta vtuntur: quod, vti in longum tempus asservetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum sylvestris eruca, maximè in Iberia, quæ occidentem spectat: cuius semine pro sinapi incolæ vtuntur. Vrinam vehementius pellit, multo satius acrior.

Ocimum.

CAP. CXXXIII.

Officinis
Basilicon.

Ocimum vulgo cognitum. Id copiosiore cibus oculorum acie hebetat, aluum mollit, spiritum mouet, urinam pellit, lac euocat: agere tamen conficitur. Illitum cum polline polenta, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est: draconis marini, & scorpionis ictibus per se prodest: & cum vino Chio oculorum doloribus. Succus visus caliginem abstergit, destillationes exiccat. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili urinæ, inflatisque naribus haustum, subinde mouet sternutamenta: quod idem herba efficit, sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum vrget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant: quandoquidem manducatum, & in sole positum, vermiculos creat. Aphri autem adiciunt, si feriatur a scorpione, qui ocimum ederint, nullo conflictari dolore.

Orobanche.

CAP. CXXXV.

Orobanche cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruher, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum verg

vergēte: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis fistulosa. Hāc inter quaedam legumina nasci constat, & ea strangulare: vnde orobāche sibi cognomentū vsurpauit. Estur, vt olus, cruda, et in patinis, asparagi modo, decocta. Legumentis addita, coctionē accelerare creditur.

Barbula hirci. CAP. CXXXVI.

Barbula hirci, quæ ab alijs come vocatur, breui est caule: folijs croci: radice longa, dulci, supina: magno super caulem calyce, è cuius summo semen nigrum dependet, vnde nomen inditum est. Herba esui apta est.

Ornithogalum. CAP. CXXXVII.

Ornithogalū cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis: à quibus flores prodeunt foris herbacei, & cum hiantes se pandunt, lactei visuntur: inter quos dissectum, cachryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, vt melanthiū. Radix bulbosa, cruda & cocta mādatur.

Tubera. CAP. CXXXVIII.

Tvbera rotunda radices sunt, sine caule, sine folijs flauescētes: vere fodiuntur, cruda & cocta eduntur.

Smilax hortensis. CAP. CXXXIX.

Hortensis smilax, frutex, cuius semē à nonnullis lobia vocatur: folia habet hederæ, molliora tamē: tenues caules, & capreolos vicinis

* Græcè est, fruticibus circumuolutos: qui tantum adoleſcunt;
 ἐν μίγδον ὅτι topiarias ſcenas repræſentare videantur: ſili-
 ὡς οὐ πύρι, quas ſœnigræci proferunt longiores & toroſiores, in
 ῥοῦλα, quibus ſemina renum ſimilia, ſed in æquali colore
 qđ rectius recluduntur, * quæ quadā ex parte fulueſcunt. Si
 forſitan red liqua cocta, cum ſemine in oleribus, aſparagi mo-
 dideris: quæ do, eſtur. Vrinā ciet, & tumultuoſa ſomnia facit.

magna ta-

Medica.

CAP. CXL.

mē ex par-

te fulueſcūt,

ut intelliga

folia cōtrahit,

caules edēs trifolijs,

& ſiliquas cor-

mus, Smila

niculorū modo intortas,

in quibus ſemen lētis ma-

ca hāc diuer-

gnitudine dependet.

Id ſuccatum,

iucundi ſaporis

ſi quidem co-

gratia, conditaneo ſali admisceſtur.

Viride, quibus

coloris ſemi-

refrigeratione opus eſt, illitu ſuffragatur.

Herba

na, magna

tota pro gramine utuntur,

qui pecora alunt.

tamen ex

parte fulue-

ſcentia pro-

creare.

Aphaca.

CAP. CXLI.

Phaca in aruiſ

naſcitur, altior lente, tenui-

bus folijs: ſiliquas lenticula maiores fert, in

quibus terna quaternāve ſemina nigra, lente mi-

Est quam

nora, continentur: quæ adſtringendi vim habent:

rura Viciā

quare torrefacta, ſtomachi aluiq; fluxiones ſi-

ſylueſtrem ſtunt, ſi freſa lentis more decoquantur.

vocitant.

Porrum capitatum. CAP. CXLII.

Capitatum porrum inflationem facit, no-
 xium ſuccum creat, tumultuoſum ſomnum
 parit, urinam ciet: aluo acōmodatur, extenuat,
 oculorum aciem hebetat, menſes pellit: ſed ledit

exul

exulceratam vesicam, renesq; cum ptisana verò coctum, esu pectoris vitia extrahit. Coma eius in aqua maris, & aceto cocta, in desensionibus, ad præclusiones vuluæ, & duritias, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen aerius est, & quãdam adstrictoriam vim habet: quare succus cum aceto, addito thure aut manna, sanguinis profuua sistit, maximè si naribus eripat. Venerem stimulat contra omnia thoracis vitia tabemq; pro delinctu efficax est: arteriam esu purgat, sed si assiduè estur, visus obscuritatem inducit stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est: ipsum quoque cum aceto aut thuris polline, la Ele aut rosaceo, utiliter aurium doloribus, & sonitui instillatur. Varos tollunt folia illita cum rhu rhoeis, qua ad obsonia vtuntur: epinyctidi medentur, crustas ex sale illita rumpunt, veteres sanguinis reiectiones cohibent, si binis drachmis, & equali baccarum myrti pondere bibantur. Ampeloprasum stomacho magis aduersatur, & plus porro exalfacit: vrinam & menses vehementius ciet. Id contra serpentium morsus esse conuenit.

Cepa. CAP. CXLIII.

CEpa longa acrior est, quàm rotunda, item flaua quàm cãdida, & sicca quàm viridis, & cruda quàm cocta, aut sale condita. Omnes ta

Croton.

men mordent, flatus gignunt, appetentiam inui-
tant, sitim movent, & extenuant: fastidium pa-
riunt, & expurgant: aluo vtilis sunt. E& detra-
ctis purgamentis in oleum coniecta, hæmorrhoi-
das, reliquosq; excretionum exitus referant, sub-
ditæ pro balanis. Succus cum melle illitus, oculo-
rum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & inci-
pientibus suffusionibus auxiliatur: angina eodem
perunguntur: suppressos menses pellit, caput pur-
gat naribus infusus: canis morsibus cum aceto, ru-
ta, & melle illinitur: cum aceto autem perunctas
in sole, vitiligines sanat: & cum pari spodio, sca-
bras lippitudines sedat: varos cum sale reprimat:
contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo
adipe utilis est: citæ aluo prodest: in auribus soni-
tû ac gravitatē emēdat: ad purulentas aureis, &
eliciendū earundem aquā, valet: alopecie earum
succo perfricantur, qui celerius, quàm alcyoniū pi-
los euocat: largiore cibo cepa capitis dolores ciet,
cocta q; vehementius vrinam pellit: eos lethargicos
efficit, qui valetudinibus aduersis, ea etiam cocta,
plus æquo vescantur: elixa, & cum passis vnis, &
fico illita, tubercula cōcoquit, & celerrimè rūpit.

Allium.

CAP. CXLIII.

Allium quoddam satiuū atque hortense ha-
betur, quod in Aegypto, singulari, vt por-
rum, capite cōstat, dulce, in purpureū vergēs, par-
num: reliqua verò magna, et cādida, ex pluribus
coag

oagmentantur nucleis, quos aglitas, id est spicas,
 Græci nominant. Aliud est sylvestre, quod ophiof-
 orodon, id est anguinū, vocant. Vis allij acris est:
 excalfacit, mordet, excernit, aluum turbat, infla-
 tiones facit, stomachū exiecat, sitim gignit, flatum
 hermoet, summā corporis cutem exulcerat, acie
 oculorū esu hebetat. Eosdē effectus præbet angui-
 nū, quod & elaphoscorodon dicitur: latas ventris
 tinea in cibo sumptū ahigit, vrinas detrahit: con-
 tra viperarū ictus, & priuatum hæmorrhoi, pro-
 dest, ita vt nō aliud magis, si cū vino iugiter assu-
 matur, aut tritum in eodē ebibatur: contra rabio-
 sorū morsus & illitu, & cibo valet. Magnæ &
 allio vtilitates contra aquarū mutationes: vocem
 clarificat, veterem tussim crudū coctū mve lenit:
 potum autem cum origani decocto, pediculos, &
 lendes enecat: cremati cinis illitus sugillationibus
 cū melle, & alopecijs cum nardino vngvine, me-
 detur: eruptiōes papularū cum oleo & sale sanat:
 vitilignes, lichenas, lentigines, vlcera capitis ma-
 nantia, lepras, & furfures, cum melle eximit: cū
 thure, & teda decoctum, dentiū dolorem leuat, si
 in ore contineat: contra venenatos muris aranei
 morsus, cum ficulneis frondibus, & cumino illini-
 tur. Feruefactæ comæ ius, fæminarum desesiōni-
 bus additū, menses, & secundos partus extrahit.
 Allium eiusdem gratia suffitur. Factum ex eo,
 & nigra oliua intritum, quod myttoton vocant,

esu cit urinā, ora venarū patefacit, hydropicis v-
tile. Scorodoprasum magnitudine porri, æquat,
qualitatū porri, et aliū particeps: vnde p̄miscuas
sibi vires ex utroq; vendicauit, effectus aliū, &
porri pr̄hens: inefficacius tamen Coctum, porri
modo, dulce scit, & in olerum vicem transit.

Sinapi.

CAP. CXLV.

Sinapi hortense, aliqui napi vocant. Eligi de-
bet adultum, valde rufum, nō magnopere sic-
cum, sed quod fractum internē vire scat, & velu-
ti quodam succo madeat, cæsum colore: siquidem
recens id genus, tempestiuum habetur. Ad calfa-
ciendum, extenuandum, extrahendum, efficax
est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur:
contra præduros tōsillarum tumores, ac veterem
callasamq; arteriæ scabritiem, succus ex aqua, et
melle, conuenienter gargarizatur: sternuta men-
ta ciet, tritum & naribus admotū: comitialibus
quoque auxiliatur. Fœminas vuluæ strangulatū
oppressas excitat: lethargicis, derafo capite, illini-
tur. cum ficis admistum, donec rubescat locus, &
ad coxendicum cruciatus impositum, * ad lienes,
& omne genus dolores confert, cum permutandæ
valetudinis, causa ex alto vitia extrahenda sunt.
Alopecijs illitum medetur, faciem purgat, sugilla-
ta cum melle, adipe aut cerato rapit. Ferae impe-
tigines & lepræ, eo cum aceto perunguntur: con-
tra februm circuitus aridum bibitur, aut potui,

* κ, σπλῆ-
νας καὶ κα-
θόλου ὅς
πᾶν χρό-
νιον ἀλγῆ-
μα.

pol

olentæ modo, inspargitur: extrahentibus empla-
ris, scabiemq; extenuatibus, vtiliter admisceri so-
t: tritū, gravitati aurium & sonitui, cū fico im-
positum prodest. Succus ad hebetudines oculorum
& genarū scabritias magna vtilitate illinitur.
Expressus recenti semine succus, in sole siccatur.

Nasturtium. CAP. CXLVI.

Nasturtium optimum constat esse Babylo-
nicum. Omnium semen est acre: ex calfa-
cit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas
excitit, lienem imminuit, partus examinat, men-
ses cit, venerem stimulat, sinapis & erucæ simile
intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Il-
litum cum melle, lienem extenuat, fauos expur-
gat, pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus inco-
ctum. Serpentiū venenis potum resistit, atq; eas
suffitu fugat: capillorum defluvia cohibet: carbon-
culos ad suppurationem perducit, & rumpit: co-
xendicibus cum polenta commodè ex aceto illini-
tur, tumores collectionesq; discutit, emittit furun-
culos, illitum cum muria. Herba ad omnia eadem
effectus, licet minor.

Thlaspi. CAP. CXLVII.

Thlaspi, herbula angustis folijs, digitali lon-
gitudine, in terram versis, suppinguibus, in
cacumine diuisis: binūm dodrantum cauliculo,
tenui, non sine adnascantibus ramis: fructu cir-
ca ipsum totum, ab extremo in latius se panden-

* *Διόσκορις* te: semine nasturtij incluso & lenticulae vasis ejus, id est, gie, nisi quod infringitur (unde nomen accepit) disci figura. flos albicat. Nasctur in semitis, & sepibus, & sisq;. Semen asperi gustus, excalfaciens: bilis utrinq; extrahit, potu acetabuli mensura: pro ischiadicis infusum: sanguinem potu educit, internas suppurationes rumpit: menses ciet, sed paratus enecat. Alteru thlaspi tradit Cratenas, quod aliqui Persicon sinapi vocant, latis folijs, radicibus magnis: utile ischiadicorum infusioni.

Draba

CAP. CXLVIII.

Alij arabis. **D**Raba herba ad cubiti altitudinem assurgit, tenues spargens & ramos, & ex utroq; latere folia, ceu lepidij, sed molliora, & candidiora: id est, vir- cacumine vero sambuci umbellam gerit, candidas flores habentem. Herba haec cum ptisana coquitur in Cappadocia maxime. Semen aridum pro pitre obsonijs admiscetur.

Irio.

CAP. CXLIX.

ERysimon, Latini irionē vocāt, iuxta vrbes Erudera, hortosq; nascitur, folijs eruce sylvestris: cauliculis in lori modū lentis & obsequiosis floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, vifoenogræco, cornicularis: semine nasturtij, exiguo, vrentis gustus. Contra thoracis fluxiones efficax est, & purulenta extussumuntur: regio morbo, & coxædicibus prodest: contra venena in delinctu cum melle datur: illinitur ex aqua aut melle utiliter

acis carcinomatis parotidibus, duritijs mamma-
rum, & testium inflammationibus. In totū ex-
nuat, & calfacit. Mitius multò ad clysteres fiet,
aqua madescat atq; torreatur, vel linteo illiga-
tum, pinsita farina oblitum perassetur.

Piper.

CAP. CL.

Piper in India nasci, breui arbore traditur:
quæ inter initia, prælongum fructum, veluti
liquam promit, quod longū piper est: habet intus
liquidum tenui milio simile, quod tandē in perfectū
piper euadit. Id autem suis tēporibus, deliscēs, pā-
ensq; sese racemos emittit, grana ferentes qualia
videmus. Ea acerbā candidū piper faciūt, aptum
cularibus remedijs, antidotis, et medicaminibus,
uæ cōtra venenata parātur: theriaca vocāt. Lon-
gum verò vehemētius mordet: & quoniam prius
uām ematurescat decerptum est, subamarum re-
inquitur, antidotis & theriacis medicaminibus
expetitū. Nigrum verò, vtpote quod tēpestiua ma-
uritatem collectū sit, odoratū esse cōstat, cādido sua-
uius, acrius, & ori gratius, necnō ad condimenta
vtilius. Sed candidū, & adhuc in acerbum ver-
rēs, antè dictis infirmius est. Eligi oportet grauissi-
mū, plenū, nigrum, sine multis rugis, recens ac mi-
nimè furfurosum. Inueniuntur etiā in gene-
re nigri semina nutrimento defēta, cassa, inania,
minimiq; ponderis, quod vocant brasma. Vis o-
mnium excalfacit, vrinam ciet, cōcoquit, extrahit,
discut

discutit, absterget caliginē quæ oculis obuersatur.
 Piper, febrium horroribus circuitu repetentibus
 siue potu, siue illitu, subuenit serpentium morsibus
 auxiliatur, partus extrahit: conceptū adimere cre-
 ditur, statim a concubitu suppositum: tussi, omni-
 busq; pectoris vitijs, siue eclegmate, siue potu, suc-
 currit: anginae eo & melle cōuenienter perungun-
 tur: potū cum recentibus laurifolijs, tormina dis-
 cutit: cū rufa passa manducatum, pituitam à cap-
 te elicit: valetudinem tuetur, dolores finit, appeten-
 tiam mouet: concoctionem adiuuat, ad intinctu
 esculentorum additum: strumas cum pice discutit
 vitiligines ex nitro emaculat. Ficili nouo, vt len-
 tacula, motum torretur. Non est huius arboris ra-
 dix gingiber, vt aliqui existimauere, sicuti paulo
 post ostendemus. Nanq; piperis radix costo simi-
 lis est, ora gustantium accendit, saluam ciet. Hæ-
 lienem reprimat, cum aceto illita, aut pota: caput
 etiam purgat, manducata cum semine pedicularis
 herbae, quam staphudem agriam vocant.

* φακή, nō
 φασίμ.

Gingiberis.

CAP. CLI.

Gingiberis sui generis planta est, in Troglo-
 dytica Arabia magna ex parte nascēs: qua
 virente, ad multa, perinde atque nos ruta, vtun-
 tur, & primis potibus & edulys admiscet. Hu-
 ius radices, cyperi modo, paruae sunt, candican-
 tes, & odoratae, atque piper sapore imitantur. Eli-
 gi debent quæ teredines non nouerunt. A multis
 iamem

men ob id & concludunt, quod celeriter carie sen- * ταριχεύε
ant, at fictilibus in Italiam asportatur. Gingibe ται διὰ τὸ
s cibo conueniens est, & cū cōdimento assumitur. εὐσχηπτον,
excalfactoriam vim & excoquētē habet: aliū le id est, sale
iter emollit, stomacho utilis est, efficax aduersus conspergunt
a quæ oculis caliginem offundunt. In antidota tur, quod fa
ddi solet. In summa, piperis viribus respondet. cile putre-

Hydropiper. CAP. CLII. scant.

HYdropiper apud aquas nascitur, quæ sta-
gnant, aut pigro lapsu repunt: caulē edit σηπεδον,
geniculatum, & prædurum, multis alis concauum: id est, solidū
folia menthæ, maiora, molliora, candidioraq; gu
stu piperis, acri, citra tamen vllam odoris gra-
tiam: fructum acrem, in surculis paruis, prope
folia racematim coherentem. Folia cum semine
illita tumores veteresq; duritias discutunt, sugil-
lata delent: quæ postquam inaruerunt, tusa pro
pipere in obsonijs admisceantur. Radix parua, nul-
lius in medicina momenti.

Ptarmica. CAP. CLIII.

PTarmica exiguus frutex est, surculos ha-
bens paruos, multos, & rotundos, abrotono
non dissimiles: & circa eos folia oleæ, longa,
multa, & in cacumine capitulum, vti anthemi-
dis, paruum, rotundum, quod suo acri odore ster-
nutamentum excitat: vnde nomen accepit. Folia
cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores
sternutamenta efficacissimè mouent. Nascitur in
montibus

montibus & petrosis.

Radicula seu lanaria herba.

CAP. CLIIII.

Cēsetur ea **S** Truthiū herba vulgò nota, qua purgandis la-
 quam vul **S**nis vtuntur, qui eas eluunt. Huius radix est
 gò saponaria acris: vrinam ciet: prodest tussi, iocinerosis, or-
 rā dicūt thopnæ ex melle sumpta, cochlearis mensura:
 aluum soluit. Eadem cum panace & capparis ra-
 dice calculos frangit, & cum vrina exturbat. du-
 ritiam lienis absomit: menses imposta trahit,
 partus efficaciter enecat. Cum polenta autem &
 aceto illita, lepras tollit: tubercula discutit, cum
 farina hordeacea, & vino decocta. Miscetur &
 malagmatis, & ocularibus collyrijs, claritatis
 causa. Sternutamenta mouet, per os purgat, trita
 cum melle, & naribus infusa.

Cyclaminus. CAP. CLV.

Cyclaminus folia habet hederæ, purpurea,
 varia, in quibus suprà infraq; allucant ma-
 culæ: canle nudo, quaternos digitos æquante: flo-
 ribus in eo * purpureis, rosarum effigie: radice
 nigra, & aliquantum lata, vt rapū videri pos-
 sit. Quæ cum hydromelite pota, pituitā aquamq;
 detrahit: menses potu appositūve ciet. Tradunt,
 si prægnans radicem transgrediatur: abortū fie-
 ri. Partum appensa accelerat: contra venena,
 præsertim leporis marini, ex vino bibitur: illita
 contra serpentū ictus, remedio est: immista vi-

no

LIBER SECVNDVS. 195

no inebriat: regium morbum discutit, tribus dra-
 hmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet
 et eum qui ebibit, multis vestibus contectum, loco
 calido, & à persfrictionibus tuto, recumbere, quò fa-
 cilius exudet: eiectiones autem sudores fellei colore inue-
 niuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus
 infunditur: ad deicienda quoque alui excremen-
 ta, in vellere sedi subijcitur: illito umbilico & imo
 ventre coxarum tenuis, aluum emollit, & abortum
 efficit: suffusionibus, & retusæ oculorum aciei, ob-
 litus cum melle succus prodest. Medicamentis abor-
 tum inferentibus admiscetur. Succus cum aceto illi-
 tus, prociduum sedem restituit. Exprimatur tusa
 radice succus, & ad mellis crassitudinem decoqui-
 tur. Radix autem purgat, eruptiones papularum re-
 primit, vulneribus ex aceto per se aut cum melle
 medetur, lienem absorbit: vitia cutis in facie, &
 alopecias emendat: eius decocto luxata, podagras,
 & capitis ulcuscula, permionesq; foveri congruum
 est: ipsaq; in oleo vetere feruescenda, illito oleo, ul-
 cera ad cicatricem perducit. Cavata radix oleo
 expletur, & cinere feruente imponitur, adiecto in-
 terdum Tyrrhenica momento, ut strigmenti cras-
 situdinem unguentum contrahat, cum primis utile
 permionibus. Radix, scillæ modo, concisa reponi-
 tur. Narrant ad amatoria assumi contusam, &
 in pastillos diuisam. Nasitur in umbrosis, maxi-
 mè sub arboribus.

N

Altera cyclaminus. CAP. CLVI.

Est & altera cyclaminus, quam cissanthe-
mon aut cissophyllon vocant: folijs hederæ, sei-
minoribus: gemculatis caulibus, crassisq; circa vi-
cinas arbores, capreolorum modo se voluentibus
flore candido, odorato: acinis hederæ mollibus,
lenti gustus, aliquantulum acris: radice superua-
cua: nascitur in asperis. Huius acini, drachma
vnius pondere poti, cum vini albi cyathis duobus
quadraginta diebus, lienem per vrinam & aluum
absument. Ad orthopnoeam bibitur, reliquias à
partu purgat.

Dracunculus. CAP. CLVII.

Dracunculus folio constat hederaceo, magno,
candidis notis insigni: caule recto, bicubitali,
versicolore, maculis resperso purpureis, ita vt an-
guem planè referat, baculi crassitudine: fructus sum-
mo caule racematim coheret, colore primum her-
baceo, & cū ematuruit, croceo, gustu feruens, mor-
daxq;: radice aliquantulum rotunda, bulbosa, aro-
non absimili, tenui obducta cortice. Nasct in sepi-
bus vmbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus,
aurium dolorem mitigat: naribus etiā ex lana im-
positus, polypum absument: carcinomata illitu sistit:
triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus
inferunt: odore aiunt posteaquā flaccidi flores emar-
cuerunt, cōceptus adhuc teneros enecare. Radix ex-
calfacit: orthopnoeis, ruptis vulsis, tussi, destilla-
tion

tionibus. auxiliatur: humores pectoris excreatu facile reddit, siue cocta tostataq; cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur: vrinā pellit, venerem excitat, cum vino pota: phagedenas vlcerum, & quæ cacœthe vocantur, trita cū melle & bryonia alba expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistulas & eijciendos parius fieri solent: qui radice suas manus perfricauerunt, à viperis feriri negantur: illita ex aceto, vitiligines emaculat. Folia recentibus vulneribus, linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decocta in vino pernionibus apposuisse prodest: caseus folijs inuolutus, à putredine defenditur. Succus radicis ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctave, ad sanorum vsus, pro oleris recipitur: in Gymnæsijs insulis, quæ Baleares vocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiujs placentarum loco offerunt. Radix messibus effoditur, lotaq; frustatim conciditur, & lino traiecta, siccatur in vmbra, & ita reconditur.

Arum.

CAP. CLVIII.

ARon, apud Syros lupha vocitatum, folia Iarus offi-
emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem suppurpureum, dodrantalem, pistilli specie, à quo croceū semen exit. radice dracūculi alba, quæ decocta estur, vt pote cum minus acris sit. Folia ad esum cōdiuntur, & arida per se, decocta manduntur. Radix,

N 2

semen & folia, dracunculi vires habens. Priuatim radix ex fimo bubulo podagris illinitur, & dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

Arisarum.

CAP. CLIX.

Arisarū exigua herbula est, cuius radix olea magnitudinem implet, longē maioris quā aron acrimoniae: vnde illitu nomas sistit. Fiunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illitu radice, genitale animalis cuiuscunq; in perniciem agitur.

Hastula regia.

CAP. CLX.

Officinis
Aphrodi-
tis.

Hastula regia vulgaris notitia est, folijs maioris porri: caule leui, ferente in cacumine florem, quem anthericon appellant: radices subiacent oblongae, rotundae, glandibus similes, gustu acres, quae excalfaciunt: vrinas & menses epoteciunt: lateris doloribus, ruptis, conuulsis & tussibus, drachma pondere pote ex vino, medentur. Ea verò vomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine commanducata: à serpente demorsis datur aptissimè, verum trium drachmarum pondere, folijsq; floribus & radice ex vino, morsus illinire oportet. Item vlcera sordida & depascentia, mammarum quoque & testium inflammationes, tubercula, furunculosq; decoctis in face vini bulbis, recentibus inflammationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto vetere vino dulci, myrrha & croco decoquitur, fitq; perquam vtile oculis medicamen-

tum

LIBER SECVNDVS. 199

tum: ad purulentas aureis per se, & cum thure,
melle, vino et myrrha tritus, prodest: in contrariā
urem infusus, & dentium dolorem mitigat. Cinis *καθ' ἑαυ-
radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum τὸν ἐγχυσ-
in excanatis radicibus igni decoctum, illitus exulce- θείας.
ratis pernionibus & ambustis igni, conducit: &
surditati, instillatum in aurem, auxiliatur. Can-
lidam vitiliginem, & linteo antea perfrictam in *προανα-
sole, illita radix emendat. Semen floresq; in vino τριφέντα
noti, scolopendræ & scorpionum venenis, mirum ἐν ὀθνίῳ
in modum resistunt: aluum purgant.

Bulbus esculentus. CAP. CLXI.

Escultēus bulbus vulgo cognitus, à nobis estur:
stomacho & alui utilis rufus, et qui ex Aphri-
a defertur. Amarum verò & scillinum, stomacho
ptior est, & concoctionē adiuvat. Bulbi omnes a-
rimoniā habent, exalfaciūt: venerē stimulant, lin-
guam tōsillasq; exasperant, multum alimēti præ-
iēt, carnes creāt, inflationē pariunt: luxatis, fractis,
articulorū doloribus efficaciter illinunt: spicula ex-
rahunt: gangrænas & podagras ex melle aut per
se, hydropicorū tumores, & canum morsus cum
melle & piperis polline illiti cohibent: sudores cō-
escunt: stomachi dolores mitigant: furfures &
ulcera quæ in capite manāt, cum tōsto nitro abster-
runt. Sugillata varosq; per se aut ex oui luteo, &
entigines cum melle vel aceto, emendant: fractis
uriculis unguibusq; ex polenta medentur: idem

calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus : item cum cinere è manarū capitibus, impositi : cremati verò & cū alcyonio misti, vitia cutis in facie, atrasq; catrices, in sole illiti, emaculant. Faciunt ad rupta si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant.

Bulbus vomitorius.. CAP. CLXII.

Bulbus quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multo & longiora quàm bulbus esculentus : radicem similem. & cortice nigro. Ea radice mansa, aut decoctum eius potum, vesicæ malis medetur. vomitiones mouet.

Scilla.

CAP. CLXIII.

Officinis
squilla,
Varronis
more.

Scilla vim acrem atque feruentem habet: assata ad multa vtiliorē esse constat. Polline aut crustam subacto, aut luto oblita, in clibanum conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit : qua exempta, non emollescat, alitero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius fiunt : nam quæ ita non assatur, interaneis maximè noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnum dimittatur. Sumi etiam solet quod maximè est medicum, direptis vinotenus tunicis, quod frustatin confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem nec acrimoniam habeat traiectaq; lino frusta ficcantur in vmbra, ita vt ne vlla quidē parte se contingant: his scillæ segmi-

vibn

nibus ad oleum, vinum, aut acetum scillinum vti-
mur. Ad rimas pedū, interna pars cruda scillæ in
oleo feruē facta, aut cum resina liquefacta imponi-
tur: decocta in aceto demorsis à vipera, cataplasma
est. Ad singulas assæ parteis adiectis octonis tostis sa-
lis, cochlear vnum aut alterum damus ieiunis, ad
emolliendā aluum: in potu autem & odoratis me-
dicaminibus, & quibus urinam ciere volumus, hy-
dropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibus, re-
gio morbo, torminibus, in tussi vetere, suspiriosis, et
ore reijcientibus tres obolos, in delinctu ex melle
sumpsisse satū est. Coquitur cum melle, & estur eo
rundem gratia, maximè ut concoctionem adiuvet.
Strigmenta per aluum extrahit. Cocta & simili
sumpta modo, eosdem præbet effectus: sed cauendus
scillæ vsus, his qui intestinum sentiunt vlcus. Ad
pensiles verrucas & pernioles, tosta efficaciter illi-
nitur. Tertium semen, & in carica aut melle deno-
ratum, aluum emollit. Scilla tota in limine ianua
suspensa, mali medicamenti noxam arcet.

De Pancratio. CAP. CLXIIII.

Pancratium, quod aliqui scillam appellant,
radice est magni bulbi, subrufo colore aut
suppurpureo, gustu amaro ac feruente: folijs li-
lij, sed longioribus. Scilla vires & præparatio-
nem habet, eodemq; ponder: in morbis efficaciter
assumitur: cui tamen mitior quàm scillæ facultas
inest. Radicis succus cum erui farina digeritur

in pastillos, qui hydropicis splenicisq; cum hydromelite, commodissime dantur.

Capparis.

CAP. CLXV.

Capparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagatur: spinas, ut rubus, habet, in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructum oleæ similem, qui cum dehiscens panditur, florem candidum promit: quo excusso, nonnihil glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis punicorum similia ostendit, parua, rubicunda: radices lignosas spargit, grandes numerosasq;. Tenui plerunque solo, asperisq; locis, in insulis & iuxta rudera nascitur. Caulis & fructus, cibi gratia condiuntur: aluum turbat, stomacho aduersatur, sitim gignit: cocta tamen stomacho quàm cruda utilior est. Fructus drachmis duabus in vino potus, quadraginta diebus, lienem absunit, & urinam cruentumq; excrementum emittit: bibitur utilissimè in coxarum doloribus, & nervorum resolutione, item ruptis & convulsis: menses ciet, caput purgat. Dentium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radice cortex ad eadem proficit: vlcera omnia Vetera, & sordida, & quæ occalluerunt, expurgat: lienosis cum farina hordei illinitur: dente demorsa, dolori eius auxiliatur: cum aceto trita, vitilignes albas absterget. Radix foliaq; intrita, strumas ac duritias discutunt. Aurium vermiculos infusus suc

CMS

cus enecat. Aphrica, & præsertim Marmarica cap-
baris, vehementer inflat. Apula vomitus facit. &
quæ à Libyco, & quæ Rubro mari defertur, mirum
in modum acris est: siquidem in ore pustulas exci-
tat, gingivasq; osse tenus exest: quare in cibis non
abire damnatur.

Lepidium.

CAP. CLXVI.

Lepidium aliqui gingidium vocant, herbula Censetur
vulgo nota: muria cum lacte servatur. Vis piperitis o-
foliorum acris & exulcerans: quapropter ischia-
litorum. dicis trita, præsentissimum est auxilium, si cum
helenij radice, quarta parte horæ, illinatur: lieno-
sis simili modo prodest. lepras eximit. Radix ap-
pensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

Ranunculum.

CAP. CLXVII.

Complura ranunculi genera. vis tamē omni-
bus una, acris, & vehemēter exulcerans. Nā Vulgò A-
pium risus
vnum coriandri folijs constat, latioribus, subalbi-
dis, pinguibus: flore luteo, interdum purpureo: cau-
le gracili, cubitum alto: radice alba, exigua, ama-
raq; multis capillamentis, hellebori modo, fibrata:
nascitur in limitibus humidis. Alterum lanugino-
sus, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, & ple * πλῆσον,
runque in Sardinia proveniēs, quam acerrimum, id est, copio-
sum.
quod sylvestre apium appellat. Tertium minimū,
odore gravi, flore aureo. Quartū huic simile, flore
lacteo. Folia, flores & cauliculi recentes, illitu ex-
ulcerant, & crustus non sine dolore gignūt: quare

ungues scabros extricant, scabiem eximunt, stigma
ta delent: formicantes verrucas, & pensiles, alo-
peciasq; paulisper illita tollunt. Tepēte decocto per-
niones fouentur. Sicca radix, tritaq;, sternutamen-
ta ciet, naribus admota: dentium dolorem appen-
sa leuat, ipsos tamen frangit.

Anemone. CAP. CLXVIII.

DVo anemones genera, vnum syluestre, alterū
in cultis nascens. Cuius multæ species: vna
phoeniceū florem profert: altera candicantem, aut
lacteum, aut purpureum. harum folia coriandro
similia, ceterū scissa tenuius in terram inclinan-
tur: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, vt pa-
paueris, & in medio capitula nigra, aut cœrulea:
radix oleæ magnitudine, aut amplius paulò gran-
descit, ac veluti geniculis quibusdam cingitur. Syl-
uestri amplitudo prorsus maior, latioraq; folia, et
duriora: oblongius caput: flore puniceo, tenuibus,
& multis radicum capillamentis. Acrior est, quæ
nigra habet folia. Vis vtriusq; acris: ea de cau-
sa succus naribus infusus, purgat caput. Comman-
ducata radix pituitam trahit: decocta in passo &
illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatri-
ces eorundem & hebetudines emendat, sordida vl-
cera abstergit. Folia, & caules, si cum ptisana de-
cocti edantur, copiam lactis præbent: menstrua
ciunt, vellere apposita. Illita quoque lepras exi-
munt. Sunt qui errore ducti, argemonem nomina-

ri eup

ri eupatorium putent: quoniā à syluestri anemone, argemonē & papauer, quod rhœada appellāt (de quo inter papaueris genera referemus) propter colorum cognationē in floribus, distinguere nō possunt. Verū papauer & argemone colore minus saturato spectatur, & vtraq; tardius floret. Quinetiā argemone crocēū succū, gustu admodū acrem, reddit: rhœas verò candidiorē & acrē. Insuper anemone & rhœadi capitula syluestris papaueris similia insunt, sed in anemone supernè crassiusculū, in rhœade subangustius. Anemones genera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In aruis illa sæpius enascuntur.

Argemone. CAP. CLXIX.

ARgemone in totum syluestri papaueri similis est: folia habet anemones, diuisa: florem puniceum: caput in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, & summis partibus latum: radicem rotundam: succum croci colore, acrem, dimittit. Argema & nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationes compefcunt.

Anagallis. CAP. CLXX.

DVo anagillidis genera, quæ tantum flore distant. Nam quæ cœruleo flore est, fœmina dicitur: mas, quæ phœniceo. Frutices sunt parui in terra iacentes, folijs in quadrangulo cauliculo pusillis, subrotundis, ad helxinæ folia accedentibus: semine rotunda. Vtraque mitigandi

vina

vim habet: inflammationem arcet, adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus caput gargarizatu purgat: & naribus infusus, dolore dentium lenit, si in aduersam narem iniiciatur: argema cum melle Attico emendat: retuse oculorum aciei auxiliatur: contra viperarum morsus, iocineris et renum vitia, si ex vino bibatur, prodest. Tradunt eam quæ cæruleum ædit florem, prociduam sedem reprimere: quæ verò phœniceum, illitu euocare.

Hedera.

CAP. CLXXI.

Hedera differentias multas in specie sortitur, summas autem genere treis. Nam quædam candida est, altera nigra, tertia helix. Candida, fructum fert candidum: nigra, nigrum, aut croci æmulum, quam vulgus Dionysiam vocat: helix fructum non gignit, sed albas habet viticulas, & folia parua, angulosa, & concinniora. Hedera omnis acris est, & adstringens: nervos tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in vino bis die potus: ambustis cum cerato tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum succus, cum irino vnguento, melle aut nitro, naribus infunditur, & contra veteres capitis dolores & caput eo cum aceto, & rosa ceo perfundi vtile est: purulentis auribus, aut dolentibus, cum oleo medetur. Nigræ hederæ succus, aut poti corymbi, corpus infirmat, mentemq; turbant

*εὐ θυμῶ-
τερα, non
ἐπιδρά.

*ἀρμόζει
αἶμα.

ant largius sumpti. Acini quinq; triti, calfactiq;
 in pinici mali cortice cū rosaceo, si instillētur à con-
 raria aure, dolorē dentiū mitigant. Denigrat ca-
 illū, illiti corymbi. Folia in vino decocta, illinūtur
 mniū vlcerū generi, etiā si cacoēthe sint: vitia cu-
 is in facie, & ambusta sanāt, vti antea diximus,
 lecocta. Mouēt mēses triti & subditi corymbi: idē
 poti, post purgationes fœminariū, drachmæ pōdere,
 ōcipiendi spem adimūt. Pediculus foliorū melle ir-
 igatus, ac vuluæ inditus, menstrua & partus ex-
 rabit. Instillatus succus putrida tadia nariū, gra-
 eolemiāq; emēclat, & sanitati restituit. Lacry-
 na hederæ psilothrū est: illitu pediculos enecat. Suc-
 us radicū in aceto potus, contra phalāgia prodest.

Chelidonium. CAP. CLXXII.

Chelidonium maius, caule est gracili, cubi-
 tali aut altiore, agnatis foliosis: folijs ranun-
 uli. mollioribus tamen, & colore cæsis: flore vio-
 æ albæ, secundum singula folia prodeunte: in eo
 succus croci, mordax, acris, & aliquantulum sub-
 marus, grauter olens: radix supernè singularis,
 infernè in multa crocea capillamenta fibratur: si-
 qua, cœu corniculati papaueris, tenuis, in metæ
 guram longa: in qua semen papauere manus re-
 luditur. Succus in æreo vase, cum melle prunis
 lecoctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, ra-
 lice, succus exprimitur ineunte æstāte, & siccatus
 in vmbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso

&

& vino albo pota, medetur regio morbo, & vlceribus quæ serpūt: imposita cū vino, aut māducata dentium dolorē sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, quod aduentu hirūdinū exoriatur, & discipulo suo emarcescat. Sunt qui narrant, hirūdines matrem excacatis pullis, admota herba visum restituere.

Chelidonium minus. CAP. CLXXIII

Vulgo **Scrofula-**
ria mi-
nor. **C**helidoniū minus, quod triticū syluestre alii
qui nuncuparūt, herbula pediculis ab radicibus
pēdens, sine caule: folijs hederæ, multo rotundioribus,
et minoribus, teneris, & suppinguibus: radice
habet ex eodē callo cōplures, pusillas, in granorum
tritici modū acervatim cōgestas: quarum tres aut
quatuor in longitudinē exeūt. Iuxta aquas & lacus
nascitur. Vis ei acris, & anemones modo, summam
cutē exulcerat: psoras et scabros vngues eximit.
Succus radicibus expressus ad purgādū caput
naribus infundit. Decoctū eius cū melle gargarizātū,
magnificē id pręstat, et omnia pectoris vitia
extrahit. Othonna. CAP. CLXXIII

Varie de
Othonna
sententie. **O**thonnam aliqui maioris chelidoniæ succum
esse aiunt, quidam glaucij. Alij succum floribus
corniculati papaveris expressum. Alij permistos
cæruleæ anagallidis, hyoscyami, & papaveris
succos, esse contendunt. Alij troglodytica cuiusdam
herbæ succum, quæ othonna vocatur: nasci
q; eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Aegyptum
spectat. Othonna folijs erucæ, perforatis cribrata

mo

LIBER SECVNDVS. 209

modo, & veluti à tinea derosis, squallore obstitis,
 aucis: flore croci, latifolio: quare quidam anemo-
 nes speciem esse putauerunt. Extractus succus ocu-
 lorum medicamentis adijcitur, ubi expurgare est
 pus: mordet enim & absterget omnem caliginē,
 uae oculis offunditur. Tradunt humorem quendā
 ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in
 astillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affir-
 mant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascē-
 m, exigua magnitudine, aereo colore, gustu cum
 ruore quodam & adstrictione mordaci.

Auricula muris. CAP. CLXXV.

MVris auricula, quā myosotida vocāt, herba
 est caulibus pluribus ab vna radice, aliqua
 enus ab imo rubētibus, et cōcauis: folijs angustis,
 blongis, dorso acuto, elato, nigricātibus, per inter-
 alla assidue geminatis, atq; in mucronē desinenti-
 us, et tenuibus, cauliculis ex alarū sinu prodeūti-
 us: flosculo, vt anagallidis, c.eruleo: radix digitali
 rasitudine, multis capillamentis fibrata. Radix il-
 ita egilopia sanat. Sūt qui alsinen, muris auriculā
 vocitāt. Glastum. CAP. CLXXVI.

SAtium glastum, quo infectores lanarū vtun-
 tur, folium habet plantagini simile, verū pin-
 uius nigriusq;: cuius caulis duūm cubitorum al-
 tudinem exedit. Illita folia tumores omneis dis-
 utiunt, cruenta vulnera glutinant, sanguinis pro-
 luuia sistunt, ignem sacrum, phagederas, putre-
 scentis

scientia vlcera, & quæ serpunt, sanant. Sylue-
stre glastum satiuo simile est: folia fert maiora, la-
*λεπτοτέρη Etucaceis proxima: caules *pratenues multifidos,
pss, id est, quadamtenus rubentes: in quorum cacumine folli-
tenuiores. culti multi dependent, quadam linguarum effigiem
referentes, in quibus semen: flore tenui, luteo. Eade
quæ & supra dicta præstat: potu & illitu lieno-
sis auxiliatur.

Telephium. CAP. CLXXVII.

Vulgò **T**elephium herba portulacæ similis est, & can-
Crassula le, & folijs: alas binas in singulis foliorum
maior, & geniculis annectit, ramuli à radice semi septenarij
faba inuer prodeunt, folijs referti cæruleis, crassis, lentis, ac can-
sa. nosis, flore luteo, aut candido. Nasctur inter vites,
& locis cultis vere. Folia senis horis illita
albam vitiliginem sanant: sed post-
ea hordeacea farina illini de-
bet. perunctam ex aceto
etiam in sole vitiligi-
nem tollunt, sed
vbi inaruerunt,
abstergun-
tur.

SECUNDI LIBRI
FINIS.

PEDANII

DIO SCORIDIS

ANAZARBEI, DE

*Medicinali materia,**Liber III.*Ioanne RVELLIO Sueßionensi
interprete.

UPERIORIBVS charissi-
me Aree commētarijs, tradidimus
de aromatibus, vnguentis, oleis, ar-
boribus, earum fructibus & lacry-
mis, item de animalibus, cereali-
bus, oleraceis, & herbis acrimonia præditis. In hoc
autē tertio radices, succos, semina, herbas, & quæ
vernacula & inter se cognata censentur: quæq; plu-
ribus scatent remedijs, prosequemur.

Agaricum.

CAP. I.

Agaricum radix fertur laserpitij similis, sed
facie summa solutior, & rariore fungosoq;
nota cōtextu. Duo eius genera: femina, quæ præfer-
tur rectis intus venarum discursibus constat. mas-
cotūdus est, & vndiq; compactior. Vtriq; gustus
in initio dulcis, mox ex distributione in amaritudi-
nem transit: gignitur in Sarmatiæ regione, quæ
Agaria dicitur. Sunt qui radicem esse plantæ affir-

Q

ment: alij vt fungos nasci in arborum caudicibus
quadam putredine. Gignitur in Galatia, Asia, &
Cilicia, in cedris, sed friabile, & infirmū. Adstrin-
gendi calfaciendiq; naturam habet: efficax est con-
tra tormina, cruditates, & rupta: prodest itiden-
contusis, & ab alto deuolutis. Datur duobus obolis
in vino mulso, febrim non sentientibus: febriculosi
verò, in aqua mulsa. Arquatis quoq; suspiriosis, io-
cineris, renumq; vitio laborantibus, dysentericis
Item si vrina egrè reddatur, si vulua strangulatu-
vrgeat, si pallor membra decoloret, drachma vna
dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien nego-
tium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio stomachi
est, ita vt cibi tenax non sit, manditur, & sine vlla
humoris sorbitione deuoratur. Simili modo acidi-
ructantibus propinatur. Sanguinis reiectiones si
stit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxas
dicum, & articulorum dolores, & comitiales mor-
bos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur
menses ciet: faeminis, quas inflatio vulua vexat, vt
liter equali modo datur. Horrores soluit datū ant
februm accessiones: aluum purgat drachma vna
aut altera, si cum aqua mulsa bibatur: venenorum
antidotum est denarijs instar, cum diluta potion
sumptum: si serpentes iclum vibrarunt, morsumq;
subfixerunt, tribus obolis ex vino potum, mirè aux-
liatur. In summa, internis omnibus vitijs cōuenit
pro viribus, & etate datum, nunc ex aqua, nunc

ex vino: ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

Rhaponticum. CAP. II.

RHa, aliqui rheum, Latini rhaponticum vocant, Ignoratur
provenit in ijs, quæ supra Bosphorum Nec enim
sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, est, quod
centaurio magno similis, sed minor & rufior, sunt Reupontici
rosa, aliquantum lenis, sine odore. Optimum habet nomine ho
tur, quod teredines non sensit, si gustatu cū remissa die indica
adstrictione lentescat, manducatumq; colorem reditur.
dat pallidum, aut ad crocum inclinantem. Id epo
tum facit ad inflationes, stomachi imbecillitatem,
& omne genus dolores, ad convulsa, Lenos, hepa
ticos, tormina, ad renum, vesicæ, & pectoris vitia,
adversus intenta præcordia, & vulvæ mala, coxen
dicum dolores, sanguinis excreationes, suspiria, sin
gultus, dysenterias, & celiacorum affectus, contra
februm circuitus, & venenatorum morsus. Datur
in singulis valetudinibus eodem, quo agaricum pon
dere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant, in
mulso: si aliter, ex aqua mulsa: si tabem experiun
tur, ex passò: si lienis exercet, in aceto mulso. si disso
lutio est stomachi, id est cū cibi tenax non est, man
ditur, & sine sorbitione vlla deuoratur. liuētia li
chenasq; tollit, cum aceto illitum. inflammationes
omneis veteres ex aqua oblitum dissipat. summa
eius vis adstringens, cum aliquanto calore.

Gentiana. CAP. III. *Græcus

Gentianæ inuentio prima assignatur * Gentio Gentid.

Illyriorum regi, à quo cognomētum habuit. Folius partim proximè radicem, iuglandi plantaginiv-
 similibus, subrubris, partim à medio caule, & praesertim iuxta cacumen paulum dissectis: caule cauo,
 & laui, digiti crassitudine, geniculato, & ex interuallis maioribus foliato, binum saepe cubitorum:
 semine in calycibus lato sine pondere, glumoso, satis ad sphondylii semen accedente: radice longæ aristolochiae, crassa, amara. Nasceitur in sublimibus montium iugis, umbrosis locis, aquosisq;. Vis radice excalfactoria, & adstringens: contra morsus serpentium, duabus drachmis, cum pipere, ruta, & vino pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis, & convulsis, prodest: hepaticis & stomachicis, pota cum aqua subuenit Radix collyrii modo subdita, partus eijcit: imposita, ut lycium, vulneraria est, & vice-
 rum cuniculatum depascetium medela. Succus praecipue eodem effectu prodest: oculis inflammatione laborantibus illinitur: pro meconio collyrijs acribus immiscetur. Radix vitiliginem absterget. Succi extrahendi ratio haec est: Contusa radix quinque diebus aqua maceratur: postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: & ubi refriguit aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, fictiliq; reconditur.

Aristolochia. CAP. IIII.
 Aristolochia nomen ex eo sibi adoptauit, quod exist

LIBER TERTIVS.

215

existimetur optimè puerperis opitulari. Tria eius genera traduntur. Rotunda, quæ femina vocatur, folijs hederaceis, præstanti odore cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab vna radice germi- nibus, prælongisq; palmitibus: floribus candidis, pi- lei similitudine, in quibus quod rubrū est, grauter olet. Longa, mascula appellatur: nonnullis dactyli- tis, longiore quàm rotunda folio: tenuibus ramulis, dodrantalibus: flore purpureo, grauter olente, qui marcescens in pyri similitudinem turbinatur. Ra- dix rotunda, in orbem conglobata, rapi modo. Lon- ga verò radix digiti crassitudinem, & dodrantis longitudinem implet, nonnunquam paulò maio- rem. Ambæ colore cæntus buxæ, gustu amaro, & graui. Est etiamnum tertia longa, quæ clematidis vocatur, ramulos habens tenues, refertos folijs sub- rotundis, minori semperuino similibus: flores rutæ: radices longiores, tenues, crasso cortice odoratæque vesitatas. priuatim vnguentorum spissamentis con- uenientes. Rotunda cæteris venenis resistit. Longa verò aduersus angues, & venena, drachmæ pon- dere ex vino bibitur, & illinitur: pota cum pipere, & myrrha, menses, partus, & omnia vuluarum mœra eicit: eadem efficit subdita in pessa. Rotunda id eadem pollet: in super singultibus, suspirijs, hor- roribus, lieni, conuulsis, laterum doloribus, pota cū aqua, singulariter auxiliatur. Aculeos, & spicula extrahit, ossium squamas illitu adimit, vlcera pu-

Q 3

trida exest, & sordida expurgat: caua cum iri, & melle explet, gingiuas, & dentes extergit. Clematidis ad eadem pollere creditur, viribus tamen inferior est.

Dulcis radix.

CAP. V.

Liquiritia
officinis.

Dulcis radix plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto: fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus: folijs lentisci, densis, pinguis, tactuq; gummosis: flore hyacinthi: fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, & maxpès, qui siliquas lētium modo habet, rufas & paruas: id est, longas. radicibus longis, vt gentianæ, coloris buxci, subacerbis & dulcibus: quæ densantur in succum, lycij exēplo. Is in arteria scabritia efficax habetur: verum oportet vt lingua subditus eliquescat, æstuantis stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit: sanat vesicæ scabiem, & renum dolores, cum passo potus: idem eliquatus sitim sedat, vulneribus illitus accommodatur, commanducatus ori prodest: recentis radices decoctum ad eadem cōuenit. Eiusdem farina pterygijs commodissimè inspargitur.

Centaurium magnum.

CAP. VI.

Censetur
Reuponti-
cum offici-
narum.

Centaurium magnum folia habet iuglandis, oblonga, viridi brassicarum colore, serrata in ambitu: caulem, ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papauerum, in rotunditate oblonga: flos cæruleus: semen cnico simile, ceu laneis floccis quibus

busdam innolutum: radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnaus, cum adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusq; locis circa Pholoën, Lyciam & Smyrnam. Radix conuenit ruptis, cōuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, veteri tussi: sanguinem expuētibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua: cæteris, in vino. Item ad tormina, & vuluæ dolores. Ramenta eius in collyrij formam vuluæ subdita, menses atq; partus extrahunt. succus eadem præstat: vulneribus prodest: nam recens tusa, aut arida antè madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio vtuntur.

Centaurium minus. CAP. VII.

Centauriū, limnesion aliqui vocauerunt, quoniā origina amet loca. Herba origani aut hyperici similis, caule anguloso, palmum excedere: flore lychnidis, è puniceo in purpuram vergente: folijs rutæ, prælongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, leui & superuacua, quæ gustanti amaritudinē adfert. Herba recēs tusa, suo illitu vulnera conglutinat, vetera vlcera purgat, & cicatrice obducit: bilē crassosq; humores per aluum exigit, si decocta deuoretur. Ius decocti ischiadicis conuenientissimum.

mē infunditur: trahit enim sanguinem & dolore leuat. Succus oculorum medicamentis perquam vtilis: siquidem cum melle caliginem oculorum expurgat: in vellere appositus, mēses & partus extrahit: epotus peculiariter nervorum vitijs succurrit. Succū extrahendi ratio: Legitur herba semine pręgnans, & diebus quinq; madefacta, decoquitur donec superemineat aquę: mox vbi refrigit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoquitur, vsq; dū mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentē grauidamq; contundunt, atq; succum fictili non picato exprimunt, & in sole, lignea rude assidue mouentes, inspissant. Quod si quid concretum faucibus vasis adhęrescat, deradunt, reliquoq; humori permiscunt. Noctu diligenter operiunt: nanq; ros nocturnus, liquores coalescere nō sinit. Quę autē siccis radicibus aut herbis liquamenta exprimuntur, decoctę (vt in gentiana mentione retulimus,) preparantur: sed quę ex corticibus humidis, aut contusis herbis faciliantur, in sole, vti antē dictum est, coguntur. Sic ē thapsia, sic ē mandragora, reliquisq; similibus succus: sic ex acerbis vuis melligo elicatur. Lycium tamen, & absinthiū, hypocistis & consimilia, decoctę, eo quo diximus modo, coguntur.

Chamæleon albus. CAP. VIII.

Chamæleon albus, iuxta ideo aliquibus vocatur, quod quibusdam in locis viscū circa radicem eius inueniatur, quo pro mastiche vtuntur

mū

mulieres: folia habet silybo aut carduo similia, *a- *Sic Plin.
 speriora, acutiora, nigroq; camæleone validiora: græcus co-
 caulem non promit, verum ex medio spinas, echini dex παχύ
 marini, aut cinara modo, erigit: flores purpureos, τερα, id est
 veluti papporū lanugines emittit: semē cnici simile: crassiora:
 radicē in latis collibus crassam, in mōtosis verò gra ni fortè
 ciliore, in profundo albā: aliquātenus aromaticā, τραχύτε-
 graui odore, dulcē. Quæ pota acetabuli mēsurā, la- ρα legen-
 tas interaneorū tineas pellit. Bibitur autem in vino dum: quod
 austero, cum origani feruefacti succo. Hydropicis ex herbarū
 commodissimè drachma in vino datur, etenim eos collatione,
 extenuat: contra difficultatem vrinæ decoctū pro- si quādo vi-
 pinatur. Hausta in vino, serpentium venenis resi- dere contin-
 stit: occidit canes & sues. mures itē necat, subacta gat, facilè
 cum polenta aut aqua, & oleo madefacta. dyudicaue-
 ris.

Chamæleon niger. CAP. IX. ris.

Chamæleon niger, folijs scolymo similis esset,
 nisi minora, tenuioraq; . ac rubro distincta
 viderentur: caulem emittit dodrantalem, crassi-
 tudine digitali, subrubrum: & in umbella flo-
 res spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, versicolores:
 radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ
 dissecta flavescit, & commāducata mordet. Pro-
 uenit in campestribus, siccis, & cliuosis tracti-
 bus, & maritimis. Radix trita, addito atramenti
 sutorij exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiem
 abigit: eadem, cum sibi sulphur & bitumen asci-
 nit, & cocta in aceto illinitur, impetigines ab-

Nominis
ratio.

sterget. Decoctum collutione dentium dolorem mitigat: cum pari pipere & cera cblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concisa, & in aceto decocta, dentes fouentur: eos quoque frangit, si scriptorio stylo feruens admoueat: vitia cutis in facie, vitilignesque cum sulphure emendat: erodentibus medicamentis admiscetur: phagedenas, tetraque: vlcera illitu sanat. Quare chamaeleo vocetur, à varietate foliorum euenit: mutant enim cum terra colorem: hic viridia, illic albicantia, alicubi coerulea, nonnusquam rubra inueniuntur.

Crocodilium.

CAP. X.

CRocodilion chamaeleontis nigri figuram habet. Nascitur in syluosis, radice longa, leni, aliquantum lata, odore, vt nasturtii, acuto. Feruefacta in aqua & pota radix, sanguinem copiosum per nareis pellit. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex vti scitum, quod suapte vi vrinam ciet.

Dipsacum, siue labrum Veneris.

CAP. XI.

Virga pastoris vulgo.

DIpsacum aculeatarum generis est: caulem habet altum, spinis horridum, folijs lactucae, spinosis, binis genicula singula complectentibus, praelogis, ceu quasdam bullas intus & extra aculeatas, in dorso medio habentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: vnde dipsaci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine caulis, singula surculis capit

capitula insunt, oblonga, echinimata spinis: quæ are facta, candida spectantur, dissecta; medulla tenuis, vermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis, fistulas; si tusa & decocta in vino radix, vsquedum si crassitudo ceræ, immittatur. Medicamentum area pyxide recondendum. Aiunt fornicationibus, verrucis; pēsilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

Spina alba.

CAP. XII.

Spina alba nascitur in montibus & syluosis: folia fert albi chamæleonis, angustiora, candidiora, aliquantū hispida, & aculeata: caulē supra binā cubita altū, pollicari aut ampliore crassitudine albicantem, intus cauum: in cacumine capitulū inest spinosum, echini marini æmulū sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen ceu cucum, sed rotundius. Huius radix pota, celiacis, stomachicis, & qui cruenta extussumt, efficax est: vrinam cit, tumoribus illinitur. Decocto eius dētes indolores collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

Spina Arabica.

CAP. XIII.

Arabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat: ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, ceterasque fluxiones radix etiamnum valet.

Pro

bedeguar

Prouenit in asperis.

Carduus.

CAP. XIII.

Est gallorū
Artichau.

Carduus, Græci scolymon vocant, folia chamaeleonis habet, aut albæ spinæ nigriora, & crassiora: caulem longum ædit, foliosum, capite spinoso: radice nigra & crassa, quæ illita, graueolentiam alarum totiusq; corporis emendat: item si decocta in vino bibatur. Copiosam autem vrinā fetidamq; expellit. Herba cum recens tenerescit, in olera, asparagi modo, transit.

Poterium.

CAP. XV.

Poteriū, Iones neurada vocāt, largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lētis, tenuibus, tragacanthæ proximis folijs paruis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris semine nullius vsus, sed gustu acuto & odorato. Nasctur in aquosis, & collibus. Radices demittit binum ternūve cubitorum, neruosas, & firmas: quæ proximè terram recisæ, dant succum gummi similem. Tussæ, præcis nervis & vulneribus glutinantis illinuntur. Decoctum quoq; eius neruorum affectibus prodest.

Acanthium.

CAP. XVI.

*Additum
ex Plinio.

Acanthium albæ spinæ simile, folijs nucleatis per extremitates, & lanugine araneosa obductis, ex qua collecta & neta, vestes bombycinis similes texunt. Folia vel radices ad remedia opisthoroni bibuntur.

Acan

Acanthus, Romani paderotam vocant, nasci Officinis
tur in hortis, petrosis, & riguis: folia habet Branca vr
multo lactucaceis latiora, & longiora, erucæ diui-
sura, nigricantia, pingua, lævia: caulem binum cu
bitorum, digitali crassitudine, lævem, prope verti-
cem ex interuallis circumdatum foliolis, ceu nuc-
menta quædam oblonga referentibus, spinosis, è
quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum:
caput thyrsi specie. Radicibus nititur longis, muco-
sis, rubris, & glutinosi: quæ vti igni & luxatis
artibus illitæ subueniunt: potæ vrinam ciunt, sed
aluum cohibent. Ruptis, conuulsis, tabem sentienti-
bus, mirè profunt. Nasceitur & syluestris acanthus,
colymo similis, aculeatus, breuior quàm satiuus,
& is qui hortis prouenit: cuius radix ad eadem ad
quæ superior efficax.

Anonis, quam aliqui ononida appellant, ra- Vulgò, Re-
mos habet fruticosos, dodrantes, aut pau- sta bouis.
o maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis ala
rum multis, capitibus rotundis, folijs lenticula, te-
uibus, pusillis, ad rutæ aut prætensis lotifolia ac- * Suspicio
edentibus, subhirsutis, odoratis, nō iniucundè olen- lotum syl-
ibus. Muria conditur, antè quàm spinosa fiat, ciliis uestre in-
ratissima. Rami acutioribus spinis, & veluti spi- telligentibus:
uli firmioribus horrēt: radicem mittit candidam, ac ob id for
ma exalfacit, & extenuat: huius cortex ex vino tè præten-
potus,

sem dici, potus, vrinam ciet: calculos comminuit, margines quod trifo vlcera erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolij pratensis lozem dentium collotione mitigat. Decoctum eius constat fo-
 potu hæmorrhoidas sanare creditur.

lijs: vt volu-
 mine quar-
 to à Diosco-
 ride depin-
 gitur.

Leucacantha.

CAP. XIX.

Leuacantha, prædita est radice cyperi, valida & amara, quæ manducata dolorem dentium sedat: veteri laterum dolori, atq; ischiadici prædest, decocto cyathis tribus ex vino potu. Eadẽ ruptis & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eosdem præbere effectus.

Tragacantha.

CAP. XX.

Tragacantha radix lata & lignosa, summo cespite nititur, vnde surculos humiles, robustos, latissimè fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoruntur, quæ sub se spir-
 Officinis nas albas, rectas & firmas occulunt. Est etiam nu-
 Dragagã- tragacantha, lacryma: quæ, vulnerata radice ma-
 tum. nans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, levis, sincera & subdulcis. Cutis spiracula, vt gummi, obstruit. Huus increbuit vsus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas voces, cæterasq; destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoq; lingue liquecit, & in passo madefacta, drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & vesicæ rofiones, mixto cornu cerui vsto & eloto, aut scissi aluminis momento.

Eryn

LIBER TERTIVS. 225

Eryngium.

CAP. XXI.

Nūc corrig

ERyngium aculeatarum generis est. Cuius fo-
lia in principio, sale condita, in cibos recipiun-
tur. lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, dicitur.

gustū aromatica. Sed ubi adoleuerunt circa com-
blures caulium eminentias in spinas aculeantur. in
quorum summitatibus globosa capitula, durarum
acutissimarumq; spinarum ambitu stellatim cir-
cumuallantur, quorum colos aliās viridis, aliās al-
bus, interdum cæruleus inuenitur. Radix oblonga,
lata, foris nigra, internè candida, pollicis crassitudi-
ne, odorata. Nasctur in asperis & campestribus.

Vim habet calfactoriam: pota mēses & vrinas pel-
lit, tormina inflationesq; discutit: contra iocinerum
vitia, serpentium morsus, & hausta venena, cum
vino prodest. Bibitur aduersus plurima, cum semi-
nis pastinacæ drachma vna: appensa illit aue, tu-
bercula discutere proditur. Pota cum hydromelite
radix, opisthotonicis & comitialibus medetur.

Aloë.

CAP. XXII.

ALoes folium scillæ similitudinem habet,
crassum, pingue, modicè latum, rotundum,
retrorsus pandum: folia vtrinq; ex obliquo lon-
gioribus interuallis striantur, & in spinulas de-
sinunt retusus truncasq;. Caulis emittitur non
dissimilis * antherico: flos albus: fructus hastulæ
regiæ cognatus: graui tota est odore, & gustū
amarissima: radice vna, ceu palo, in terram depa-

da.

* Per an-
thericum
caulē Af-
phodeli,
cui aptis-
simè com-
paratur
Aloë, hic
intelligi-
mus: quā-
uis Dio-
scorides in
Asphode-
li siue Has-
tulæ re-
gice histo-
ria, ei⁹ flo-
rē hoc ap-
pellari no-
mine tra-
dat,

Etia. Plurima prapinguisq; in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nasctur etiã in Asia & Arabia, in locis quibusdã maritimis: & in insulis (vt in Andro) non valde succo extrahẽdo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanẽ quã vtilis, si detrita illinatur. Duo succi genera: quoddam arenosum, quod sedimentum purissimẽ esse videtur. alterum ad iocineris imaginem vergit. Eligi debet,

*Plin. pin *sycera, quã nihil doli sensit, nitida, calculorũ exguis qui nõ pers, rufi coloris, friabilis, ac iocineris modo coacta, καθαρά, facile liquefcens, eximie amaritudinis: improbat ut nostri nigra & fractu contumax. Gummi eam adu-
 codices ha- rant: quod deprehenditur gustu, amaritudine, & bent, sed valido odore: eoq; argumẽto, quod digitis friata nõ
 αἰπὰ ἀπὸ ad minima vsq; frusta resoluitur. Nec desunt qui videtur le- acaciam immisceant. Natura eius est spissare, exic-
 gisse.

care, somnum allicere, & corpora densare, aluum resolvere. Stomachum repurgat binũ cochlearium mensura, in aqua frigida aut egelida pota: sanguinis reiectiones sistit: regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmã pondere in potu: deuorata cum resina, aut cum aqua, vel melle cocto sumpta, aluum soluit: purgationis perfectæ causa, tribus drachmis sumitur: alijs purgatorijs medicaminibus admista, præstat vt minus stomachum infestent: sicca glutinandis vulneribus inspargitur, vlcera ad cicatricem perducit, cohibetq;: eadem peculiariter exulceratis genitalibus medet

medetur, & disrupta puerorum præputia iungit: condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat: hæmorrhoidum abundantiam et sanguinis eruptiones sistit, pterygia ad cicatricem ducit, luores & insignita, ex melle tollit: priuatim scabras lippitudines, pruriginēsq; angulorum, permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo: capillum fluentem continet, cum vino: consillis, gingiuis, & omnibus oris vlceribus, cum melle & vino proficit: oculorū medicamētis torretur, in munda & candenti testā, pennaq; subinde versatur, vt possit equaliter torreri. Lauatur, vt quod sit arenosissimum, tanquam inutile subsidat, & leue ac pinguisimum assumatur.

Absinthium.

CAP. XXIII.

Absinthium, aliqui bathy picron, herba vulgò cognita. Præstātius in Ponto & Cappadocia, in monte Taurus nascitur. Vim habet calfaciendi & adstringendi: bilem expurgat, quæ & stomacho & vètri inhæsit: vrinā cit, & crapulam præsumptū arcet. Ad inflationes ventris, & stomachi dolores prodest, cū seseli & nardo gallico potū: fastidia discutit, et arquatos sanat madefacti dilutū, aut decoctū ius, quotidie tribus cyathis haustū: menses cit potū, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. Aduersatur ixiæ venenis cum vino: item cicuta, & muris aranei morsibus, et draconi marino.

P

Angina eo cū melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad sugillata & oculorū caliginēs ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. Dentium auriumq; dolores decoctum vaporis suffitu compeſcit. Decoctū in paſſo dolentibus oculis oblinitur: item præcordijs & iocineri, tritum cū cera to cyprino: ſtomacho quoq; longa valetudine laboranti, cum roſaceo: cum ſicis autē, aceto & loliacea farina, aquæ inter cutem lienofisq; ſubuenit. Vinū ex eo fit, quod abſinthiten vocant, præſertim in Propontide & Thracia, quo ad antè dicta vtuntur, cū febri carent: alioquin in æſtate propinant. & acceptam huic vino incolumitatem referunt. Inſparſum arſis abſinthium, veſtes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & à corpore arcet: atramentum librarium diluto eius temperatum, literas à murium eroſione tuetur. Exiſtīmatur liquamentum eoſdem præſtare effectus. At tamen potionibus improbatur, quoniam ſtomachū malè habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta amurca, liquamentum adulterant.

Marinum abſinthium. CAP. XXIII.

ABſinthium marinum, quod aliqui ſeriphum vocant, copioſiſſimum in Tauro monte: iuxta Cappadociam & in Taphoriſi Aegypti gignitur: quo Iſiaſi pro oliuæ ramo vtuntur. Herba eſt nū marem tenuis, * abrotoni parui ſimilitudine, referta minutulis ſeminibus, ſubamara ſtomacho inimica,

Et

Ea graviter olet, & cum quadam calfactione adstringit: per se aut cum oryza cocta, interaneorum animalia, teretesq; tineas, adiecto melle, enecat, aluum leuigat cum edulio autem vel lenticula decocta, eadem præstare potest. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absinthio assignatur, quo Gallia alpibus finitima scatet: id patrio nomine Santonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absinthio non dissimile, verum subarnarum est, non adeò semini fecundum. Eadem quæ seriphium potest.

Abrotonum. CAP. XXV.

Abrotonum duorum est generum. Fœmina quædam arboris specie fruticans, candicat, circum ramulos folijs, seriphi modo, minutim incis: floribus referta est: comatibus in summo, fulgore auri, corymbis: quod per æstatem prodit, suauiter olet, cum gravitate quadam & amaro gustu: id genus Siculum esse constat. Alterum mas vocatur, sarmenosum, gracilibus ramulis uti absinthium. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atq; in Syria Hierapoli. Crudum semen, tritum & fervefactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, vrinæ augustis, menses suppressis, aut remorantibus. In vino potum exitialium venenorum antidotum est: horroribus ex oleo illinitur: serpentes et substratu & nidore fugat: contra ictus eorum cum vino potum prodest, pri-

natim efficax contra scorpionum & phalangiorum venena: oculorum inflammationibus commode illinitur, cum cotoneo cocto, aut pane tritum cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit: iri in compositionibus admiscetur.

Hysopum.

CAP. XXVI.

Hysopum, herba nulli non cognita, duum generum est, montanum & hortense. Optimum est Cilicium. Vim habet extenuandi & calfaciendi: decoctum cum ficis, aqua, melle, & ruta, potumq; peripneumoniacis, diuturnae tussi, suspiriosis, destillationibus, & orthopnoicis auxiliatur: tineas enecat. Idem facit, si cum melle delingatur. Crassum humorem per alium extrahit, decoctum ex aceto mulso epotum & ad subducendam aluum cum ficis viridibus detritis manditur, vehementiusq; addita iri, cardamomo, aut irione, deicit: colorem in corpore fouet: lient, & aqua inter cutem, cum fico nitroq; inflammationibus quoq; ex vino illinitur: cum feruente aqua impositum, sugillata discutit: cum decocto ficorum, optime anginis gargariatur. Decoctum cum aceto, dentium dolorem in collutione sedat: inflationes auricularum vaporis suffitu discutit.

Officinis.

Stæchas.

CAP. XXVII.

Stichas Arabica.

Stæchas, iuxta Galliam in insulis eiusdem nominis è regione Massiliae gignitur, unde cognomentum accepit. Herba tenuibus surculis, comarum, longiore folio, subamara gustu, & aliquan-
tum

LIBER TERTIVS.

238

tum acris. Cuius decoctum, hyssopi modo, ad pe-
 ctoris vitia efficax est. Antidotis miscetur. Viscera
 omnia & vniuersum animantis habitum exte-
 nuat, ab obstructionibus & fæctu liberat.

Origanum.

CAP. XXVIII.

Organum Heracleoticum, quod et cunila vo-
 cant, folium habet hyssopo nō dissimile: um-
 bellam autē non in rotæ speciem orbiculatam, sed
 veluti multifidam. semine in summis virgis haud-
 quaquā denso. Excalfacit: vnde decoctum cum vi-
 no potum, demorsis à serpente conuenit. Si cicutam
 aut meconion hauserunt, ex passō: si gypsum aut
 phemerion, ex aceto mulso propinatur. Ruptis, con-
 uulsis, hydropicis, cum fico esui datur. Aridum ace-
 tabuli mensura potiū in aqua mulsa, atros humores
 per aluum extrahit: menses ciet, & tussi cum melle
 inctum medetur: ad pruriginem, psoriasis, regiumq;
 morbum, decocti ius in balneis prodest. Succus viren-
 tis tonsillas, vuam, & oris vlcera sanat, & per na-
 res, ex oleo irino infusum, trahit: aurium dolores
 um lacte mulcet. Cōficitur ex eo, & cepis, et rhois
 rutice quo ad olsonia vtuntur, vomitorium men-
 dicamentis, his omnibus in cupreo vase per dies his
 vices in solatis, dū caniculæ sydus flagrat. Her-
 acule autem substratu serpētes fugantur. Quæ onitis
 appellatur, candidiore est folio, et hyssopo similior.
 Emen veluti coniunctos corymbos habet. Vis ei
 rigani Heraclei, sed multo inefficacior. Syluestre

P 3

origanum, aliqui panaces Heraclion, alij cunilam vocant, ex quibus est Nicander Colophonius. Folijs est origani, ramis tenuibus, dodrantem altis, in quibus umbellæ anethi insunt, flores candidi: radix tenuis, supernuacua. Peculiariter percussis à serpente, folia & flores ex vino poti auxiliantur.

Tragoriganum. CAP. XXIX.

TRagoriganum tenuis frutex est, syluestri serpillio aut origano similis, folio & ramulis. Quilysdam in locis latius virentiusq; inuenitur, & latioribus folijs, satis glutinosum. Alterum exilibus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui prassium vocauerunt. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio Chooq; proueniens. Omnia excalfaciunt, vrinam cient, aluo accommodantur, decocto poto bilem deiciunt, lienosis ex aceto bibere prodest, contra pota ixiæ venena in vino bibuntur, menses trahunt: peripneumonicis iussientibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorum potio est: quare cibum fastidientibus & stomacho acida ructanti, imbecilloq; traditur. Item si à maritima iactatione nausea, & æstus præcordiorum excitetur: tumores verò cum polenta illita discutiunt.

Pulegium. CAP. XXX.

Pulegium herba vulgaris notitiæ. Extenuat, calfacit, decoquit: menstrua, secundas ac partus eicit: pulmonis vitia ex melle & aloë potantur.

tum extrahit, & cōuulsis auxiliatur: nauſeas ſto-
machiq; interciſiones, ex poſca permulcet: atran-
bilem per alium exigit. Bibitur in vino vtiliſſimē
contra ſerpentiū morſus. Defectos animo recreat,
cum aceto naribus obiectum: gingiuas arefacti ci-
nere corroborat, illitū cum polenta inflammatio-
nes omneis ſedat, podagris per ſe ſubuenit, impoſitiū
uſque dum rubefcat locus: cum carato varos ex-
tinguit, lienofiſ cum ſale vtiliter illinitur: decoctū
eius ablutas pruriginē mitigat, conuerſas vuluſas
corrigit, contra inflationes duriciāq; vuluæ, in de-
ſeſſiones conuenienter adiicitur. Vocant aliqui ble-
chona, quoniam dum floret, guſtatum à pecoribus,
balatum concitat.

Dictamnū. CAP. XXXI.

Dictamnū, aliquibus ſylueſtre pulegiū vo- Græcus,
catur. Cretenſis herba eſt, acris, lauiſ, pulegio Dictamnū:
ſimiliſ, ſed maioribus folijs, quæ tomēto quodā ſpiſ- ac ſi euana
ſaq; lanugine pubeſcunt. Florem nullū aut ſemē pro Plinius.
fert. Præſtat omnia quæ ſatiuum pulegiū, ſed effi-
caciūſ multo: nam nō potum modò, ſed appoſitum
quoq; aut ſuffitum, d. functos partus eicit. Prodiū
in creta capraſ ſagutiſ percuffaſ, huius herbae pa-
ſtu, eaſ excutere. Purgandi vim habet ſuccuſ illi-
tuſ, aut cum polenta trituſ. Herba in paſtoſ pe-
dib; reliquōve corpori aculeoſ, illituſ reſigit. Ad lie-
niſ doloreſ efficax habet: ſiquidē ipſum immittit.
Metūt æſtate & autumnō. Radix eiꝯ guſtu cal-

facit, partus accelerat. Succus cum vino potus, contra serpentium morsus praesidio est. Tanta herbae facultas est, ut olfacta abigat bestias, quae venenato ictu saeviant, appensaque contactu exanimet. Vulneribus ferro illatis, & venenatis morsibus, infusus succus praesentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potum assumatur. Quod pseudodictamnium vocant, multis in terris nascitur, ante dicto simile, sed minus quam illud acre. Eosdem effectus praebet, sed inefficacius multo. Defertur à Creta alterum dictamni genus, folijs sisymbrium, ramis maioribus: in quibus flores sylvestris origani, nigri, molles: odor foliorum inter sisymbrium & salvia incundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. Miscetur emplastris & medicaminibus quae adversus serpentium iniurias consinguntur, theriaca vocant.

Salvia.

CAP. XXXII.

Salvia siue eleliphacon, frutex est ramosus, longus, virgas habes quadrangulas, et canas: folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quae sensim attritarum quasi vestium scabritie referant, hirsuta, subalhida, perquam incundo odore, sed gravi: semine summis in caulibus sylvestri homino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit et urinas, decoctum foliorum ramorumque potus, & partus extrahit, et pestinace marinae ictibus auxiliatur. Capillos demigrat, vulnerum sanguinem cohibet, tetra
vks

ulcera purgat: testium pruritus sedant rami fo-
liaq; si * decocto eorum foveantur.

Mentha.

CAP. XXXIII.

Mentha, cognita herba est. Calfaciendi, ad- * οὐρ οὐρ
stringendi, atq; exiccandi vim habet. Sistit
anguinem, poto ex aceto succo: tineas in ventre tere
es enecat, venerem stimulat, singultus, vomitiones,
cholerasq; sedant terni ramuli cū acidi granati suc-
co poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illina-
tur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet. mam-
mas, si tendantur, aut lacte turgeant, cōpescit: cum
sale canum morsibus illinitur: aurium doloribus cū
aqua mulsa subuenit: vuluæ ante coitum admota,
conceptioni resistit: lingua scabritiem conficta læ-
uigat: coire lac, densariq; in caseum non patitur, si
folia potionibus lactis immergantur. In summa,
tomacho utilis est, & in condimentis peculiarem
gratiam habet. Siluest'ris mentha, Latini mentha Mentha-
trum vocant, lursutior est folio, & prorsus ma-
iorem, quàm sisymbri, odore magis viroso: quare mi-
nus ad sanorum vsus expetitur.

Calamintha.

CAP. XXXIIII.

Ex calaminthe generibus quedam montibus Calamen-
familiaris, folia ocimi habens, incana, sur- tum officii
culos, & caules angulosos, purpureum florem. narum.
Altera pulegio similis est, sed maior: quam syl-
uestre pulegiū ideo appellantur, quod odore ipsum
emuletur: ne petam Latini vocitant. Tertia men- Nepeta.

P 5

thastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus, quàm superiora, sed viribus inefficacior. Omnium folia gustu impensè feruētia, et acria: radix superuacua. Nascitur in cāpestribus, asperis, & aquosis. Potu aut illitu demorsis à serpēte opitulatur. Decoctum potu menses, & vrinas expellit: ruptis, conuulsis: orthopnoeae, torminibus, choleris, horroribusq; auxiliatur: regium morbum expurgat: praesumpta in vino venenis resistit: tineas ceteraq; interaneorum animalia, cum sale et melle pota, enecat: nec secus cocta crudave, si teratur. Elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in vellere subiiciantur, menses extrahunt, & partus enecant. Accensa aut substrata, serpentes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta, & illita, & sugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, vt ex alto humores euocet, summā cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

Thymum.

CAP. XXXV.

Thymum ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex, exilibus folijs multis & angustis circumdatus: capitulis in cacumine, flore purpureascente refertis. Gracili solo, & petroso provenit. Vim habent hanc, vt cum sale, & aceto potum, pituitam per aluum detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus: tineas ventris exigit: menses, partus, & secundas pellit:

vriq

inas ciet: cū melle in eclegmate, faciles facit ex-
 eationes: recentes tumores discutit, cū aceto illitū:
 cretū sanguinem dissoluit: verrucas thymi colorē
 addentes, pensilesq; tollit: ischiadicis cum vino, &
 olenta impositum subuenit: hebetibus oculis in ci-
 prodest. Perquā vtile pro condimento, dunta-
 at ad vsus eorum, qui rectē valent.

A N N O T A T I O.

Herba, quā Medici pro Satureia hodie
 surpāt, byssopi folio, thymū magnitu-
 dine lōgē exuperat, vt nō esse genuinā,
 hic descriptā, satis eius historia cōuin-
 at. Satureia. CAP. XXXVI.

Satureia trivialis notitia est: gignitur in aspe-
 ris locis, & tenui solo, thymo similis, minor ta-
 ne, et tenerior: defert spicā florū plenā, coloris her-
 acei. Eadē potest quā thymū, si modo cōsimili sum-
 titetur. Aptus sanis vsus. Est etiamnum quaedam
 atina, sylvestri prorsus minor, quā propter mitio-
 rem acrimoniam, commodius in cibos recepta est.

Serpillum. CAP. XXXVII.

Serpillum duorum generum est: Hortense odo-
 re sampsuchum imitatur, atque in coronas ad-
 li solet, cui à serpendo nomen inditum est: quo-
 niam si quā eius particula terram attingat, inibi
 radices demittet. Folia & ramulos origani habet,
 sed candidiores: in maceris multo procerius as-
 urgit. Sylvestre, xygis appellatum, non serpit,
 sed

sen Thymbrū

sed in altitudinem increfcit, ramulos ædens tenues, furculosos, folijs refertos longioribus quàm ruta, & durioribus, angustis: flores incundè olent, gustanti acres: radicis nullus vsus. Nascitur in petris, satiuo efficacius, atque magis excalfaciens, & ad medendi vsu aptius. Menses trahit, vrinam potu ciet: torminibus, ruptis, vulsis, & iocineris inflammationibus, auxiliatur: & aduersus serpenses potu illituve: capitis dolores mulcet coctum, adiecto rosaceo, & madefactū in aceto: maximè verò phreniticis, & lethargicis conuenit. Cruentos vomitus sedat succus, drachmis quatuor ex aceto potus.

Sampsuchum. C. A. P. XXXVIII.

Sampsuchum in Cypro, & Cyziceno laudatissimum: secundū sibi locū vëdicauit Aegyptium. Amaracū gens Sicula, & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terrā repens, folijs eius calaminthæ, quæ tenui folio constat, hirsutis, & rotundis: suauissimum odorem spirat, ideo coronis inseritur. Vis eius excalfaciens. Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos vrinæ difficultas, aut tormina excruciant Illita ex melle arida folia, sugillata tollunt: menses subditi in pessa trahunt: contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinuntur: luxatis tumoribusq; cerato excepta imponuntur: aduersus oculorum inflammationes, tumoresq; cum polline polentæ illini prodest. Acopis malagmatisq; calfaciendi gratia commiscetur.

Mel

Melilotos, siue fertula Campana.

CAP. XXXIX.

Fertula Campana laudatissima in Attica, & Cyzico, et Chalcedone nata: cuius color vicinus croco, boni odoris. Nasctur & in Capania circa Nola, colore in luteū languescente, odore infirmo. Vim habet adstrictoria: inflammationē omnē tollit, praesertim, quae in oculis, vulua, sede aut testibus erumpat, si ex passō cocta illinatur: interdū etiam addito oui luteo assato, aut fixigræci farinæ, lini semine, aut polline, aut capitulis papaveris, tybōve. Recentes meliceridas per se cum aqua, et ulcera manantia in capite, illita cum creta Chia, vino aut galla sanat. Stomachi dolores, & cruda, cocta cum aliquo ex antè dictis leuat, doloribus viriū mitigandis cruda ex passō instillatur: in auro aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

Marum.

CAP. XL.

Marum herba cognita vulgò, surculosa, flore origani, folijs multo candidioribus, floribus odoraticis. Vim habet sisymbrio consimilem. Constringit enim, & modicè calfacit: quae de cantharidis serpentia ulcera sistit, & in calidas illi- mentes additur. Iuxta Magnesium, & Tralleis consimilissima gignitur.

Acinos.

CAP. XLI.

Acinus, aut aconos à Græcis dicitur, tenui- siccoq; ramulo herba, ocimo similis, odorata,

rata, sed hirsutior: qua coronæ factitantur à nullo
nullis olitoribus colitur. Menses et aluum pota
stilit. Illita panos ignemq; sacrum sanat.

Baccharis.

CAP. XLII.

*Βακχαρις,
i. odorata.*

Baccharis herba* fruticosa, quæ in coronas ad
ditur: cuius folia aspera sunt, media violæ &
verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti al
titudinem petens, aliquantulum asper, non sine appen
dicibus adnatis: flore purpureo, suballicante, odor
to: radicibus veratro nigro similibus, quibus odo
r inest cinnamomo proximus. Asperum squalidum
solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, vulsi
ex alto precipitatis, spirandi difficultati, salutari.
Item diurnæ tussi, & urinae difficili: menses pe
llit: contra serpentium morsus utilissimè datur i
vino. Recens radix apposita, partem extrahit: puer
peris eius decoctum in desensionibus prodest: in dia
pasmata utiliter inseritur, iucundi odoris gratia.
Folia, utpote quæ adstringant, capitis doloribus i
litu prosunt: oculorum inflammationibus, mam
tumentibus à partu, egilopis incipientibus, igni
busq; sacris auxiliantur. Odor somnum gignit.

Ruta.

CAP. XLIII.

Ruta montana sylvestrisq; sativa, & hortu
si acrior est, & in cibis damnata: sativa
rò quæ sub ficu arbore enascitur, magis in cibo
admittitur. Vtraque vrit, calfacit, exulcerat: ur
nam ciet, menstrua pellit, aluum sistit potu cibor

LIBER TERTIVS. 248

talium medicamentorum antidotum est, si semen
 x vino, acetabuli mensura, ebihatur. Folia per se
 rasumpta, aut cum nuce iuglāde, aridisq; ficis, in-
 ficaces venenorum vires reddunt: contra serpentes
 mili modo sumere conuenit: geniturā cibo potūve
 etinguit: cum anetho sicco decocta, tormina sedat.
 acit ad pectoris laterumq; dolores, difficultatem
 irandi, tusses, pulmonis inflammationem, coxendi-
 um articulorumq; cruciatus, & horrores febriū
 rcuitu repetentes, pota vt antè dictum est. Item
 d inflationes coli, vuluæ, rectiq; intestini, cū oleo
 decocta, & infusa. Fœminas vuluæ strangulatu li-
 erat, si à genitali, sedetenus cum melle subiiciatur.
 eruefacta ex oleo, & pota, ventris tineas excutit:
 rticularijs doloribus ex melle, aquæ inter cutem
 m fici illinitur. Eisdem in potu auxiliatur, de-
 cta in vino ad dimidias parteis, & oblita. Cru-
 i conditaq; cibo, visus aciem excitat: dolores ocu-
 rum illita cum polenta lenit, doloribus capitis cū
 saceo, & aceto illita auxiliatur, profluentem na-
 bus sanguinem sistit trita & indita, testium in-
 mmationibus cum laureis folijs imposita, & eru-
 ionibus papularum cum myrto, & cerato pro-
 st. Cum pipere autem vino, & nitro affricta, al-
 e vitiligini medetur. Cum eisdem illita formica-
 nes tollit, & verrucas quæ thymi florem repræ-
 ntant: contra impetigines cum alumine, & melle
 ilissimè imponitur. Succus in mali punici caly-
 ce

ce calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur: hebetudinē oculi qui sensere, ruta cū fœniculi succo ac melle peruncti iuuantur: ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, aut in capite manāt, cum aceto, rosa-
teo, & cerusa persanat: mansa, alliorū ceparumq; acrimoniam domat. Montana si copiosius estur, inter-
terficit. Dura florem promit, & ad murias colligi-
tur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum
pruritu ac vehementi inflāmatione. Oportet itaq;
eam vnctis antea manibus, & facie colligere. Tra-
dunt succum gallinaceis pullis insparsum feles ar-
cere. Adiciūt eam quæ in Macedonia circa Haliac-
mon amnem prodeat, comedentes interimere. Mon-
tosus autem is locus, viperis scatet. Semen eius po-
tum contra intestina vitia efficax est: in antidota
commodē additur: contra incontinentiam vrina-
torum, semen septenis diebus potui datur. Radix
huius montanum moly vocatur. Syluestris ruta sa-
tiua similis est. Prodest comitialibus, & coxendici
doloribus: menstrua mouet, partus enecat. Acrior
est viribus, quā hortēsis, & validior. Syluestris,
vt pote noxia, cibis abdicatur.

Syluestris ruta. CAP. XLIIII.

Vocant etiamnum syluestrem rutam, quæ
in Cappadocia, & Galatia Asia finitima
moly dicitur. Frutex est, qui ab vna radice mul-
tos emittit cauliculos: folijs multò, quā alterius
ruta longioribus, tenerioribusq; odore graui: flo-

LIBER TERTIVS. 243

e candido: capitulis in cacumine paulo maioribus
uam sativæ rutæ, quæ tribus maximè partibus
stat: in quibus triangulū semen, subrufum, gustu
marū recluditur, cuius est vsus. Semen autumnō
naturefcit: quod cū melle, vino, croco, & fœniculi
succo, ac gallinaceo felle, teritur cōtra retusam oculi
rum acie. Sunt qui eam harmalā vocent, Syri be
san. Qui Cappadociam incolunt, moly, quoniam
uandā cum moly seruet similitudinem: radice ni
ra, flore cādido. In collibus, & lato solo provenit.

Moly.

CAP. XLV.

Moly folia habet graminis latiora, lumi
sparsa: florem albæ violæ similem, sed mi
orem, ac magnitudine violæ purpureæ responder
m, lactei coloris: caulem candidum, quaternū
hitorum, in cuius cacumine inest aliquid quod
ly speciem referat. Radix parua, bulbosa, quæ
irum in modū valet ad aperiendas vulvas si tri
cum irino vnguento, in pessa subiiciatur.

Panaces.

CAP. XLVI.

Panaces nonnullis heracleum dicitur: ex quo
opopanax colligi solet. Plurimum in Bœotia,
in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq; compen
& quæstus, qui ex eo liquore factitatur, gra
studiose colitur. Folijs est asperis, in terra ia
ntibus, herbaceis coloris, multum ad ficulnea ac
dentibus, in ambitu quinq; partitō diuisis: cau
ut ferulæ, altissimo, qui lanugine quadam in

Q

canescit, folijs etiam minutioribus obsitus, mussa-
rijs, cen anethi, in cacumine: flore luteo, & semine
odorato: feruēteq;: radices habet multas ab origine
vna, candidas, graueolentes, crassi corticis, & sub-
amari gustus. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Ma-
cedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti cau-
lium pullulatu. Ea candidum succum emittit, quā
siccatus, in summa cute croceum colorem cōtrahit.
Effluentem autem succum excipiunt, folijs excava-
to solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo
caule messibus inciso, profluentem succum exi-
munt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, disten-
tæq;: siccæ, quæ cariem non sentiant, aromatica,
feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo ido-
neus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario
abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur,
quā amarissimus, internè albus, aut subfuluus,
foris ad croci colorem inclinans, levis, pinguis,
friabilis, tener, statim in aqua eliquesceus, graui
odore. Niger improbatur, ac mollis. Adulteratur
ammoniaco aut cera: sed sinceri experimentum
est, si digitis in aqua friatus resoluitur, & lacte-
scat. Excalfacit, mollit, extenuat: horroribus fe-
brium circuitibusq;: vulsis, ruptis, laterum dolori,
torminibus, stillicidio vrinae conuenit. Contra ve-
sicæ scabiem ex aqua mulsa aut vino bibitur: men-
ses trahit, fetum enecat, inflationes quæ vuluam
malè habent, duritiasq;: ex melle dilutus, disci-
tit.

it: ischiadicis illinitur, acopis & capitis medicami-
 bus admiscetur, carbunculos rumpit, podagricis
 um vna passa illitus subuenit: dolore dentium li-
 erat, canis inditus: oculorum aciem illitu excitat.
 ix eo & pice optimum si emplastrum contra be-
 liarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Radix
 ramenta conscissa, vuluæ admota, partus extra-
 it: ad vetera vlcera efficax est, nudata ossa corpo-
 e operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum
 bsinthio sumptum, menses pellit: cum aristolochia,
 rodest aduersus animalia quæ venenum eiacular-
 ur, & cōtra vuluæ strangulatus in vino bibitur.

Panaces Asclepij. CAP. XLVII.

Panaces Asclepij caulem à solo emittit tenuem,
 cubitalem, geniculatum, circa quem folia fœni-
 uli funduntur, sed maiora tamen hirsutioraq; o-
 rata: in cacumine umbella, vbi flores emicant
 urei, odorati & acris gustus: radix parua est &
 nuvis. Auxiliarem vim habent flores & semina,
 ntra vlcera, phagedænis, & tubercula, si trita
 m melle imponantur: aduersus serpentes ex vino
 buntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces
 luestre origanum vocant, alij cumilam, de qua in
 rigani mentione diximus.

Panaces chironium. CAP. XLVIII.

Panaces Chironium in Pelio monte maxi-
 mē prouenit: folium eius amaraco simile:
 os aureus: radix parua, quæ non aliè demitti-

tur, gustu acris. Pota radix serpentium veneno resistit. Illita coma, eadem præstat.

Ligusticum. CAP. XLIX.

Galeno Lib.
bysticum.

*παράτο-
ς δ'ωρ-
31,
ad est, in-
xta fossas.

Ligusticum, quod alij panaceam, alij panaces vocant, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino, Alpibus contermino: unde nomen traxit. Panaces incolæ non ab re appellant: quoniam & radice & caule, heracleotico panaci simile sit, & viribus eisdem præditum. Gignitur in altissimis asperisq; montibus, ac umbrosis, maximè verò iuxta fluentia. Cauliculum fert anethi, geniculatum, tenue, & in circuitu folia sertulæ campanæ, molliora, odorata, prope verticem graciliora, & longè magis diuisa: in cacumine muscarium, in quo semē dependet nigrum, solidum & oblongum, fœniculo proximum, gustanti acre, & aroma olens: radix candida, heracleotici panacis similis, odorata. Radicis seminisq; vis excalesfactoria, concoquens: prodest ad intestinos dolores, tumores, cœcoctiones. Item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgeat: & contra serpentium ictus: urinas & menses potu trahit. Eosdem præstat effectus apposita radix. Semen cum radice oxyporis & medicamentis decoquentibus admiscetur: ori perquam utile: quare pro pipere vtuntur eo indigenæ, ad obsonia. Adulteratur semine quodam simili, quod facile gustu discernitur: amarum enim est. Alij semē fœniculi aut seselis admiscentes, ligusticum dolo vitiant.

Pastin

Pastinaca.

CAP. L.

Pastinaca sylvestris folia gingidij habet, latiora, subamara: caulem rectū, scabrum: umbellā similem anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio exiguum quiddam cernitur colore purpureo, ferè ad croceum accedente: radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum vel impositum, menstrua mouet. Ijs conuenit in potione, quos vrinae difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cum semine subit: serpentium morsibus ictibusq; prodest: praesumentes id nulla affici iniuria à serpentibus raduntur: conceptus adiuuat. Radix vrinam pelit, venerem stimulat, partus apposita eiicit. Folia trita, & cum melle imposita: phagedenas vlcera purgant. Satina ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior.

Sefeli.

CAP. LI.

Sefeli Massiliense folia faxniculi habet, crassiora: caulem vegetiorem: umbellam anethi, in qua semen oblongum, angulosum: degustanti statim acre: radix longa est, iucundi odoris. Semen & radix excoalsfaciendi vim habent: potu stranguriae & orphopnae medentur, suffocationibus mulierum comitialibusq; prosunt, menses & partus trahunt: ad omnia interna mala pollet, tuſsim veterem sanant. Semen cum vino potum, concoquit, & tormina discutit: epialis febribus vtile, & contra perfrictiones

Recentioribus Siler montanū.

in itineribus, cum pipere & vino bibitur: capris, ceterisq; pecudibus, datur in potu, quò facilius suos fortis enitantur. Aethiopicum seseli, folia habet hederæ, minora, & ad periclymeni modum oblonga: frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus, capitulo anethi: semine in tritici morem denso, nigro, amaro, Massiliensi odoratiore, & acriore, multum suauis. Peloponnesense folia habet cicutæ, latiora, & crassiora: caulem supra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum, & carnosius pendet. Eisdem viribus præditum est: nascitur in asperis, riguis & collibus, inuenitur & in in sulis.

* ἐν Ἰδῆ, id est, in Ida mōte.

Creticum Seseli.

CAP. LII.

Tordylium, quod aliqui Creticum seseli vocant, iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur, herbula surculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra vrinæ difficultatem bibitur, potu cit menses. Succo seminis caulisq; virentis, ternis obolis ex passò decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciēdas pectoris excreationes, in delinctu cum melle.

Sison.

CAP. LIII.

Hic omis-
sa est ab in-
terp̄te de-
scriptio.

Sison exiguum semen est, in Syria natum, apio simile, nigrum, feruens, oblongum. Cōtra lienis vitia bibitur, vrinæ difficultatem potu emendat, remoratos menses citat. Quo in condimentis, cum

CUCUR

incurbita, & aceto, indigena vtuntur. In cacumine granula multa gerit.

Anisum. CAP. LIIII.

ANisum in summa excofacit, exiccat: oris halitum iucundiores facit, doloris leuamentum præstat, urinam ciet, aquam quæ subijt cutem dissipat, potum sitim cohibet, animalium venenis aduersatur: valet ad inflationes, aluum & alba femininarum profluvia sistit, lac ad mammas elicit, venerem stimulat: dolores capitis leuat, suffitum naribus: cum rosaceo tritum, instillatumq; fractis auribus medetur. Melius semper recens, plenum, non fursurosum, odore præstans. Inter prima laudatū est Creticum, proximo loco Aegyptium.

Carum. CAP. LV.

Carum, semen est vulgaris notitia. Excofacit, urinam concitat, stomacho vtile, os commendat, concoctionem adiuuat, vtiliter miscetur antidotis & oxyporis: anisi vicem præbet. Radix cocta, pastinacæ modo manditur.

Anethum. CAP. LVI.

ARidi anethi comæ seminisq; decoctum, potum lac euocat, inflationes & tormina sedat, aluum vomitionesq; sistit, urinas ciet, singultus lenit, oculorum aciem hebetat & genituram restringit. σπέρμα τῷ ὕδατι σιδήρεο. Fœminis vuluæ malo opportunis, καὶ ἐν κατὰ πλάγας κατὰ πλάγας ad defensiones vtile. * condylomata illitus eius citius tollit. σπέρμα.

Cuminum satium. CAP. LVII.

Cuminum satium ori gratum est: sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates regiū appellauit. Secundum locum tenet Aegyptium: reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisq; alijs tractibus. Excal facit, adstringit, exiccat: ad tormina inflationesq; conuenit, coctum & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in vino. Testium collectionibus auxiliatur, impositum cum vna passa, aut lolij farina ceratove. Mensium abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis profuua sistit. Colorem bibentium aut perunctorum mutat in pallorem.

Sylvestre cuminum. CAP. LVIII.

Sylvestre cuminū, plurimum effuaciusq; in Ly-
 * Sic qui- Scia & Galatie Asia, atq; Carthagine Hispa-
 dem Grae- nie gignitur: frutice paruo: dodrantali caule, ac te-
 cus, sed re- nui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, veluti ser-
 etius Mar- ratis, & gingulij diuisura. In cacumine capitula
 cellus, Ga- quina, aut sena habet, mollia, rotunda: in quibus
 latia Asia. est semen acerosum, gustu satiuo acriore. nascitur
 in collibus. Bibitur semen ex aqua, aduersus tormi-
 na inflationesq;: item contra venenatas bestias, ex
 vino: singultus ex aceto sedat: stomacho vtile, quem
 humor vexat, sugillata tollit, si manducatum cum
 melle & vna passa illinatur: testiu inflammationibus.

LIBER TERTIVS.

255

nibus, adiectis eiſdem illitū medetur. Eſt & aliud ſylueſtris cumini genus, ſatiuo non diſſimile, quod à ſingulis floribus promit cornicula in ſublime exerta, in quibus ſemen eſt melanthio ſimile: quod potum omnium ſerpentiū morſibus præſidio eſt. Calculoſis & ijs qui vrinae ſtillicidio vexantur, aut concretum ſanguinem cum lotio reddunt, auxiliaur: ſed apud ſemen feruefactū poſtea bibendum eſt.

Ammi.

CAP. LIX.

Ammi & Aethiopicum cuminiū appellant. & plerique hoc natura diuerſum eſſe ab illo exiſtimant. Vulgò notum eſt: ſemen exile, multò minus cumino, origanum & reſiciens. Eligendum eſt purum, minimè ſurfuſum. Viſ ei excaſſatoria, feruens, & exiccans: facit ad tormina, vrinae difficultatem, ſerpentium iſtus, cum vino potū: menſtrua uiet. Miſcetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ ecdoria vocant: vt inde exortis vrinae difficultatibus reſiſtat. Sugillata cum melle tollit, colorem potu aut illitu mutat in pallorem. Suffitio cum vna paſſa aut reſina, vuluas purgat.

Coriandrum

CAP. LX

Coriandrum aut corianum vulgaris eſt notitia, vim refrigeratoriam habens. Quare illitum cum pane aut polenta, ignibus ſacris, & vlceribus quæ ſerpunt, medetur: epinyctidas cum melle vel vna paſſa, teſtium inflammationes, carbunculosq; ſanat: cum ſaba freſa, ſtrumas & tubercula

Q 5

ὀλίγοι. discutit: tineas interaneorum expellit * semen cum passo potum, & geniturā adauget. largius autem sumptū, mentem nō sine periculo mouet: quare continuo, & copiosiore vsu abstinēdū. Succus cū cerussa, spumave argenti, necnon aceto & rosaceo illitus, ardētes summæ cutis inflammationes emēdat.

Hieracium.

CAP. LXI.

Hieracium magnum, caulem emittit asperū, subrubrū, spinosum, cauum: folia ex interual-
lis rariuscule diuisa, similia soncho per ambitū: lu-
teos flores in oblongis capitulis. Vim refrigeradi ha-
bet, & modicē substringendi: vnde illitū, stomacho
æstuanti, inflammationibusq; prodest. Succus erosio-
nem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radi-
ce illita, vibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Hie-
racium paruum, folia eodem modo obtinet ex inter-
uallis diuisa per ambitum: cauliculos teneros, viren-
tes, in quibus lutei flores, orbem circinantes, emicāt.
Vim suam ad eadem ad quæ superior impendit.

ANNOTATIO.

Capitula cicutæ.] Legitur in Græcis,
corruptè ac nullo planè, si quid est in me-
iudicij, sensu, κεφάλια μικρών παρεμφερῶν
id est, capitula succo papaueris similia.
Videtur autem locus ex Theophrasto ac
Plinio, qui Oreoselinon cicutæ folio de-
scribunt, hoc modo posse restitui: φύλλα
καυείω παρεμφερῶν, id est, folia cicutæ non
absi

abſimilia : quod cum alijs ſatis aptè co-
hæret. Velim tamen in hac, re vt & alijs
omnibus, ſuo quenque vti iudicio.

Apium.

CAP. LXII.

Hortenſis apis herba ad eadem ad quæ coria Noſtrū Pe-
num conuenit inflammationibus oculorum, troſelinū,
cum pane aut polenta illinitur: æſtuantem ſtoma- vt colligi-
chum mulcet: mammarum duritiā ex lacte con- tur ex no-
creto contractam reprimat: vrinā ciet, ſiue crudū, tis Plinij.
ſiue coctum edatur. Decoctum eius radicisq; potū,
venenorum noxa reſiſtit, quum vomitiones exci-
tet: aluum cohibet. Semen vehementius vrinam pel-
lit: contra ſerpentium venena, aut epotim argenti
ſpumam auxiliatur: inflationes diſcutit. Admiſce-
tur medicamentis quæ dolorum leuamenta præ-
ſtant: theriacis quoque, ac tuſſis remedijs. * Eleoſe- * Apiū offe-
linum in humidis naſcitur, ſatino grandius, & ad cinarum.
eadem efficax. Oreofelinum, caule eſt dodrantem
alto, ab radice tenui exeunte: per cuius ambitum
ramuli, * & capitula cicutæ, multo tamen tenuio-
ra: ſemine cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui:
naſcitur in petroſis & montibus. Vrinam ciet, ſe-
mine ac radice in vino potis: menſes trahit. Anti-
dotis, necnon medicamentis vrinam cientibus, &
excalfactorijs, inferitur. Nec hallucinari nos opor-
tet, exiſtimantes oreofelinum eſſe, quod in ſaxis
prouenit: aliud enim eſt petroſelinum. Petroſeli-
um

num in Macedonia provenit, in præruptis locis, semine ammū, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam cit ac menstrua: contra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest: laterum, renū, & vesicæ doloribus in potu subuenit. Admiscetur an-

*Galenus tidotis vrinam cientibus. Hipposelinum, *Latini Smyrneū. olusatrum appellant, aliqui smyrnion, quamvis a de quo se- liud sit, quod propriè smyrnion dicitur, vt paulò quēti cap. post referemus. Est autē maius & satiuo apio can Romanis didius: caule alto, cauo, molli, habente veluti lineas: sic dictum folijs latioribus, in puniceum vergentibus: coma ro fuisse, li. 2. rismarini, florum plena, dependentibus in cacumi- de Alim. fa ne corymbis, antè quàm deflorescat: ea semine tur- cul. tradit. get nigro, oblongo, acri, solido, aromatico, radix di- mittitur odorata, candida nec crassa, quæ os com- mendat. In vmbrosis & palustribus enascitur. ole- rum generis, vt apium. Radix cruda coctave estur. Folia cū caulibus decocta mandūtur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudaq; muria condiun- tur. Vim hanc habet, vt potu semine ex mulso vino mēses creat: algentes calfacit potu aut illitu: vrinæ stillicidio auxiliatur. Radix eosdē præstat effectus.

Smyrnium. CAP. LXIII.

Smyrnion, quod in Cilicia petroselinum vo- cant, plurimum in Amano monte gignitur. Caulem habet apij, & stolones multos: folia la- tiora, subpinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia, iucunda, color

colore in luteum languescente: capitibus caulium
orbiculatis, ut anethi: semine brassica, rotundo, ni-
gro, sapore aspero, sicut myrrha, ita ut alterum
ulterius loco cadat: radix quoque odorata, gustu
acri, fauces mordet, succosa, mollis: cortex eius foris
ruber, intus viridis, aut subalbidus. Nasctur in sa-
cosis, & collibus, atq; squalidis, & limitibus terre
nis. Vis radices, herbae, & seminis excalfacere. Fo-
lyis muria maceratis ad obsonia vtuntur, aluum
leniunt, radicem contra serpentium ictus habere con-
uenit, tusses & orthopnoeas mitigat, urinae difficul-
tati medetur: recentes tumores, collectiones, duri-
asq; discutit, illita, & vulnera ad cicatricem per-
ducit: partus abortu vitiat, si feruefacta subijcia-
tur. Semen, lienis, renum & vesicae vitijs prodest:
meneses & secundas pellit: commodè datur ischiadi-
cis in vino, inflationes stomachi lenit, sudores ciet,
& ructus. Peculiariter datur hydropicis in potu,
& contra febrium circuitus.

Elaphoboscum. CAP. LXIII.

Elaphobosco foeniculaceus caulis est, aut rori-
marino similis, geniculatus: folijs duum digi-
torum latitudine, ut terebinthi, praelongis, aliquan-
tum asperis, circumfractis: adnata multa habet,
ferentia umbellas antehi similes, & semina eius-
dem: florem subluteum: radice ternum digitorum
longitudinis, & crassitudinis unius, candida, dul-
cis, apta. Caulis tener pro olere manditur. Con-

*Intellige
non coro-
naria ros.
marinum:
sed eam, quae
simplici-
ter hoc no-
mine ap-
pellatur, de
qua cap.
lxx. huius
libri,

tra

tra serpentium ictus, datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, cernas serpentium moribus resistere.

Fœniculum.

CAP. LXV.

FOeniculum si herba edatur, aut semen cū ptisana bibatur, mammas lacte replet. Comæ decoctum in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinā excitet: cōtra serpentium ictus in vino conueniēter bibitur: menses ciet, in febribus nausēā & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices & cū melle illitæ, moribus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus, in medicamenta adijcitur, quæ ad excitandā oculorum aciem cōmodè temperantur. Extrahitur succus ad eadem valens, etiam semine viridi, ramulisq; & radicibus prima germinatione incisus. In Iberia quæ ad occidentem spectat, succum reddit gummi similē. Caulem mediū, dum herba floret rustici demetūt, igniq; admouēt, quò facilius vi coloris exutans, gummi remittat: quod efficacius succo est, ad medicandā oculorum.

Fœniculum erraticum, siue hippomathrum.

CAP. LXVI.

Est & syluestre fœniculum, magnum: ferè autem semen cachry. simile, cuius radix incundè olet, potaq; stranguriæ medetur: menses imposita ciet: ventrem sistit, radice aut semine poto, & contra serpentium morsus auxiliatur, calculosq;

LIBER TERTIVS. 257

losq; comminuit, & regium morbum expurgat: la-
tis abundantiam facit decoctum foliorum hau-
tum, & foeminas a partu purgat. Traditur aliud
hippomarathri genus, longo, exili, & angusto fo-
lio: semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Ex-
calfaciendi naturam habet, & viribus fœniculo
respondet, sed ad omnia infirmius.

Daucum. CAP. LXVII.

DAUCUM aliqui Daucium vocant. Creticum
folijs fœniculo simile, minoribus & tenuio-
ribus: caule dodrantali, umbella coriandri, flore al-
bo: semine acri, candido, hirsuto, suavisissimi odoris
in mandendo: radix digitali crassitudine & do-
drantis longitudine adolefcit: in saxosis nascitur, &
locis sole illustratis. Aliud eius genus, sylvestri apio
simile, acre, odoratum, aroma olens, feruentis gu-
tus. Probatissimum Creticum. Tertium assignatur
genus folijs coriandri, floribus albis, capite & se-
mine anethi, muscario pastinacæ: semine oblongo,
seu cumini, acri. Omnium semen excalfacit: potum
urinam, menses, & partus extrahit, torminibus
liberat, veterem tussim mitigat: phalagiorum mor-
bus potum in vino auxiliatur: tumores illitu di-
cutit. Seminis duntaxat in alijs generibus inualuit
usus: in Cretico, etiam radice, quæ maximè cōtra
venenatorum iniuriam in vino bibitur.

Delphinium. CAP. LXVIII.

DELPHINIUM, surculos emittit à radice vna
sesq;

sesquipedales, aut maiores, à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ delphinorum effigiem representant: vnde tractum nomen est. Flos violæ albæ non dissimilis, purpureus: & semen in siliquis, milio proximum, quo non aliud vtilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba, scorpiones resolui, atq; ignauos torpescere: semota verò ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis. Alterum est delphinium, quod Romani bucinum vocant, superiori simile, sed folijs & ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

Pyrethrum.

CAP. LXIX.

Pyrethrum Romani saluaream vocant, folia caulemque; emittit vt daucum syluestre & fœniculum: umbellamque; anethi, circinata rotunditatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituam elicit: idè in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur: mansa pituitam extrahit: sudores ciēt, peruncto ex oleo corpore: diuturnis horroribus efficax est & contra perfrictiones membrorum, resolutionesque; eximie conducit.

Rosmarinus.

CAP. LXX.

Canchrys.
21820015

Duo rosmarini genera: vnum fecundum frugiferumque; cuius semen canchrys vocatur: folia fœniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, incundè olentia: caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concaviis alis:

iii

in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, cæ-
 lidum, sphondylo simile, rotundū, angulosum, acre,
 resinaceum, quod in mandendo linguā exurit: ra-
 dix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alte-
 rum omninò cōsimile, semen ferens latum, nigrum
 uti sphondylion, odoratum, minimè exurens, radi-
 ce foris nigra, intus si frangatur, alba. Verum id
 quod sterile dicitur, illorū planè similitudinem re-
 fert: sed neq; caulem, neq; florem, neque semen pro-
 mit. Nasctur in saxosis & asperis. Trita omnium
 herba cōmuniter hæmorrhoidū profluvia sistit,
 sedis inflammationes & condylomata mitigat,
 concoquit strumas & abscessus, qui ad maturatio-
 nem agrè perducuntur. Siccæ radices cum melle ul-
 tera purgant: torminibus medentur cum vino po-
 ta, & contra serpentium morsus conueniunt: men-
 ses et vrinas cient, veteres tumores illitu discutiunt.
 Tam radicis quàm herbæ succus, adiecto melle illi-
 tus oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadē
 pollet: si comitiale malum sentiatur, aut vetus pe-
 ctoris vitium, auxilio est: regio morbo laboranti-
 bus cum vino & pipere datur: sudores mouet, cum
 oleo perunctum: ruptis & conuulsis prodest: po-
 dagris, cum loliacea farina & aceto tritum, illini-
 tur: purgat vitilignes, addito aceto quàm acerr-
 mo. Semine in potionibus vtendū, eius quidā quod
 Canchryn non ferat, quippe illud suæ acrimonia
 arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica na-

R

sci, folijs lactuce syluestris amara asperioribus, candidioribusq; radice breui, Theophrastus author est: potuq; idipsum alterutra parte purgare. Canchrys vim habet excalfaciendi, & vehementer exiccandi: quare abstergentibus medicamentis inseritur. Contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita vt tertio die soluat. LIBER

Rosmarinum coronarium.

CAP. LXXI.

Rosmarinum quo coronarij vtuntur, ramos mittit tennes, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, supernè virentia, * Commo * graui odore. Excalfactoria vt præditum est: re-
dius Mar gium sanat morbum, si decoctū in aqua, ante exer-
cellus, cum citationes bibatur: & vbi laborans exercitationi
grauitate se crediderit, in balnea descendat, & merum potet.
odorata. Acopis, gleucinoq; vnguento admisceri solet.

Sphondylium. CAP. LXXII.

Sphondylium folia quadāntenus platani & Spanacis habet: caules fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius asurgētes, in quorū cacumine semen duplex: seseli simile, sed latius, candidius, & magis paleaceū, grauis odoris: flores eius albi, aut pallētes: radice raphani, cādida. Nascitur in palustribus et aquosis. Potū semen pituitā per aluū extrahit: medetur iocineris vitis, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vuluarū stragulationi. Veteranos suffitu renocat: cū oleo cōmodè infunditur caput

LIBER TERTIVS. 267

Atibus phreniticorum, & lethargicorum, item ca-
pitis doloribus: cum ruta illitum, serpentina vlcera
colibet. Datur radix contra regium morbum, &
ocineris vitia: circumrassa eadem & iniecta cal-
los fistularū derodit. Recentis floris succus exulcera-
tis auribus, purulentisq; accommodatur: qui cate-
rorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

Ferula.

CAP. LXXIII.

E Viridi ferula medulla pota utilis est ad cru-
entis excreationesq; , celiacosq; , & contra
viperae morsus in vino datur, erumpentemq;
naribus sanguinem indita sistit. Semen potum tor-
minosis auxiliatur: sudores ciet, vincto ex oleo cor-
bore. Caulex, si edantur, capitis dolores faciunt: mu-
ria condiuntur. * Ferula itaq; caulem profert ter-
mim saepe cubitorum: folia faeniculi, longē aspe-
riora, & latiora. qua ab imo caule vulnerata saga co, ac anti-
penum efficitur.

* Desunt

in codice

nostro gra-

co, ac anti-

quissimis

Peucedanum.

CAP. LXXIIII. quibusq;

P Eucedanum, caulem emittit tenuem, gra-
cilentum, faeniculo similem: comam ha-
bet statim ab terra copiosam, spissamq; : flore

Marcello

teste.

luteo: radice nigra, crassa, graui odore, succosa. gi-
gnitur in montibus opacis. Tenera radix cultel-
lo conciditur, profluensq; è plaga succus vmbrae
mandatur: in sole siquidem confestim euanescit.

Colligitur capite prius & naribus rosaceo per-
fusus, ne capitis dolor premat, & vertigo sentia-

R 2

tur. Affatione radix inutilis fit. Tam lac quàm succus radice & caulibus extrahi solet, sicut è mādraga: verum inefficacior succo lacryma habetur, et velocius expirat. Interdum etiā concreta inuenitur lacryma, thuris similitudine, caulibus radicibusq; adherens. Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore grani, feruens gustu. Ex oleo & rosaceo illitum pencedamum prodest lethargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis: omnibus, in vniuersum, vitijs nervorum, ex oleo et aceto illitum prodest. Eius olfactu respirant vuluæ strangulatus, & veterinosi reuocantur: incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur: cauernis dentium inditum, mitigat dolorem: contra tussim efficacissimè ex ovo assumitur, suspirijsq; & torminibus, et inflationibus subuenit: ventrem leniter emollit, lienem absorbit, difficiles partus mirè adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distentiones potum, & vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior: eius decoctum bibitur. Farina eius, sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squamas ossium extrahit. In cerata, & calfacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris nucibus aut ruta, aut pane calido, aut anetho resoluitur.

* Herba doctis omnibus pro Melanthio recepta, folijs fœniculū poti⁹ quàm senecionem videtur imitari, vt certè locum hunc esse aut depravatū, aut verum ignorari melanthion, sic suspicandum.

Gith, seu Melanthium. CAP. LXXV.

Gith exilibus surculis fruticat, sæpe binos dorantes excedens: folijs * vt senecionis minus, sed multo tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblongo, inter cursantibus membris: quibus semen includitur nigrū, cre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subuenit: discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex trino, & infusum varibus: tollit lepras, lētigines, duritias, tumoresq: vetustos, cum aceto illitum: circumscarificatos clauos excutit, cum vetere vrina impositum: dentium doloribus, decoctum cum aceto & teda, prodest: tetes ventris tineas expellit, peruncto ex aqua vmilico: destillatione laborantes adiuuat, tritum in mteco, & olfactum: vrinā & mēstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit: difficultatē pirandi cum vino potum leuat: phalangiorū moribus ex aqua, drachmæ pondere, haustum auxiliatur: incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

Laserpitium in Syria, Armenia, Media, et Libya nascitur, caule ferulaceo, quē masspetum vocant: folijs apio similibus: lato semine. Radix excalfacit, in cibis agrè concoquitur, vesicæ noxia: sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cū cerato, medetur: ischiadicis conuenit cum irino aut cyprino cerato: excrescentibus circa sedem tollendū illinitur, cum putamine mali punici, & aceto decocta: venenis pota resistit: os commendat, cibis amali permiscita. Lafer è radice atque caule scarificatis colligitur. præfertur autem rufum, translucēs myrrhæ æmulum, non porraceum, odore valens, suauis gustu: quod dilutum facile albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, atquē ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosū reddunt odorem. Lafer omne antequam sicefeat adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento: quod maleficiū apprehenditur, gustu, odore, visu, & dilutione. Caulē aliqui silphion, radicem magudarin, & foliū masspeton vocauerunt. Efficacissimum lafer, mox folia, postremò caulis. Acrem vim habet, inflationem facit: perunctis cum aceto, pipere & vino alopecias sanat: oculorū aciem exacuit, & incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat: caernis de-

tium in dolore inditur, aut cum thure in linteo circumligatur, aut cum hyssopo, ficis coctis in posca, os colluitur: ijs prodest, quos bestia in rabie effrata momorderit, vlncribus immissum: valet aduersus venena telorum, & animalia omnia, quae virus ei aculantur, potum aut illitum: scorpionum plagis olco dilutū circumlinitur: gangraenis praecoerctis immittitur: & cum ruta, nitro & melle, vel per se, carbunculis: clauos colosq; prius circumrasos vellit: cerato aut aridorum ficium carne praemollitum, recentes lichenas ex aceto sanat. Et excrecentia in carne, polyposq; si aliquot diebus cum atramento sutorio, aut æruginē illinatur: extubercantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium scabritijs opitulatur: grauem, subitoq; irrauescentem vocem, dilutum aqua, sorbitione confestim expedit: vuam illitum cum melle reprimat: anginis ex aqua mulsa vtilissimè gargarizatur: vescentes latiore colore mangonizat: tussi commodè in sorbili ouo datur, & pleuriticis, in sorbitionibus: in fellis suffusione, & aqua inter cutem, cū aridis ficis: horrores discutit cum vino, pipere, & thure potum: neruorum contractionibus, opisthotonicisq; datur oboli pondere deuorandum: haerentes gulae hirudines, gargarizatum cum aceto decutit: ad lac intus coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulso proficit: menses ciet, cū pipere & myrrha potum: coeliacos adiuvat, in acino vuæ sumptum.

cum lixiuio autem potui datum, repente conuulsis
ruptisq; prodest: ad potiones resoluitur, nucibus
amaris, aut ruta, aut calido pane. Foliorum succo
ad eadem proficitur, sed multo inefficacius: cum ac-
eto mulso manditur, ad expediendam arteriam, ma-
ximè cum vox retunditur: eo cum lactucis vtun-
tur, exitq; in vicem erucæ. Fertur & altera magu-
daris in Libya nasci, radix laserpitio similis, se-
minus crassa, acris & fungosa, ex qua non profuit
succus. eiusdem cum lasere facultatis.

Sagapenum. CAP. LXXVII.

Sagapenum ferulaceæ herbæ succus est, quæ in
Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo
forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter
laser, & galbanum redolens, gustu acri. Prodest late-
ri, & pectoris doloribus, tussibus vetustis, conuulsis,
& ruptis. Crassam pulmonis pituitam expurgat.
Datur comitialibus, opisthionicis, lienosis: item con-
tra nervorum resolutionem, perfrictiones, & febrium
circuitus in potu: in unguenta probe admittitur: me-
les pellit, sed factum exanimat, cum hydromelite po-
tum. prodest ex vino haustum, serpentium ictibus: ol-
factum ex aceto vulvarum strangulatus exsiccat, oculi
dolorum cicatrices, offusam caliginem, hebetudines, suf-
fusionesq; detergit. Resoluitur ut laser, ruta, aqua,
& amaris nucibus, aut melle, aut calido pane.

Euphorbium. CAP. LXXVIII.

Euphorbium Libyca arbor est, ferula spe-
ciem

ciem habens, quæ in monte Atlante iuxta Mau- *Ita Plin.
ritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo turget: cu- Græcus,
ius eximium feruorem expauescētes incolæ, ouillos in Tmolo.
ventres elutos, arbori circumligāt, & eminus cau-
lem contis incidunt, cōfestimq; è plaga, perinde at-
que vase quodam, in ventriculos copiosus lactis hu-
mor effluit, præter id quod humi sparsum, vulnus
ei aculatur. Duo succi genera: vnum orobi magni-
tudine, sarcocollæ modo emicat: alterum in ventri-
culis concrefcit, atq; vitreum spectatur. Eligendum
est translucens, & acre. Euphorbium adulteratur
sarcocollæ, & glutini mīstione, sed difficile quidem
experimentum: quippe cum leui gustū, os accensum
diu detineat, adeò vt quicquid ori obijciatur, planè
euphorbium resipiat. Eius inuentio tempore Iubæ
regis Libyæ cognita extitit. Succus illitu suffusioēs
discutit, potus tota die exurit: quare melli collyrijs-
que pro acrimoniæ ratione admisceri debet. Coxa-
rum doloribus prodest in odorifera potiōe haustus:
squamas ossium eadem die eximit: verum eo vten-
tes, necesse est linamētis aut ceratis communire cor-
pus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriæ pro-
diderunt, percussos à serpente nihil molesti passu-
ros, si incisa osse tenus capitis cute, intritus succus
infundatur, vulnusq; postea consuatur.

Galbanum. CAP. LXXIX.

Galbanum succus est nascentis in Syria fe-
rula, quod nonnulli metoptum vocant. Ma-

R S

ximè laudatur cartilaginosum, merum, thuris effigiem præbens, pingue, minimè liguosum, retinens nonnihil adiecti seminis, & ferula, graui odore, neq; valde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina & ammoniaco. Galbanum excalfacit, vrit, extrahit, discutit: menses ac partus trahit appositum vel suffitum: lentigines aceto & nitro perunctas tollit: deuoratur adtussim veterem, difficultatem spirandi. suspiria, rupta, conuulsa: aduersatur toxicis, potum cum vino et myrrha. simili modo sumptum mortuos partus extrahit: imponitur lateris doloribus, & furunculis: comitiales, & vulua strangulatus, & vertiginosos olfactu suscitatur: si vratur, fugat nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur: serpentes cum oleo & sphondylo circumpositum, necat: dentium dolorem oblitum, aut cauernis inditum, mitigat, vrinæ difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad portiones amaris nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsæve, aliàs meconio, ere vsto, aut felle liquido. Si purgare Galbanum voles, in ferucentem aquam demittito: nanque cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt: quas hoc modo facile separabis: mundo linteo raroq; alligatum in fictili aut area pyxide ita pendeat, vt imum vasis ne tangat: opertoq; vase in feruidam aquam demittito: sic enim syncerum, veluti per colum eliquescet, & liguosum in linteo remanebit.

Aq

Ammoniacum. CAP. LXXX.

Ammoniacum, ferula succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit: cuius fruticē cum radice agasyllim vocant. Probatur bene coloratū, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus thrausma, id est, friaturam appellant: quod verò terram, & calculos collegit, phyrama. gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculū, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit: tubercula duritiasq; discutit: potum, aluum soluit: partus extrahit, lienem consumit, drachmæ pondere haustum: articulorum coxendicumq; doloribus liberat: auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisanæ succo sorbeatur: cruentam vrinam pellit: albugines oculorum absterget: genarum scabritiam absument: tritum autem cum aceto, & impositum, iocineris lienisq; duritias sedat: discutit tofos, qui in artubus cōcalluerunt, cum melle aut cum pice illitum. lassitudines, & coxēdicum dolores eo perungi vtile est, cum nitro, & cyprino oleo, vice acopi.

Sarcocolla. CAP. LXXXI.

Sarcocolla, lacryma est arboris in Perside nascentis, pollini thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnere glutinat, oculorum fluxiones in-

hibet :emplastris inseritur. Adulteratur admisto gummi.

Glaucium.

CAP. LXXXII.

Glaucium, succus est herbae quae ad Hierapolim Syriae nascitur, folijs ferè corniculati papaveris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari : tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calfaciunt indigenae, vsque dum flaccescant, deinde contusis succum exprimunt: cuius est vsus ad oculorum medicamenta, vtpote cum inter initia refrigeret.

Glutinum.

CAP. LXXXIII.

Glutinum, quod xylocollan, alij taurocollan vocant, praestantissimum Rhodiaceum. quod ex bubulis corijs conficitur, id candidum est, & translucens. Nigrum verò minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines leprasq; cutis delet: am bustis igni ex aqua calida dilutum illitumq; , pustulas erumpere non patitur. vulneribus prodest: melle aut aceto madefactum.

Glutinum piscium.

CAP. LXXXIII.

Ichthyocolla, glutē pisciū, vèter est piscis cetacei. Praestat candidās, natione Ponticū, subasperū, minimè scabrum, et quod celerrimè liquefcit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quae cutē faciei erugāt, & extēdūt.

Viscum.

CAP. LXXXV.

Viscum optimum est recens, intus porraceū, extra

extra fuluum, quod asperi nihil, aut surfurosi con-
 eperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxco fru-
 tibus folio: contusum acinum lauant, & postea in
 qua decoquunt: sunt qui commanducando ipsum
 efficiant. Gignitur quoq; in malo, pyro, & plerisq;
 lijs arboribus: quinetiam inuenitur in quorūda
 riticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit: pa-
 otidas, tubercula, cæterasq; collectiones ad matu-
 rationem perducit: cum resina autem, & cera pa-
 i, epimyctidas in splenio sanat: vetera vlcera ab-
 essusq; quos cacoethes vocant, ex thure mollit: lie-
 em cum calce, gagate, aut Asio lapide coctum, &
 npositum absomit: cum sandaracha, aut auri pig-
 mento illitum, vngues extrahit: mistum cum cal-
 e, & vini fece, suam vim intendit.

Aparine. CAP. LXXXVI. Vulgò a-

A Parine ramis multis, & paruis frutificat, spergula.
 asperis, quadrangulis, per intervalla orbi-
 ulato foliorum ambitu, vt in rubia: flos albus: se-
 nen durum, rotundum, concauum, album, vmbi-
 ci figura, asperitate vestium tenaci. Ea pastores
 oli vice vtuntur, ad eximendos à lacte pilos. Semi-
 is, caulium, ac foliorum succus, potu contra vipe-
 arum phalangiorumq; morsus auxiliatur: infu-
 aurium dolori medetur. Herba cum axungia
 rita strumas discutit.

Alyssum. CAP. LXXXVII.
A Lysson exiguus frutex est, vnicaulis, sub-
 asper.

asper, rotundis folijs: fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen, quadamtenus latum. in montibus, & asperis locis emicat. Eius decoctum singultus sine febris, potu discutit: idem efficit, si quis eam aut teneat, aut odoretur: cum melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emendat. contusa in edulio, rabiei canis mederi putatur. domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atque animalibus fascini amuletum. Purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

Asclepias. CAP. LXXXVIII.

plin. lib. 27. cap. 5. **A**sclepias, ramos emittit longos: folia hederæ, longa: radices numerosas, tenues, odoratas: flos ris virus graue: semē securidacæ. nascitur in montibus. Radices ex vino potæ torminibus auxiliatur, & cōtra serpentium ictus. Folia aduersus vuluæ māmārumq; vlcera, quæ caccēthe vocāt, illinūtur.

Atractylis. CAP. LXXXIX.

Atractylis, spina est cnico similis, folia multo longiora ferens in summis virgis, magna parte nuda, asperaq; quæ fœminæ profusis vtuntur: capitula in cacumine spinis horrent. flos luteus: quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, superuacua. Comā, semen & folia cum pipere, et vino teruntur vtilissimè contra scorpiionum ictus. percussos tradunt quandiu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudesce.

Pol

LIBER TERTIVS. 273

Polycnemum. CAP. XC.

Plycnemon, frutex est surculosus, folijs origami: caule, vt pulegi, geniculis multis intercepto, ne umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris, & acris. Vulneribus agglutinandis rebus, aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur: sed in vino die solui debet. Ad vrinae stillicidia ruptaq; in vino bibitur.

Clinopodium. CAP. XCI.

Clinopodium frutex est folijs serpilli similis, surculosus, duum dodrantu altitudine. nascitur petrosus. Flores, marrubij modo, ex intervallis distincti specie leiti pedu prebent. Bibitur herba & coci eius decoctu, ad couulsa, rupta, Strangurias, & pentiu ictus: mens et partus pellit: et pesiles vercas, quas acrochordonas vocat, eicit, aliquot diebus potu. alium sistit decoctu ad tertias, potumq; febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex vino.

Leontopetalum. CAP. XCII.

Leontopetalon, caule emittit dodrantalem, aut altiore, plurimis alis concavum, & in cacumine semina parua duo aut tria, in siliquis, ciceris modo: flores anemonae similes, punicei coloris: folia brassicae, sed papaueris diuisura: radices nigris, rapae similibus, strumosis. nascitur in aruis et petibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex vino pota. nec alia res celerius dolorem finit. Minitur ischiadicorum clysteribus.

Ten

Teucrium. CAP. XCIII.

*Chamae-
dryos.

Teucrium, sive ut alijs placet teucriis, herba est virgæ referens effigiem, & trissaginis similitudine, tenui folio, non multum à cicere alieno, hæc in Cilicia iuxta Gentiatem Cissademq; vbertinprovenit. Recens cum posca, aut arida feruefactus, potu lienem potenter absument: lienosis cum aceteto & ficis illinitur: item serpentium morsibus ex aceto solo, sine ficis.

Trissago. CAP. XCIII.

*Plin. colore: quod
herba pul-
chrè con-
gruit.

Chamædris Græcis, alijs chamædrops: Latini Trissago dicitur. sunt qui eam teucrion appellant & ipsum lauere, propter eam quam cum teucrio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis: frutescens, dodrantalis, folia habens exigua, amara, & effigie & diuisura quercus: flore paruo, penè purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu tussibus, indurato lienis, vrinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur: citi mensis partus extrahit, lienem ex aceto pota cõsumit: aduersus serpentium venena ex vino, potu, illituq; efficacissima. Trita digeritur in pastillos ad supraddicta: purgat vetera vlcera, cum melle: cū oleo illita caliginē oculorū discutit: natura eius est calfacere.

Leucas. CAP. XCV.

Leucas montana, latioribus quàm urbana folijs, semine acriore, amariore, ori ingrato efficacior tamen quàm satina habetur. Vtraq; ex

vin

Vino contra animalium venena, præcipue mariorum opitulatur.

Lychnis.

CAP. XCVI.

Lychnis coronaria, flore est albæ violæ similis, sed purpureo quo corollæ factitantur. Contra scorpionum ictus semen in vino potum auxiliatur. Lychnis sylvestris, omnia urbana similis. Bile per aluum detrahit, semine duabus drachmis potio: ictus à scorpione subuenit. Aiunt huius herbæ appositum, scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

Lilium.

CAP. XCVII.

Lilia coronamenti se dedunt, Lilia à quibusdam vocata. E quibus vnguentum temperatur quod aliqui lirinum, alii susinum appellant, nervos & priuatim vulnæ duritias emolliens. Folia herbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur: feruescunt, ambusta proficiunt: aceto condita, vulneribus opitulatur. Succus adiecto melle aut aceto, in æreo vase coquitur, conuenienti medicamento vetustati plcerum, & ad recentia vulnera. Inassata radice & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat, vulnam mollit, menses ciet, vlcera cicatrice obducit: cum melle detrita, nervis præcisis, luxatisq; medetur: vitiliginis, furfures, & lepras emendat: vlceraq; in cavitate manantia expurgat: alio tergit faciem & eruat: teritur in aceto cum hyoscyami folijs, & farina ritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen totum moribus serpentium aduersatur: ignibus sa-

Kpivov.

cris semen & folia cum vino illinuntur. Tradunt
 * πορφυρὰ & * rubra esse lilia. In Syria autem & Pisidia
 Pamphylia, efficacissima vnguentis nascuntur.
 id est, purpurea. Ballote. CAP. XCVIII.

B Alloten, nomine alio nigrum marrubium vo-
 cant: caules aedit quadrangulos, nigros, sub-
 sum fexti- hirsutos, complures ex vna radice: folijs maioribus
 dum. quàm marrubij, hispidis, cingentibus per interval-
 * σπογγυλά la caulem, * subrotundis, graueolentibus, apiastrum
 τριφύλλοι candidi flores vniuersi verticillato ambitu caulem
 i. rotundio- coronant. Vis eius efficax aduersus canis morsus,
 ribus. Plinius ni folijs ex sale illitis: feruenti cinere flaccescunt folia,
 grioribus: ut condylomata reprimant: purgāt & sordida vt
 quod ma- cera cum melle.

gis arridet
 Melissa of-
 ficinis.

Apiastrum.

CAP. XCIX.

M Elissophyllon siue melitena, id est, apia-
 strum, id sibi nomen vsurpauit, quoniam
 apes ipsa herba delectantur, cauliculi & folia ba-
 lota, de qua paulò antè diximus, similia essent, ni-
 si maiora, tenuioraq; nec ita hirsuta spectarentur.
 citreum malum olent. Folia cum vino pota aut il-
 lita profunt contra ictus phalangiorum, scorpio-
 numq;: item aduersus canis morsum. Decocto eo-
 rundem gratia, foueri prodest: de sessionibus femi-
 narum ad ciendos menses conuenit, dentes eodem in
 dolore colluuntur, dysentericis infunditur. Fungo-
 rum strangulationibus folia, addito nitro, potu au-

xi

LIBER TERTIVS.

277

xiliatur: torminibus & orthopnoicis, delinctu. Illita cum, sale strumas discutunt, vlcera purgant, articulares dolores illita sedant.

Marrubium.

CAP. C.

Marrubium, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis: folium pollicem aequat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro: semē in caulibus, & ex interuallis: flores verticillato ambitu, asperi. Na scitur propter adificia, ruinas, & rudera. Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut viridū succus datur cum melle suspiriosis, tussientibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam ē peccore pituitam, cum sicca iri eijcit. Mulieribus à partu nō purgatis datur, vt menstrua & secundas extrahat: item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut à serpentibus demorsi sunt: vesicam renesque lēdit. Folia cum melle illinuntur sordidis vlceribus purgandis: pterygia nomasq; sistunt, lateris dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet, cū vino & melle illitus, oculorum claritatem adiuvat: naribus regius morbum expurgat: aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cum rosaceo.

Stachys.

CAP. CI.

Stachys frutex est, marrubio similis, sed lōgior: folia ferēs numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris incuncti, & complures virgas ab radice

S 2

exeuntes, marrubio candidiores: nascitur in montibus & asperis. Vim habet extalsacloriā & acré: foliorū decoctum potu pellit menstrua & secundas.

Phyllitis.

CAP. CII.

Lingua
ceruina.

Phyllitis, folia promit rumici similia, longiora, & viridiora, sena aut septena, recta, quae parte anteriore laeua cernuntur, à tergo autem pensiles quasi vermiculos tenues ostendunt: in umbrosis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbo: neq; caulem, neq; florem, neq; semen profert. Folia in vino pota serpentium morsibus aduersantur: quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria aut resoluta alius exercet, potui datur.

Phalangium.

CAP. CIII.

* οἱ ἵ κρι
ταύτην
αὐκάναν
θαμ καλῶ
σι.
* Ita Plin-
ius. Grae-
cus παχὺ,
id est, cras-
so.

Phalangium à quibusdā phalangites vocatur. Framuli sunt ei duo, aut tres, pluresve, in diuersa tendentes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habens: semine nigro, * lato, ad lenticulae dimidiata figuram, multo tenuiore: radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur: prouenit in collibus. Huius folia, semen, flos cum vino pota, auxiliantur contra scorpionum phalangiorūq; ictus: tormina quoq; discutiunt.

Trifolium.

CAP. CIIII.

Trifolium, Graeci triphyllon, alij oxytriphyl-
lon, alij menyanthes, alij asphaltion, vocant.
Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, virgas habens tenues, iunceas & nigras, vnde ramulares enase

enascuntur appendiculæ, in quibus terna singulis
germinationibus exeunt folia, loto arbori similia:
ijs recenter enatis ruta odor inest: ubi autem adole-
uerunt, bitumen olent. Florem adit purpureum, se-
men quadamtenus latum, subhirsutum, ex altera
extremitate exertum, antennæ modo corniculum ge-
rens. Radix tenuis, longa, valida. Semen & folia
in aqua pota pleuriticis, urina difficultati, comitia-
libus, & ijs qui aquæ inter cutē principia sentiunt,
fæminis quoq; vulvæ vitio opportunis, auxilian-
tur: menses ciunt: ternæ drachmæ è semine dari de-
bent, è folijs verò quaternæ. Contra serpentium ictus
trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt.
Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorumq;
decoctum fotu dolores eorum finire, quos serpentes
percusserint: qua autem aqua sanatus quis fuerit, si
ea quispiã alius foveatur, qui vlcus habuerit, per-
inde afficitur vt à serpente demorsus. Quidam ter-
na folia aut semina in tertianis, cum vino potui de-
dere: & in quartanis, quaternæ, vt quæ febrim cir-
cuitus discuterent. Radix antidotis inseritur.

Polium.

CAP. CV.

DVo genera polij: montanum, cui teuthrio
nomen est, & cuius est usus. Tenuis frutex
est, candidus, dodrantalis, semine refertus: capi-
tulo in cacumine quandam corymborum speciem
præ se ferente, paruo, cano hominis capillo simili,
grauiter olente, non sine quadam suauitate. Alte-

rum fruticosus, nō vsq; adeo valens odore, & viribus infirmus. Potum feruesacti ius auxiliatur serpentiū ictibus, hydropicis, morbo regio: & lienosis ex aceto: stomachū male habet: caput doloribus afficit, aluum & menses ciet: substratum suffitūmve serpentes abigit: illitum vulnera conglutinat.

A N N O T A T I O.

Scordij hoc loco depicti vberimus ubiq; est prouetus, vt non iniuria eorum sit explosus error, qui alliū syluestre, aut obuiā quamcunq; herbam allium subolentē, hoc esse opinabantur. Est autem præter id, Plin. lib. 25 cap. 6. authore, aliud quoddam genus latioribus folijs ac mētastrī effigie, cuius nup in mōte quodam ad Viennā ingēs se copia nobis obtulit: nec alia fanē nota, quā foliorū cū mentastro similitudine, à scordio huic authori descripto, differre obseruauim⁹.

Scordium.

CAP. CVI.

Scordium, in montibus & palustribus nascitur, folijs trisaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustu amaris & adstringentibus: quadrangulis caulibus: subrubro flore. Herba vim excalfactoriam habet: vrinam cit. Cocta recens aridaue cum vino, aduersus venenatos serpentium morsus bibitur: ad stomachi quoq; rosiones, dysenteriam, & vrine difficult

ficulatem, binis drachmis cum hydromelite: crassa
 men purulentum pectore expellit. Facit arida fa-
 rina ad veterem tussim, rupta, convulsa, si cum na-
 turtio melle & resina misceatur in eclegmate: in-
 ramata modicè præcordia, cerato excepta, recreat,
 um aceto acri aut aqua, podagris convenienter il-
 minitur: menses imposita mouet: vulnera congluti-
 nat: vetera vlcera purgat, & ex melle ad cicatri-
 em perducit. Sicca excrescentias in carne cohibet.
 Succus ad eadem vitia bibitur. Inter prima efficax
 Ponticum natione, Creticumq;.

Tussilago. CAP. CVII.

Tussilagini, folia sunt maiuscula quàm hede Vulgo vn-
 ra, sex aut septem à radice, subalbida à ter- gula cabal
 a, supernè virentia, in plures angulos exeuntia: lina.
 aulis palmum altus: flos luteus, vere prodit, quo
 nà cum caule cōfestim exuitur: inde nonnulli his
 vacare existimauerunt. Radix tenuis est & super-
 acua: nascitur in amœnis & riguis. Folia ex mel
 e trita igni sacro & omnibus inflammationibus
 litu medetur. Aridæ fumus per infundibulū hian-
 ore raptus, hos sanat qui sicca tussi atq; ortho-
 noea infestantur: pectoris vomicas rumpit. Eun-
 em effectum præbet suffita radix. Decocta in hy-
 dromelite, & pota emortuos partus eicit.

Artemisia. CAP. CVIII.

Artemisia magna ex parte in maritimis na-
 scitur, absinthij modo fruticosa, maioribus

& pinguioribus folijs, ramisq; : huius quidem genera duo. Vnum latius habitusq; , folijs , virgisq; laticribus. Alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente : æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellant, tenuē herbulam, simplici caule & minuto, floribus scatēte tenuibus, flauo colore, hac incūdiore quā precedens efflat odorem. Vtraq; excalfacit, extenuat: feruefacta conuenienter in muliebres deſſus adijciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq; : item ad præclusiones vuluæ, & eiusdem inflammationes: calculos cōminuūt: remorata m urinam cient: menses pellūt pubi illita. Succus vuluæ inditus ex myrrha, eadem quæ inſeſſo trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

Ambrosia.

CAP. CIX.

Ambrosia pusillus frutex est, ramosus, altitudine trium palmorum: folijs rute, circa imum caulem exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem pariunt, odore vinoso, suauis: radice tenui, sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illius adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

Botrys.

CAP. CX.

Botrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa: semen circa totos ramos prouenit: folia cichorio similia: tota suauem odorem

LIBER TERTIVS. 283

odorem spirat: quare vestimentis interponitur: inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopnceas mulcet. Hanc Cappadoces ambrosiam vocant, alij artemisiam.

Geranium. CAP. CXI.

Geranium folijs anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflationes discutit. Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: folijs maluæ, in summis alis binus vultus sursum spectantia gruu capitula insunt, cū suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina vsus.

Gnaphalium. CAP. CXII.

Gnaphalij folijs mollibus ac albis pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino aut stero, ad dysenteriam.

Typha. CAP. CXIII.

Typha folium ædit & cyperidi simile: caulem album, leuem, æquabilem: florem in cacumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod paniculam aliqui nominant. Huius herbe flos, suillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

* Intellige
quam lib.
i. cyperum
vocat.

Circæa. CAP. CXIIII.

Circæa, quam & dircæam aliqui vocant, folijs est hortensis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine mili, nascente in quibusdā veluti corniculis: dodrantali radice, tri-

plici fermè aut quadruplici, candida, odorata, ex-
calfaciente. Nascitur in apricis, saxis, & vento
perflatis. Radicis tusa pondo quatuor, in sextarijs
tribus vini dulcis, per diem & noctem maceran-
tur, potuq; triduo vulvas expurgant. Semen in sor-
bitionibus datum, lacte mammas nutrici explet.

Oenanthe. CAP. CXV.

Videtur no-
stra Fili-
pendula.

Oenanthe folia habet pastinacæ: florem can-
didum: caulem crassum, palmi altitudine: se-
men atriplicis: radicem magnam, in multa rotun-
da capitula extuberantem: nascitur in petris. Cau-
lis eius & folia, cum mulso vino pota secundas eij-
ciunt. Radix è vino, vrinæ stillicidio conuenit.

Conyza. CAP. CXVI.

Vulgò pu-
licaria.

Conyzæ duo genera: quæ parua vocatur, odo-
re præstantior est: maior verò frutice altior
& folijs latioribus, graui odore. Vtriusq; folia oleæ
similia, hirsuta, pinguis. In maiore caulis binum
cubitorum altitudine attollitur, in minore pedem
æquat. Flos fragilis, lutei coloris, subamarus qui in
pappum abit: radices superuacua. Suffitu substra-
tuq; frutex totus serpentes fugat, culices abigit, &
pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpen-
tiū plagis, & tuberculis, ac vulneribus. Flores &
folia cum vino ad menses partusq; eijciendos bibun-
tur: item contra vrinæ stillicidia, arquatum mor-
bū, & tormina: comitiales pota ex aceto adinuāt.
Decoctum in defensionibus medetur vuluæ malis.

Impo

LIBER TERTIVS. 285

Impositus succus abortum facit. Ex oleo efficaciter
 horroribus & obliuitur. Capitis dolores tenuis illi- * ἡ ῥόα
 a sanat. Est & tertium conyx & genus, caule cras-
 iore, ac molliore: folijs media inter maiorem ac mi-
 norem amplitudinis, minime autē pinguibus: mul-
 tō grauioris hæc est odoris & iniucundioris, sed in-
 fficacior. Prouenit locis non riguis.

Hemerocallis, siue lilium syluestre.

CAP. CXVII.

Hemerocallis foliū & caulem habet lilij, por-
 raceo colore: flores in caule per singulos exor-
 tus, terni aut quaterni erūpunt, lilij diuisura, quo-
 ies dehiscere cōperunt, colore perquā pallido: ra-
 dix magna est atq; bulbosa: quæ pota, aut cum mel-
 le & lana in pessō apposita, aquā educit & sangui-
 nem. Folia trita mammarum inflammationes à
 artu contractas, oculorūq; collectiones mitigant.
 Radix & folia igni ambustus vtilissimè illinūtur.

ANNOTATIO.

Leucoion, si nominis etymon spectes,
 albam significat violam: solet tamen &
 pro lutea, cærulea ac purpurea vsurpari.
 Nunc officinis, Arabum ferè sequacibus,
 Cheiri nuncupatur.

Leucoium, siue viola alba.

CAP. CXVIII.

Leucoion vulgaris est notitiæ, sed in floribus
 differentia quedam: nanq; aut cærulei, aut
 albi,

albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea vero præcipui in medicina vsus. Huius aridi flores feruefacti in desensionibus, valent contra vuluæ inflammationes, & menstrua expellunt: sanant oris vlcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis. Semen duum drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle inditum, menses, secundas & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

Cratæogonum. CAP. CXIX.

Videtur genus Persi- **C**ratæogonum, siue ut alijs placet cratæonon, folijs melampyro simile est, multis calamis caria, non ex vna radice emicantibus, multorumq; geniculomaculatū. rum: semine milij: nascitur magna ex parte in opacis & frutetosis, summopere acre. Traditum est à quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ duobus mulier, ante cōceptum quadraginta diebus: & vir modo consimili, totidem diebus ante coitū hauriat, virilis sexus partum futurum.

Phyllum. CAP. CXX.

Phyllum, quod & eleophyron vocatur, duum generum est. quod autem thelygonum appellant, in saxosis musci modo gignitur, folio oleæ, sed magis herbaceo: caule tenui, breui: radice exili: florem album profert: semen papaueris maiusculum. Sed arrhenogonū cætera huic simile, solo fructu distat: habet enim racemosum quiddam deflorenti-
bmo

LIBER TERTIVS. 287

us olei non dissimile. Arrhenogonon potu, mascululi sexus facere partus, ut thelygonon foeminet, roditur. Horum Crateuas author est: sed huiusmodi historiâ tenus, mihi produxisse visum est.

Testiculus. CAP. CXXI.

Testiculus, quem Græci cynosorchin vocant, Officinis folijs circa imam caulis partem in terra strâ falsò satyris, oleæ molli similibus, longioribus, angustioribus, rîo, de quo eniibus: caule dodrantali: floribus purpureis: radi- seq. cap. bull-osa, oblonga, oliuæ modo angustâ, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ molior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbi: ex quibus si maiorem edant viri, mares generari dicuntur: si minorem foemina, alterum sexum. Ad- unt, in Thessalia mollem mulieres in lacte capri- o bibere, ad stimulandos coitus: aridam verò, ad inhibendos: & alterum alterius potu resolui. Na- titur in petrosis & sabuletis. Testiculus alio nomi- ne serapias, Andrea anthore vocatur, quoniam ra- ix ad multa utilis sit. folijs est porri, latioribus, blongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis: caule almeo: floribus penè purpureis, radice testiculis si- mili: quæ illita tumores discutit, vlcera purgat, & rperere eadem non patitur. Abolet fistulas, & illitu- inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhi- ent: sanantq; putredines, & oris vlcera cacoëthe: luum sistunt è vino potæ. De hac, eadem quæ de sticulo canis, produntur.

Sat.

Satyrium.

CAP. CXXII.

Satyriū aliqui trofolium vocant, quoniam trifert folia, ad terram infracta, rumici aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalē, nudum: florem lilij effigie, candidum, radicem bulbosam, māli magnitudine, fuluam, intus vt ouum candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratam quam in vino nigro austero bibere conuenit, cōtra opisthotonum. Utendum ea cum concumbendi incēssit cupiditas, siquidem ea prouiores ad venerem fieri affirmant. Est & alterum satyrium erythroniū siue erythraicon, id est rubrū, semine lini, maiore, duro, læui, splendente: quod fertur, non secus ac que scincus, libidinē excitare. Cortice radice graui, rufo: intus autem album includitur, sapore dulci non ingrato ori: in montosis & apricis enascitur. Venerem, vt produnt, si omninō manu teneatur rē dix, stimulat: eoq; magis, si bibatur in vino.

Horminum. CAP. CXXIII.

Vulgò Gal
litricum.

Horminum herba est, folijs marrubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circum quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur: siquidem in syluestris rotundum, fuscum inuenitur: in altero, nigrum, & oblongum, cuius est vsus. Ad venerem stimulant, cum vino bibere volunt. Purgat cum melle argemas albuginesquæ & illud ex aqua tumores discutit. Ea etiam ex

trahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illi-
ta herba. Sylvestre magis viribus pollet: quare un-
guentis, praesertim gleucino, permiscetur.

Securidaca. CAP. CX XIII.

HEdysaron, quod unguentarii pelecinum, id
est securidacam vocant, frutex est, folijs ci-
teris: semen rufum in siliquis fert, corniculorum
modo aduncis, quod ancipitem securim aemulatur,
unde nomen accepit: amarum gustu. Stomacho uti-
le in potu. Additur in antidota. Cum melle ante coi-
tus subditum, concipiendi spem adimit. Nascitur in
segetibus & hordeis.

Onosma. CAP. CX XV.

Onosma, oblonga folia habet: ad similitudi-
nem anchusae, longitudine quatuor digito-
rum, & vnius latitudine, mollia, in terra iaceta,
sine caule, sine semine, sine flore: radice nititur lon-
ga, tenui, infirma, rubescens: gignitur in asperis. Fo-
lia in vino pota partus extrahunt. Praegnas si eam
supergradiatur, abortum facere dicitur.

οι ὅσμι
α. οἱ δὲ
φλονίτι-
οι ὅσμι
καλῶσι.

Nymphæa. CAP. CX XVI.

Nymphæa nascitur in paludibus & sta-
gnantibus aquis folijs fabae Aegyptiae, mino-
ribus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs
demersis pluribus ex radice eadem prodeuntibus:
flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente:
cum defloruerit, ut rotundum malum, aut pa-
paueris caput, extuberat: nigro semine, denso &

Nunc Ne-
nuphar.

lato

lato, lenti gustus: caulis est levis, niger, minime crassus, Aegyptiae fabae cognatus: radix nigra, scabra, clauae similis, quae autumnno secatur. Sicca cum vino pota coeliacis, dysentericisq; auxiliatur & lienem absorbet. Radix stomachi ac vesicae doloribus illinitur, vitiliginis ex aqua emendat: imposita cum pice, alopecij medetur. Eadem contra veneris insomnia bibitur: siquidem ea prorsus adimit, pota assidue aliquot diebus, genitaleq; infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphae nomen sibi vedicasse videtur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Elide, in Anygro amne, & in Baeotiae Aliar to. Est & altera nymphaea, cuius flos blephara dicitur, folijs ante dictae, radice alba, scabra, flore luteo, nitente, rosae similis. Huius semen & radix, contra foeminarum profluvia efficaciter ex vino bibuntur. Nasitur in Thessalia, amne Peneo.

Androsaces. CAP. CXXVII.

Androsaces herba est amara, tenues spargens iuncos, sine folijs, folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur: gignitur in Syriae maritimis. Ea drachmis duabus in vino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini poto, & herbae decocto: podagris utiliter illinitur.

Ceterach officinis. Asplenium. CAP. CXXVIII.

Asplenium, aliqui scolopendrium vocant, alij splenion, alij Hemionium, folijs est multis, scol

Pl. lib. 2. cap. 8.

Polopendra animalī similibus, ab radice vna pro-
 euntibus. Nascitur in parietibus, saxisq; siliceis,
 & opacis: nec caulem, nec florem, nec semen ha-
 bet. folia & filiculæ modo diuiditur, subter flauescē. *Polipodij
 a hirsutaq; superne viridia. Vim hanc habent fo-
 lia in aceto feruesfacta, vt per dies quadraginta po-
 ti, lienem absumant: quibus etiam contritis lie-
 nem ex vino illini oportet. Stranguria, & regio
 morbo prodest, singultum sedat, calculos in vesica
 comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese
 ut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente
 luna huius rei gratia effodiendam.

A N N O T A T I O.

Ruellio et Fuchsio lingua ceruina nūc
 appellata: quam alij, minus rectè for-
 asis, Phyllitida suspicantur, de qua su-
 pra Capite cii.

Hemionitis.

CAP. CXXIX.

Hemionitis, quā aliqui splenion vocāt, folijs
 hemittis dracunculi, lunæ modo incuruum: ra-
 dicibus coheret multis, tenuibus: nunquā flores, ne-
 que semen, neq; caulem gignit: in petrosis nascēs, au-
 tero sapore. Ea ex aceto pota lienem absumit.

Antyllis.

CAP. CXXX.

Antyllis duplex est: quadam enim lenti si-
 millima, folijs mollibus, rectis ramulis, pal-
 mi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur in
 calsis terris, & à sole illustratis, non insulso gu-

T

flu. Altera est folijs ramulisq; & auge similis, hirsu
 * Chamaetioribus tamē, breuioribus, & asperioribus, flore
 pit. 1. purpureo, odoris admodū grauis: radice cichorij. Po
 ta drachmis quatuor vrinae difficultati, renibusq;
 plurimum prodest. Trita, vuluae pituitas emolliūt,
 cum rosaceo, & lacte imposita, vulneribus meden
 tur. Quae autem auge similitudinē refert, prater
 alia, pota cum aceto muljo comitiales sanat.

Anthemis.

CAP. CXXXI.

Officinis **A**nthemidis genera tria, tantum flore distā
 camomilla tia: rami dodrantes, fruticosi, alis multis
 Cuius no- concavi: tenuibus foliolis, paruis, numerosis: ro
 minumva tundis capitulis: floribus in medio aureis, forin
 rietas ab secus orbiculato ambitu candidis, melinis, aut pur
 interprete pureis, magnitudine foliorum ruta: nascitur in
 ommissa est. asperis, & iuxta semitas: colligitur vere. Vim ha
 bent radices, flores & herba excalfaciendi, exte
 nuandi; potu, & in seſſione, pellunt menſtrua, par
 tus, vrinam, calculosq;: aduersus inflationes, &
 ilei tormenta bibuntur: bilem suffusam expurgāt:
 iocinerum vitia sanant: decocto earum vesicae fo
 uentur. Ex omnibus his generibus ad calculos effi
 cacissima est, quae florem purpureum habet, cuius
 amplitudo maiuscula est: hanc propriē heranthem
 on vocant. Ea cui leucanthemo nomen est, itē
 quae chrysanthemon dicitur, vehementius vrinam
 ciunt. Aegilopyis illitae medentur: commanducatae
 vlcerum eruptiones in ore, sanant. Nonnulli in
 clyst

Clysteribus ex oleo videntur, terunturq; in farinam, ad abigendos februm circuitus. Flores & folia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos digeri: radix quoq; siccari, dumq; ingruit necessitas, binæ partes herbae dari, modo floris aut radice pars vna, modo contra floris partes due & herbae vna, permutatim duplicato pondere, alternis diebus bibere autem oportet in vino mulso, diluto.

Parthenium. CAP. CXXXII.

Parthenium, aliqui amara conuocant, folijs est Vulgò *ma-
coriandri*, tenuibus: flore per ambitum albo, *tricaria*.
intus melino, odore subutroso, sapore amaro. Siccatur, cum aceto mulso aut sale potum, non secus atque epithymum, & bilem & pituitam detrahit: suspiriosis prodest & melancholicis. Herba sine flore à calculosis, & anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia vuluarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni, & collectionibus, cum flore.

ANNOTATIO.

Nō sunt sequēdi, qui *Cotulā* fœtidā vulgò dictā pro hoc obtrudūt. Nā præter q̃ quod folia illius nullā aut saltem parua cum fœniculo habeant similitudinem, flos eius nō totus luteus (quod in illo tamen requirit̃) sed per ambitū albus ac intus tantū luteus cōspicit̃: quod haud dubiè Dioscorides, si *Cotula* illa ve-

rum esset Buphthalmum, minime, ut nec in Parthenio, Narcisso & Anthemidos prima specie, silentio prætermisisset.

Buphthalmum. CAP. CXXXIII.

Buphthalmum (quidam cachlam vocant) tenues emittit cauliculos, mollesq; : folia fœniculi: luteum florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, unde nomen traxit: circa oppida nascitur, & in campestribus. Flores cum cerato tritu, tumores duritiasq; discutit. Aiunt epotam post exitum à balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

Pæonia. CAP. CXXXIII.

Pæonia siue glycyfide, Græcis aliquibus penthoron dicitur sunt qui ideos dactylos radicem pæoniæ vocant. Caulis altitudine sesquipedis adolefcit, comitibus multis stolonibus. Huius duo genera: mas, folia inglâdis habet: in fœmina verò smyrnæ more diuiditur. Summo caule siliquas emittit,

*Amygda veluti *græcas nuces: in quibus, quum dehiscunt, las intelli- multa granula rubra, acinis puniceorum similia, inueniuntur, et in medio nigra, quinque aut sex, purpurea. Radix maris [tenuis] digitali crassitudine, et palmi longitudine, gustu adstringens, alba: fœminæ radicibus ceu glâdes circiter septem aut octo inhaeret, ut in hastula regia. Fœminis à partu non purgatis sicca radix datur: ciet menses nucus græcæ magnitudine pota: sic ventris doloribus cum vino

ant

auxiliatur. Valet contra regium morbum, & renum, oc vesicæ dolores. Decocta in vino aluum sistit. Rubra grana rubenteis menses sistunt, decem vel duodecim pota in vino austero & nigro: stomachicis & erosionibus ea esse prodest: à pueris pota, initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, vulvæ strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsa, aut vino. Nascitur in altissimis montibus & præruptis.

Lithospermum. CAP. CXXXV.

Lithospermon à seminis duritia nomen accepit: folijs est oleæ longioribus, & latioribus, lium folijs. mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acutiusculi, lignosis, in quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent: folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis & aditis locis. Vim hanc habet, ut semine cum vino albo potocalculos frangat, pellatq; urinam.

Phalaris. CAP. CXXXVI.

Phalaris cauliculos emittit & culmi similes, à minutis ac nullius usus radicibus, multos, duum palmorum, geniculis cinctos, graciliores tamè ac dulces: semen candidum, oblongum, milij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut vino succus ad vesicæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen cochlearis

mensura potum, ad eadem efficax est.

Rubia.

CAP. CXXXVII.

Hodie Ru-
bia tincto-
rum.

*Η ἰσχυρό-
τατος .
νιοι ὅτι
ὀριον κα-
λῶσι.
*ὡς ἐν θα-
λάσσῃ γα-
λακίαν.

ERythrodanum * radix rubra est, qua tingū-
tur lanæ. Vna sponte provenit, altera seritur,
* ut in Thebana Gallia, et Ravenna Italia: in Ca-
ria inter oleas, ut in arvis, solo creditur. Hanc non
sine quæstu ferunt: namq; maximum ex ea sentiunt
proventum. Asperi caules & quadranguli, longi,
aparinæ non dissimiles, robustiores, & multo pro-
fus maiores: folijs per intervalla certa circū arti-
culos, stellatim decussatis. Semen eius rotundū, in-
ter initia viride, mox rubrum, postea cum ematu-
ruit, nigrū: radix tenuis, longa, rubra. Urinā ciet:
qua de causa regio morbo opitulatur, pota cū aqua
mulsa: item ischiadicis, & resolutis. Crassam copio-
samq; urinam pellit, nonnunquam & sanguinem:
bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excre-
mentorum qua redduntur differentiā spectare. Ad-
versus serpentium morsus, ramulos cum folijs vino
bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienem absu-
mit. Imposita radix trahit partus, menses, secun-
dasq;. Albæ vitiligini, illita ex aceto medetur.

Lonchitis.

CAP. CXXXVIII.

Lonchitis folia habet porri, latiora, rubentia,
plurima, ad radicem circumfracta, veluti in
terram procumbentia, pauca in caule, in quo flo-
res, ceu galericuli, hiantibus comicis personis si-
miles, nigri, & è rictu albam exerentes velut lin-
guam.

quam, quæ ad labrū inferius spectet: semen inuolucris clausum lanceæ simile, triangulū: unde sibi cognomentū arrogauit: radix clauci. Nasitur in scientibus, & asperis. Radix ex vino pota urinam ciet. Altera est lonchitis, quam aliqui asperā lonchitin dicunt: folia scolopendrii emittit, sed asperiora maioraq; ac multo magis diuisa. Vulneribus mirū in modum prodest, in eisq; inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem absumit.

Althæa.

CAP. CXXXIX.

Althæa, quam alij thiscum vocant, in sylue. Vulgò Bistrum malvarum genere est, cui folia vt malua, & cyclamino, rotunda, lanugine canescunt: flore rosaceo: bicubitali caule: radice lenta, intus alba. scus.

* Althæa appellatur, quod inter primas sit utilis, & pluribus polleat remedijs. Decocta enim in vino aut aqua mulsa, & per se cum imponitur quod medetusa, efficacis est contra vulnera: item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta sedis, inflationes, nervorum rigores: siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta, vt dictum est, adiecto suillo adipe, aut, anserino, terebinthinæve, vt malagmatis lentor fiat, facit ad vuluæ inflammationes, præclusionesque, in pectus subdita. Decoctum eodem fungitur munere: onera vuluæ, reliquiasq; à partu extrahit. decoctæ & succus ex vino potus, succurrit urinæ difficultati, calculosorum cruditati.

bus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis: dentium
mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde
ore. Viride semen siccumq; tritum, vitiliginis in
* οὐκ ὄξει. sale * perunctas emendat: eodem cum oleo &
aceto peruncti, à venenatis non feriuntur. Valet cō-
tra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluiq;
profluvium. In posca aut vino decoctum bibitur,
contra omnes vesparum, apum, similiumq; aculea-
tos ictus. Folio cum olei momento, morsibus, &
igni sambustis illinuntur. Constat aquam, trita ra-
dice addita, sub diuo addensari.

Alcea.

CAP. CXL.

Herba Si-
meois vul-
gò.

Alcea sylvestrium malvarum generi assi-
gnatur: folia habet diuisa, verbenacæ proxi-
ma: caules treis aut quatuor, cortice cannabino ve-
stitos: florē rosæ, parvū: radices albas, latas, quin-
q; aut sex, cum plurimum cubitales: quæ cū vino aut
aqua potæ, dysentericis ruptisq; medentur.

Cannabis.

CAP. CXLI.

Cannabis sativa planta magni in vita vsus
ad robustissimos fines facilitandos: folijs fra-
xini, gravi odore: caulibus proceris, inanibus:
semine rotundo, quod largiore cibo genituram
extinguit. Succus ex ea recente, conuenienter au-
rium doloribus instillatur. * Sylvestris cannabis
* Fortè eu- virgas fert althææ similes, minores, nigriores, &
patorium asperiores, cubiti altitudinem equantes: folio sa-
vulgatū. tiua, nigriore & asperiore: flore lychnidis, subru-
bro:

oro : semine & radice alihææ. Decocta radix, illi-
u inflammationes muliet, tumores discutit, tofos
articulorum dissipat. Huius cortex torquenilis fu-
bus accommodatus.

Anagyris.

CAP. CXLII.

A Nagyris * frutex est arboris instar, per-
quàm grauis odore. folijs * agni, virgisq; flo-
re brassicæ: semē in siliquis nō brenibus gignit, sub-
rotundis, firmum, versicolori facie, simile renibus,
quod durefcit vna maturefcēte. Tenera folia trita
tumores illitu reprimūt si partus hæreat, et secūda
mensesq; morentur, drachmæ pondere bibuntur in
aſſo: sic & suspiriosis dantur, & cōtra capitis do-
lores in vino. Difficulter parientibus adalligantur,
ita vt à partu statim auferantur. Radicis cortex
concoquendis discutiendisq; adhibetur. Semen com-
manducatum vomitiones vehementer ciet.

οι ὃ ἀνὰ
γυρορ. οἱ
ὃ ἀκοπορ
καλῶσι.
* viticis.

Cepæa.

CAP. CXLIII.

C Epæa portulacæ similis est, sed ingriora ha-
bet folia, & radicem tenuem. Folia in vino
pota, vrinæ stillicidio, & vesicæ scabie laboran-
tibus, opitulatur: maximè id præstat, si cum de-
cocto radicum asparagi eius, quem myacanthon, Vulgò plā-
hoc est, corrudam vocant, bibatur.

tago aqua

Alisma.

CAP. CXLIIII. tica.

A Lisma, * alij damasonion appellant. folia ei * Vox ex
plantaginis, nisi angustiora essent, * laci- Plinio ad-
uiosa, conuexaq; in terram: caule simplici, tenui, iecta.

cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido, palleſcente: radicibus tenuibus, vt veratri nigri, acris, odoratis, modicè pinguibus: aquosos amat tractus. Radix, si drachmarna aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorarunt, aut à rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hauserunt: torminibus atque dysenteriae, per se, aut cum pari modo seminis clauci, potui datur. Conuulsis, & contra vitia vuluæ prodest. Herba sistit aluum, menstrua pellit, tumores illita mitigat.

Onobrychis.

CAP. CXLV.

Onobrychis, folia habet lentis, longiora paulo: caulem dodrantalem: florem puniceum: radicem parua: nascitur in vlginosis & incultis. Herba suapte vi, si trita illinatur, tubercula dissipat: cum vino pota, strangurias sanat: illita ex oleo, sudores mouet.

Hypericum.

CAP. CXLVI.

Nostra
Perforata.

Hypericum alij androsæmon, alij corion, alij Echamæpityn appellant, quoniā semen odore resina imitatur: surculaceo frutice, dodrantali, subrubro, folio rutæ: flore luteo, qui digitis tritus sanguineum succum remittit, quæ ex causa androsæmon cognominatur: subhirsuta siliqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris: gignitur locis cultis & asperis. Vrinam ciet, menstrua pellit appositū: tertianis, quartanisq; cum vino potum liberat. Semen quad

quadraginta diebus haustum, ischiadicis mede-
r. Folia cum semine illita, ambusta sanant.

Ascyron.

CAP. CXLVII.

Ascyrum, siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosus, maiores ha-
bens ramos, surculosiores, rubentesq;: folia tenuia:
iores luteos, & fructum resinofum, hyperico nō
hsimilem: cuius attritu digiti ferē cruentantur,
ua de causa androsæmum vocauere. Vfus seminis
ad ischiadicos, potum in hydromelitis sextario nā
hiliosa recrementa amplissimē detrahit: sed assidue
lare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur
& ambustis efficaciter.

*plin. Lib. 27
cap. 5.*

A N N O T A T I O.

*Vinoso succo.] Marcellus sanguineo
vertit, qui non vt Ruellius οἰνώδης, sed
potius αἰματώδης, vtī capite de hyperico,
legisse videtur: quæ fortē lectio magis
genuina. Nā & Plinius lib. 27. cap. 4. An-
drosæmi comam tritam sanguineo suc-
co manare, tradidit.

Androsæmum.

CAP. CXLVIII.

Androsæmon ab hyperico, ascyroq; differt,
quod fruticet ramulis surculosis, ac tenui-
bus: rubentibus virgis: & folijs ruta, triplo aut
quaduplo maioribus, quæ trita & vinoso succo ma-
nant: complureis alas habet in cacumine, vtrin-
que expansas, pinnatasq;: circa quas, flores pu-
silli,

silli, lutei: & in calyculis semē papaveris nigri, in si-
gne lineis. Huius comæ trita resinosum odorē red-
dunt. Semen tritū drachmis duabus potum, biliosa
alui excrementa pellit: ischiadicis maximè medetur:
sed à purgatiōe aquā exorbere oportet. Herba am-
bustis illita modetur, vulneribus sanguinē cohibet.

Coris.

CAP. CXLIX.

Coris, quod aliqui hypericon vocant, frutex
est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac minore,
non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potum
semen menses trahit, & vrinas: contra phalan-
giorum morsus, ischiadicos, & opisthotonicos ex
vino potum auxilio est: horroribus ex pipere, sed
opisthotonicis ex oleo, aptissimè illinitur. & adix vi-
no decocta pota q; defectis opem ferre creditur: sed
laborantem inter potandum quamoptimè cooperi-
ri licet: si quidem corpus totum desudabit, ex qua
re pristinam agilitatem recuperabit.

Vulgò Iua
arthriticaἸὺ πόνου-
τος .i. sub
curua.* πικνὴ,
id est, fre-
quentibus.

Aiuga, siue chamæpitys. CAP. CL.
Aiuga herba in terra repens: & incurvæ fi-
milis: foliis semperuiui minoris, multo te-
nuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ra-
mos & densis, odore pinus: flore tenui, luteo, vel can-
dido: radice cichorij. Folia septem diebus in vino
pota, regio morbo medentur: & quadraginta die-
bus ex hydromelite, ischiadicos sanant: dantur
peculiariter vrinae difficultatibus, iocineris, &
renum vitij: torminosi profunt. Ea apud Hera-
cle

am Ponticam, perinde atque antidoto cōtra aco-
tum vtuntur, libentes decoctum. Ad antedicta
initur, cum polenta iure decocti subacta: trita in
rinam & cū fico in pilulis sumpta, aluum emol-
: excepta melle, cū aris squama & resina deij-
t: apposita ex melle, vuluæ vitia extrahit: mam-
arum duritias discutit: vulnera glutinat: vlce-
i quæ serpunt, cum melle illita, cohibet. Alterum
t genus aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ spe-
em incuruatis, prætenibus, coma supradictæ:
ore candido: semine nigro: hæc etiam pinum redo-
t. Tertia mas nominatur, paruula, folijs exili-
bus, albis, pilosis: caule aspero, candido: lu-
teis flosculis, semine iuxta alas. Resipit
& hæc pinum. Hæ duæ vim su-
perioris obtinent, sed non
vsque adeò effi-
cacem.

T^E RTII LIBRI
FINIS.

DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

*Medicinali materia,**Liber IIII.*Ioanne RVELLIO Sueßionensi
interprete.

Ribus autē libris, amantissim
Aree, tradidimus odora menta, olea
arbores, vnguenta, animalia, frum
ta, olera, radices, succos, herbas, semi
naq;. In hoc autem quarto differemus de radici
bus, & eis quæ restant herbis.

Betonica.

CAP. I.

Cestron psychotrophon vocitatur, quoniam
frigidis locis inuertiatur. Latini betonicam
appellant. Herba est, caulem ferens tenuem, cu
biti altitudine, aut maiorem, quadratum: folia
quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odora
ta, prope radicem maiora: in summis caulibus,
semen veluti satyreie spicatum inest. Decerpta
huius folia siccantur, plurimos ad vsus. Radi
cibus nititur, vt veratri, tenuibus. Quæ ex hy
dromelite in potu, pituitosam vomitionem euo
cant. Folia clari debent ruptis, conuulsis, mulieri
bus

LIBER QVARTVS. 305

vulua malo opportunis, & ad luxandos vteri
 angulatus, denarij pondere cū hydromelite: tres
 vini sextario drachma, contra serpentium mor-
 s exhibuntur. Herba magna vtilitate illatis à ser-
 pente vulneribus illinitur: aduersus etiam venena
 achma ex vino pota conuenit: præsumpta ea, si
 enenum hauriatur, nihil nocebit: vrinā ciet: aluiū
 bducit: medetur comitialibus & insanis, pota
 aqua: & iocineris lienisq; vitijs, drachma pō-
 re in aceto mulso, concoctionem adiuuat, si quis
 m fabæ magnitudine secundum cœnam cū melle
 clo deuorarit: modo consimili acida ructantibus
 opinatur. Stomachicis eam manducare & suc-
 m deuorare proderit, si postea dilutum vinum
 rbeatur. Datur sanguinem excreantibus, tribus
 solis, cum diluti vini egelidi cyatho: ischiadicis,
 num & vesicæ doloribus, ex aqua: aqua intercu-
 m binis drachmis ex hydromelite, si febricitant:
 aliter, ex mulso: regio morbo laborātes recreat,
 enses pellit, drachma pondere cum vino pota:
 uum purgant drachma quatuor pota, in hydro-
 melitis decem cyathis. facit cum melle ad tabem
 & purulentam excreationem. Folia sicca tritaq;
 stili vase reconduntur.

Britanica.

CAP. II.

Britanica aut vetonica, folia habet sylue-
 stris lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gu-
 a adstringentia: radicem tenuem & breuem:

cau

caulem paruum emittit. Folijs exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, priuatim depascentibus oris & tonsillarum ulceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Lyfimachia. CAP. III.

*Vis eius tanta
est, ut iunci
ribus discor
dantibus in
go imposita
appetentem
cohibeat.*

LYfimachia, quā aliqui lytron appellāt, caules emittit cubitales altioresve, fruticosos, tenues, prodeutibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus: flore rufo, aut aureo: gignitur in aquosis & palustribus. Foliorū succus adstringente sua vi sanguinis reiectionem supprimit, dysentericis potui datur, aut infunditur: mensium abundantia sistit, in pessa: sanguinis profusio subuenit, si nares ea herba obturentur: vulnerū cruore cohibet: acerrimū nidore suffusa reddit: quade causa serpentes fugat, & muscas interficit.

Sanguinaria, ceu polygonum.

CAP. II II.

Nūc Centinodia.

Polygonum mas ramos habet teneros & exiles, copiosos, geniculis cinctos, qui per terram, ut gramen, repunt: folia rutæ, sed molliora longioraq; semine sub omnibus folijs iurgescere: unde marem appellari volunt: flos ei candidus: aut puniceus. Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare: prodest cruenta excreationi, cholera, alui fluxionibus, & vrina stillicidio: nam vrinam apertè ciet. Cum vino potus, contra serpentium morsus

LIBER QVARTVS. 307

bus auxiliatur, daturq; in febris per horam ante
significationes: feminarum profluvia impositu
stit: idem succus purulentis auribus & instilla- πρὸς ὅ
ταλγίος.
tur. Facit eximie ad genitalium vlcera, cum vi-
no, adiecto melle, decoctus. Stomachi feruori, san-
guinis reiectionibus, vlceribus quæ serpunt, igni-
bus sacris, collectionibus, tumoribus, & recenti-
bus vulneribus folia illinuntur. Sanguinaria foemi-
na fruticat vno caule, arundini tenero, simili, den-
tis geniculis, & in se tubarum modo farctis: arti-
culos in orbem cingunt apices, foliolis piceæ simi-
les. Radicis nullus vsus: nascitur in riguis. Huic
quoq; spissandi reffrigerandiq; natura, ad eadem
valens, sed inefficacior.

Polygonatum.

CAP. V.

Polygonatum nascitur in montibus, frutice cu- Vulgò si-
gillum Sa-
lomonis.
bito altiore: folijs lauri, latioribus, & lauiori-
bus, sapore mali cotonei, aut punici, cū quadam ad-
strictione flores per singulos foliorum exortus pro-
nit, candidos, folijs numerosiores, incepta à radi-
e supputatione: radicem habet albam, mollem, len-
tam, crebro geniculatam, densam, graueolentem, di-
gitum crassitudine æquantem: quæ vulneribus effi-
caciter illinitur. Quinetiā maculas in facie delet.

Clematis.

CAP. VI.

Clematis humi serpit. lato, pinguiq; solo pro- Est quā La-
tini Vincā
uenit, viticulus spargens crassitudine iunci peruinam
xiguas: folio lauri figura & colore, multo mino-
vocant.

ra. Ea cum caulibus in vino pota, alui profluvia
 & dysenterias sedant: subdita in pessa cum lacte
 & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus vulvae meden-
 tur. Dolores dentium commanducata finit: imposi-
 ta serpentium moribus, iuuamentum praestat. Fer-
 tur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opi-
 tulari. Gignitur in terrenis. Est & altera clematis,
 Flämula quae viticulosum emittit ramulum, rube-
 Vulgò: lentum: folium gustu admodum acre, ac exulce-
 rans: repit per arbores, vt smilax. Semen tritum, pi-
 tuitam bilemque detrahit, in aqua aut hydromelite
 potum. Folia eius illita lepras purgant. Cum lepi-
 dio conditur ad cibos.

Polemonia.

CAP. VII.

Polemoniam alij philateriam, Cappadoces chi-
 liodynamin appellant, ramis exilibus, vtrinque
 pinnatis: folijs paulò quàm ruta maioribus, ac lon-
 *Polygoni gioribus, calamintha aut *sanguinariae proximis,
 quibus in summis velut corymbi dependent, nigro
 *Struthio semine: radice cubitali, albicante, & radícula simili:
 nascitur in montosis & asperis. Bibitur in vino ra-
 dix contra serpentes & dysenteriam, & ex aqua
 aduersus vrinae difficultatem, & coxendicum cru-
 ciatus. Datur ex aceto drachmae pondere lienosis.
 Eadem scorpionis plagae alligatur. Tradunt, eum,
 qui radicem gustauerit, à scorpione non feriri:
 eumque, si ictus sit, nihil molesti passurum. Dentium
 dolorem mansa mitigat.

LIBER QVARTVS.

309

ANNOTATIO.

*Flores lutei.] Ne moueare sicubi for-
tè, vt nos plerisq; locis, candidis floribus
cōspexeris: solēt em̄ pro loci varietate in
vna eademq; herba flores non rarō com-
mutari: id quod Dioscorides etiam in A-
ractylide, ac multis alijs plantis fatetur.
Symphytum, siue alas.

CAP. VIII.

Symphyton petraeon, id est, alas, nascitur in pe-
tris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus:
capitulis thymi: *sirculosum totum, odoratum, gu *Ita Plin.
tu dulce, saluam ciens: longa radice, subrufa, digi- Græcus
ali crassitudine. Decoctum in aqua mulsa & pc- φυλῶδης,
um pulmonis vitia purgat: sanguinem reicienti- id est, ligno
us, & renum malis, ex aqua datur: ad dysente- sum.
iam, rubraq; fæminarum profluvia, in vino deco-
ctum: ad conuulsa verò & rupta, ex aceto mulso
hibetur. Quin & commanducatū sitim sedat, fau-
ibus asperis subuenit, vulnera recentia enterocelas
uie conglutinat, & illitu cohibet. Carnes autē cū
symphyto decoctæ coalescunt. Est & alterū sym- Nunc Cor
hyton, quod aliqui pecton vocāt: id caulem emit- solida ma-
it bicubitale, aut maiorem, crassum, leuem, angulo ior.
um, vt sonchi inanem, circa quē breui internacan-
spatio, folia exeunt angustā, buglossa proxima,
blonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam
riato: folijs tenuibus ex alarum sinu prodeunti-

bus, in quibus & flores lutei, & circa caulem vult verbasci semina emicant. Tam caulis quam folia, aspera lanugine horrent, tactuq; pruritus concitant: radices demittuntur furis nigrae, intus candidae, viscosae: quarum est usus. Tritae & potae cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt: recentia vulnera illitae conglutinant: carnes quoq; si concoquantur, cogunt additae: inflammationibus, praesertim sedis, cum senecionis folijs, utiliter illinuntur.

Holistium.

CAP. IX.

Holistium herba est pusilla, tribus quatuorve digitis supereminens extra terram, folijs viticulisq; coronopo aut gramine proximis, gustu adstringentibus: radice alba, praetenui usq; in capillamenti specie, longitudine quatuor digitorum: nascitur in collibus terrenis. Usus eius ad rupta, in vino potae: nam & carnes coguntur, decoctionibus addita.

Stæbe.

CAP. X.

Stæbe vulgaris est notitia: cuius semen & folia stringunt: quapropter decoctum dysentericis infunditur: auribus quoque purulentis instillatur. Illita folia oculis ab ictu cruentis prosunt, & erumpentis sanguinis impetus cohibent.

Clymenum.

CAP. XI.

Clymenum caulem fert fabae, quadratum: folia plantaginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, ut in iride, & polyporum cirrhis. Probatissimum est e montibus. E frutice toto cum radice

dice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est: coeliacos, rubraque; feminarum profluvia, refrigerando infranat: sanguinem naribus erumpentem suppressit. Trita folia, aut siliquæ recentibus vulneribus impositæ, ea ad cicatricem perducunt.

Periclymenum.

CAP. XII.

Periclymenon, simplex fruticat, ex interual- *Vulgò Calis parua folia habens, ipsum amplectentia, prifoliū, et subcandida, hederacea: inter folia furculi exeunt, Matrisyl- in quibus bacca, hedere similes: flos fabæ candidus, uia. aliquantum rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum, & quod difficile euellatur: radice rotunda, crassa. Nasceitur in aruis ac sepibus, conuoluens se admuticulis, propter assidentibus. Semen eius postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatum, si drachmæ pondere detur in vino, quadragenis diebus, lienem absorbit, lassitudinem discutit: sed urinam ciet, statim à sexto die cruentam. Orthopnoæ, & singultui prodest: partū accelerat. Folia sunt eisdem viribus prædita, quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produitur: perunctis ex oleo, febrium algores abigunt.*

Tribulus.

CAP. XIII.

Tribuli genus vnum terrestre, folijs ad effigiem portulacæ, tenuioribus, viticulis in terra stratis: spinis secundum folia rigidis, præduris: iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum

genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum comam exerit, aculeos condens: folijs latis, & pediculo longo: caule parte summa, quam ima crassiori. adsunt ei & capillamenta quaedam spicacea: semen durum, ab altero non abhorrens. Vterque refrigerantis & inspissantis est natura: ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuvat. Ulcera in ore erumpentia, putredines, gingivas, tonsillasque persanant. Succus ex his colligitur, ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, illitave, ictos a vipera recreat: contra venena cum vino aptissime bibitur. Decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, virenti tribulo equos saginant, & è dulci semine & esculento panem, quo vescuntur, faciunt.

Limonium. CAP. XIII.

Limonium, folia habet beta, tenuiora & longiora, decem, saepe plura: caulem tenuem, rectum, lilio aequalem, seminibus rubris scatentem, quae gustata adstringunt. Semen tritum, & ex vino acetabuli mensura potum, dysentericis coeliacisque prodest: rubra foeminarum profluvia sistit. Nascitur in pratis & palustribus.

Lagopus. CAP. XV.

Lagopus herba sistit aluum in vino pota: aut in febris, ex aqua. Eadem inguini alligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus.

Med

MEdion in saxis & opacis nascitur: folia habet & iridis: caulem tricubitalem, & in eo *Alij ferunt florem grandem, purpureum, rotundum semine cui dis. ci, minuto: radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quae trita in farina. & ex melle decocta, rubros menses feminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in vino potus, menstrua pellit.

Epimedium. CAP. XVII.

EPimedium, caulis est non magnus, hederæ folijs, denis atq; duodenis, neq; florem, neq; fructum ferens: radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo: nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mammas increocere non sinunt. Radix conceptum adimit. Folia trita quinis drachmis, post menstruas purgationes, quinque diebus in vino pota, præstant mulieribus ne concipiant.

Gladiolus. CAP. XVIII.

XYphion, alij phasganon, alij macharonion, Romani gladiolum, vocant: nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius videretur, & gladij modo mucronatum, nervosumq;. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem ligati, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, una pusillorum bulborum modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis est, si-

perna vberior: nascitur in aruis. Superior cū thure illita, admisto vino, spicula & aculeos è corpore extrahit: panos cum lolij farina & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris inferi solet. Menses imposita trahit. Superiore radice ex vino pota, venerē stimulari, & inferiore sumpta sterilescere tradunt. Superiorem quoq; utiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dare præcipiunt.

Sparganium. CAP. XIX.

Sparganion, aliqui xiphidion vocant: folia habet gladioli, sed arctiora, & in terram magis procumbentia: in summo caule veluti pilulae prominent, in quibus semen. Contra serpentis venena, radix cum vino datur.

Xyris. CAP. XX.

XYris, folia habet iridis, latiora, & in cacumine mucronata: quorū medio caulis erumpit, satis crassus, cubitalis, ex quo siliquae triangulares dependunt: in quibus purpureus flos, in medio puniceus semē in folliculis, simile fabis, rotundū, rubrū, acre. radix longa, geniculata, rufa. Contra capitis vulnera, fractaq; efficax est: aculeos & spicula omnia citra molestiā extrahit, adiecta floris aris tertia parte, et radices cetaurij ac mellis quinta: tumoribus et collationibus illita cū aceto medetur. Radix ex passō bibitur, ad cōuulsa, rupta, coxendicū dolores, strangurias et alui profluvia. Semē tribus obolis potū, vrinā vehementius impellit: & cū aceto, lienē absumit.

And

ANchusa, quæ alio nomine calys, aut onocleia appellatur, folia, habet lactucæ in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoquoersum humi sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ æstate prouenit, ac manus inficit sanguineo colore: leto sole nascitur. Radix adstringit: ad ambusta & vetera vlcera, ex oleo & cera efficax est: igni sacro cum polëta medetur: lepris & vitiliginibus illinitur ex aceto: partus extrahit, vuluæ indita. Eius decoctum remouit ijs, lieni, & bile suffusis datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Sistunt aliu folia in vino pota. Radice pigmentarij vtuntur ad vnguentorū spissamenta. Est & altera, quam aliqui alcibiadion, aut onochiles appellant. Hæc à priore distat, quòd minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles, in quibus flos purpureus in puniceū vergens conspicitur: radices rubræ, prælongæ, qua menses sanguinem succum fundunt: in sabulosis nascitur. Vis ei folijsq; inest, quæ contra virus cum reliquorum serpentium, tum maxime viperarū, auxilietur, siue cibo, siue potu, siue alligatu: nam si quisquam mandēs, in serpentis os inspuat, eum necabit. Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum hyssopo & nasturtio pota, latas ventris tineas excutit.

*Plinio
no. i. i. i.
lib. xvij.
cap. v.*

Lycopsis, quæ & anchusa à nonnullis vocatur, foliis lactucæ, longioribus, asperioribus, latioribusq; crassis, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis, multis, cubitalibus: flore in iis paruo purpurascēte: radice rula, & adstringente: nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita, vulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris: sudores peruncta movet, adiecto oleo.

Echium.

CAP. XXIII.

Vulgò lingua hircina.

Echion, folia habet prælonga, aspera, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minora tamen, subrubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutaq; vitroque latere folia, expansa, pinnataq; nigra, in summo caule breviora: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti viperarum similia insunt: radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modò à serpentibus ex vino prodest, sed eos qui antea biberint, feriri non patitur. Folia & semen idem præstant munus. Lumborum dolores sedat, in vino aut sorbitione sumpta, & lac extrahit.

Ocimastrum.

CAP. XXIII.

Ocimoides, Latini ocimastrum vocant, folia fert ocimi, & ramos dodrantaes, hirsutos: *Melanthij siliquas hyoscyamo similes, semine, ut *gith, nigro prægnantes. Vim habet semen in vino potum, qua

ma viperarum ceterarumq; serpentium morsibus
medeatur. Datur ischiadicis cum melle, vino, myr-
ra, et pipere. Radice nititur tenui & supernacua.

Erinus.

CAP. XXV.

Erinus nascitur apud fontes & fluuios, folijs
ocymi, sed minoribus, parte superna diuisis,
lodrantalibus surculis quinis senisve, flore candi-
do: semine nigro paruo & acerbo: folia & caules
lacteio succo turgent. Semen drachmis duabus, in * Sic Plin.
quatuor mellis cyathis, oblitum oculorum fluxio- In graco
nes cohibet. Succus cum sulphure & nitro instilla simplici-
us, aurium dolores sedat. ter, Suc-

Gramen.

CAP. XXVI. co.

Gramen geniculatis serpit ramulis, à quibus
radices spargit dulces, articulis præcinctas:
folia acuminata, dura, et, vt arundinis parua, lata,
exilitate fastigiantur, eaq; iumenta & boues pa-
scunt. Trita radix illitu vulnera cõglutinat. Deco-
tum eius in potu, torminibus medetur, & vrinae
difficultatibus: calculosa etiã v sica excremẽta com-
minuit. Est & arundinaceũ gramen, priore mul-
tò maius, quo iumenta necare traditur, praesertim
in Babylone id quod iuxta vias nascitur. Quod in
urnaso mote gignitur, densius fruticat: folijs hede-
raceis: flore odorato, cãdido: semine paruo, nõ inuti-
li: radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine,
induratis, mollibus, robustis, ac dulcibus. Succus si
vino cum melle pari, & myrrhae dimidio deco-
quat

quatur, adijcianturq; piperis & thuris tertiæ portiones, probatissimū erit oculorū medicamentum: id in area pyxide recōditur. Decoētū radicis idem, quod herba, præstat. Semen vehementius vrinam impellit, aluum vomitionesq; sistit. Natum in Cilicia gramen, quod incolæ cinnam appellant, boues inflammat, si eo virenti sepe pascantur.

Sideritis.

CAP. XXVII.

Nunc her- **S**ideritim aliqui heracleam vocant: folia habet
ba Indai- **S**marrubij, sed longiora, satis ad frondem quæ-
ca, & Te- cus aut saluæ accedentia, minora tamen, & aspe-
trahl. ra: canles ædit quadratos, dodrantem altos, ac quan-
doq; etiam maiores, non iniucundi gustus, aliquan-
tumq; substringentis: in quibus per interstitia or-
biculata vertebra, vt in marrubio, spectantur, &
semen in eis nigrum: nascitur in petrosis. Illita fo-
lia, suapte vi, vulnera sine inflammationis pericu-
lo iungunt. Altera sideritis binūm cubitorum rama-
lis, exilibus: folio filicis, numeroso, vtrinq; per oras
diuiso: pediculo longo, prodeuntibus è summo ala-
rum sinu surculis, longis, tenuibus: capitulo in cacu-
mine orbiculato, aspero, in quo semen continetur,
quàm betæ rotundius aliquanto, ac durius. Huius
vis, foliorumq; ad vulnera, præcipua est. Sideritim
aliā esse trahunt, quam Crateuas heracleam vo-
cat, in macerijis, & vineis nascentem, folijs ab vna
radice multis, coriandro similibus, circa coliculos
dodrantales, teneros, læues, subcandidos atque
subr

subrubicundos: flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lento. Huius ea vis est, vt quamuis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimat.

Achillea. CAP. XXVIII.

Achillea, quibusdā Achillea sideritis, dodrantales aut maiores gerit scapos, fusorū effigie, minutulis folijs circundatos, ex obliquo crebras haerentibus incisuras sectionibus, coriandro similibus, subfuluo colore lentis, odore multo, non insuauis, rerum medicato: umbella in cacumine rotunda, floribus candidis [purpureis] & aurum emulantibus: prouenit lato solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur: erummentem sanguinem inhihet, & cruenta vuluæ profluvia, in vellere. Decocto quoq; insident feminae fluxione vuluæ laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

Rubus. CAP. XXIX.

Rubus, notitiæ vulgaris. Vim habet siccandi, & adstringendi: capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum sistit, & fœminarū profluvia: præteris morsui accommodatissimum. Gingiuas firmant, & oris vitij folia cōmanducata mententur, cohibentq; illita, vlcera quæ serpūt. Vlceribus in capite manantibus, oculisq; procidētibus remedio sunt, & condylomatis, & hæmorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caules cum folijs unduntur, exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singul

singulari remedio, contra omnia quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascentis, quamoptimè maturi succus, ad oris medicamenta conuenit: sistitur aluus præmaturi cibo, necnon flore in vino poto.

Rubus Idæus. CAP. XXX.

Idæus rubus appellatus est, quoniam copiosus in Ida prouenit. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens: quanquam & sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat, quæ supradictus. Cæterum flos cum melle oculorum collectionibus commodissimè illinitur, & ignem sacrum extinguit: stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

Helxine. CAP. XXXI.

Helxine cognomento cissampelos, folijs est herbaræ, minoribus ramulis exilibus, quibus cōplectitur quodcunq; contigerit adminiculum. Nasceitur in sepibus, uinetis, & segetibus. Foliorū succus potu deiecit aluum

Elatine. CAP. XXXII.

Elatine folia habet helxinæ, minora, rotundiora, pilosa: tenuibus & dodrantalibus ramulis, quinque sentisve, à radice foliosis, gustu adstringentibus. Nasceitur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis, & impositis. Eadem cocta sorbitionibus usu dysenteriam sistit.

Eupatorium. CAP. XXXIII.

Eup

LIBER QVARTVS.

327

Eupatorium, fruticosa herba est, vnicum effe-
rens caulem, lignosum, nigricantem, rectum,
inuem, hirsutum, cubitalem, interdum amplio-
rem: folijs per intervalla quinquefolijs, aut canna-
is pctius similibus, quinquepartito aut amplius
diuisis, nigricantibus, & ipsis per ambitum ferra-
tis: semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum
declans, quod siccatum vestibus inhaeret. Contri-
tū huius folia, & cum suillo adipe imposita, vlceri-
bus quæ agrè cicatricem trahunt, medentur. Her-
ba & semen in vino potum, dysenteria, iocineris
itijis, & serpentium ictibus, liberat. Nec qui aber-
rantes Argemonem hanc appellarint, cum tamen
ingè alia sit, vti exposuimus.

Est Offici-
narū Agri-
monia: ea-
rū aut Eu-
patorium
fortè Can-
nabis syl-
uestris, de
qua præce-
dētī libro.

* Græcus
Artemisiā
habet: sed
esse, vt nūc
vides, ar-
gemonē le-
gēdum, ex
anemome
(de qua li-
bro ij.) nō
obscure co-
gnosceas.

Quinquefolium. CAP. XXXIIII.

Quinquefolium ramulos fert festuicarū simi-
litudine, tenues, dodrātales, in quibus semē:
lia menthae, quina singulis pediculis, rarò plura,
ambitu serrata: florē ex candido pallecentē, auri-
colū. Nasctur in riguis, & aquarijs ductibus.
Subrubram habet radicem, oblongam, veratiro ni-
ro crassiorē. Plurimis pollet remedijs. Ius radicis
coctæ ad tertias, si in ore contineatur, dentiū do-
res sedat: putrida oris vlcera, collutione sistit: ar-
trie scabritias, gargarizatu lenigat: contra alui
profluvia, & dysenterias auxiliatur: item articu-
rum coxendicumq; cruciatibus potum. Coctā in

ace

aceto, & illita, serpentia vlcera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus & collectiones, discutit: ignes sacros, reduuias, condylomata, pforasq; sanat. Teneræ radicis succus, contra iocineris, pulmonumq; vitia prodest: itē aduersum venena. Cum hydromelite autē, vel diluto vino, & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternum ramulorū: in tertiana verò, ternum: in quotidiana, vnius. Ea quoq; folia, tricenis pota diebus, comitialibus prosunt. Foliorū succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrimè regio morbo medetur. Illita cum melle & sale, tam vulneribus quàm fistulis remedio sunt: enterocelicis auxilium præstant. Quinquefolium sanguinis profluvia & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

A N N O T A T I O.

*Spicam lolio similem.] Non obscure hinc elicitur Loliū spica esse insignitū, ac proinde explodendam eorum sententiam, qui Nigellam vulgò cognominatam, cuius in segetibus ubiq; tam vber prouentus, id esse statuunt. Ea siquidem non spicam, sed purpureū florē emittit.

Phœnix.

CAP. XXXV.

PHœnix folia habet hordei, sed breviora, & angustiora, *spicam lolio similem: calamos digitorum senum, radici aduolutos: septenas octonasve

ve spicas. In aruis tectisq; recenter illitis nasci-
 Harum virium compos, vt in vino austero po-
 alui profluuium, & emanantem vulua sangui-
 sistat, vrinae impetus infrænet. Sunt qui adal-
 itam in puniceo vellere & suspensam, sangui-
 n suppressere prodant.

Idæa radix.

CAP. XXXVI.

Dæa radici folia sunt ea quæ rusco: circum ea
 veluti exigui capreoli sunt, in quibus flos. Ra-
 c spissandi naturam habet, his conueniens qui-
 adstructione opus est. Pota, citam aluum, men-
 q; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Rhodia radix.

CAP. XXXVII.

Ignitur Rhodia radix in Macedonia, cost-
 similis, leuior, inæqualilis: quæ cōtrita rosas
 dolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta
 onti & tēporibus cum rosacei momēto imponat.

Equisetum.

CAP. XXXVIII.

Equisetum in riguis & scrobibus nascitur: Vulgò Cau-
 cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se da equina.
 rcti, rubescentes, leniter scabri, duri, & iuncea
 ca eos folia, crebra, exilia. In sublime attolli-
 r, vicinos arborum caudices scandens, obuolu-
 m q; dependet, comis multis, nigris, vt equorum
 uida: radix lignosa, dura. Vis herbæ spissare:
 are sanguinem naribus erumpentem succus
 se sistit: prodest dysentericis in vino potus: vri-
 um cit. Sanguinolenta vulnera glutinantur, tri-

ris folijs, & illitis. Radix cum sua herba tussim
orthopneam, ruptaq; adiuvat. Folijs in aqua po-
tis, dissectiones vesicae & intestinorum, enterocela
in vnum coalescere, cogiq; feruntur. Alterum equi-
setum caulis est rectus, equalis, cubito maior, in-
anis: comis per intervalla brevioribus, candidiori-
bus, & mollioribus. Id cum aceto tritum vulneri-
bus remedio est, eademq; fungitur facultate.

Coccum infectorium. CAP. XXXIX

Coccum, quo infectores vituntur, frutex est sur-
culosus, parvus, cui grana seu lentes adherent
quae electa coegeruntur. Optimū gignitur in Gala-
tia, & Armenia, deinde Asia, & Cilicia: ultimum
ex omnibus Hispanicum. Vis huic spissandi: vulne-
ribus, nervisq; praecisis, convenienter ex aceto tritum
illinitur. Nascitur quoque in Cilicia, è querculus
cochlearum exilium similitudine, quod illius regio-
nis mulieres ore legunt, & coccum vocitant.

Tragium.

CAP. XL.

Tragium nascitur in Creta tantum insula,
*Ita Plin. lentisco semine, folio, & ramis simile, singu-
Gracus co lis tamen minoribus, * succus ei lacteus: gummi-
dex simpli non dissimilis. Semen, folia, lacrymaq; illitu spi-
citer, suc- cula è corpore eiciunt: omnia quoque corpori im-
cus. pacta, euocant: pota stranguriae medentur, calcu-
los vesicae frangunt, menses trahunt. Modus in sum-
ptione est, drachma vna. Fama est sylvestres ca-
pras sagittis confossas, eius herbae pabulo spicula

excis

LIBER QVARTVS. 325

excutere. Est & alterum tragium, quod tragor-
ros aliqui vocant, folia scolopendry habet, & ra-
cem sylvestris raphani, tenuem, candidā: quam
udam vel coctā esse dysentericis prodest. Folia Nominis
utumno, hirci virus olent: exinde sibi tragū nomē causa-
doptauit. Provenit in montibus, & præcipitijs.

Tragum.

CAP. XLI.

Est etiam herba tragos, quam aliqui scorpion
aut traganon vocant: maximè in maritimis
ascens, palmum alta, aut amplior, fruticosa, hu-
nilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos aci-
is, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacu-
mine, gustu multum adstringente. Racemorum
cini decem ex vino poti, celiacis, & feminis flu-
ione vuluæ laborantibus, auxiliatur. Tunduntur
plerisque, & in pastillos digesti asseruantur, qui
us vtuntur cum opus est.

Iuncus.

CAP. XLII.

Vinci duo genera: vnum lauis nominati, alte-
rum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cu-
us etiam duo assignantur genera: vnum sterile,
eliquum fert semen nigrum, rotundum, & cras-
sior constat calamo, carnosioreq;. Tertius est iun-
us, qui vocatur oloschenos, prioribus carnosior,
superiorq;, is similem suprascripto fructum in ca-
umine parit. Semen vtriusque totum, ex diluto
vino potum, sistit aluum, & rubra feminarum
profluvia: vrinam cit, capitisque dolores facit.

X 2

Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur, aduersus phalangiorum morsum Aethiopici iunci semine somnus allicitur: sed mēdus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

Lichen.

CAP. XLIII.

Officinis
Hepatica.

Lichen, qui saxis est familiaris, aliquibus bryonibus appellatur, aspergionosis petris adhæret, muscus. Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Iuuat regimorbo correptos, cum melle illitus: oris & linguæ defluxiones inhibet.

Paronychia.

CAP. XLIII.

Paronychia exiguus frutex, in petris nascens peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita paronychijs atque duritijs, remedio est.

Chrysocome.

CAP. XLV.

Chrysocome palmi altitudine fruticat: compositæ specie corymborū, hyssopo simili: rationale hirsuta, veratri nigri modo, tenui, cyperum æquantem: gustu non iniucundo, ex dulci austero: in petrosi opacisq; nascitur. Radix exalfacit, & adstringit: his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammatio male habet: contra purgationes vultus, decocta cum hydromelite assumitur.

Chrysogonum.

CAP. XLVI.

Chrysogonum densè fruticat, quernis folijs flore coronarij verbasci: radix ut rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ tri-

cum aceto, atq; imposita, muris aranei morfi-
s auxiliatur.

Elichrysium. CAP. XLVII.

Elichrysion quidā chrysanthemon, nonnulli & Alij Helio
did amaranton vocant, quo deoris simulacra chrysion.
ronāt: ramulū habet candidū, virentē, rectū, fir- Officinis
um folia intercedētibus spatijs angustā, abroto- Sthæchas
similia: comā aureā lucis in orbe, umbella rectū- citrina.
i veluti siccis corymbis dependētibus, radice tenui:
ascitur in asperis, & torrentiū alueis. Contra ser
entū ictus, coxendicū dolores, urinae stillicidia, ru-
taq; coma ē vino pota opitulatur: ciet menses. San
uinem cōcretū ventris ac vesicæ absūmit, pota cum
ulso: ieiunis, trium obolorum pondere, sistit de-
illationes, data in vino albo diluto: vestibis inse-
tur, vt eas ab erodentium iniurijs tueatur.

Chrysanthemum. CAP. XLVIII.

Chrysanthemon aut caltha, nonnullis buph-
thabnos: herba est tenera, fruticosa, laues
roferens caules, & multifida folia: flores supra
nodum splendentes, luteos orbem oculi imitantes,
nde bupththalmi nomen traxit: propter oppida
ascitur. Cuius caules oleris vicē manduntur. Fio-
es cum cerato triti, steatomata discutere produn-
ur: regio morbo correptis, colorē breui reddunt, si
quente longo balnei vsu, post exitum ebibantur.

Ageratum. CAP. XLIX.

Ageraton fruticosa herba est, palmari longi-

tudine assurgens, simplex, humilis, origano maximè similis: umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissimè flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruens: huius vstæ odor urinam cit, & vuluæ duritias emollit.

Verbenaca.

CAP. I.

Peristerion, siue verbenaca nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse videt, quod colubæ circa hæc perquam libet versari soleant. Dodratis altitudine, et interdum amplius adolefcit: folia è caule prodeunt incisa, & subalbida: ea singulari ramo, radiceq; sola, costare sæpius inuenitur. Folia cum suilla adipe recenti, aut rosaceo imposita, vuluarum dolores finire putantur: ignem sacrum illita ex aceto repri-munt: putrida vlcera cohibent: vulnera glutinant: veteraq; ex melle, ad cicatricem perducunt.

Sacra herba.

CAP. LI.

Sacra herba, quæ & peristereon nominatur, ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex internallis folia quercus, sed minora angustioraq; eisdem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus castio: radix longa, tenuis: flores purpurei, graciles. Folia cum radice in vino pota, illitave, aduersus serpentes pollent, eadem drachmæ pondere cum thuris obolis tribus in vino veteris hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra regium morbum libuntur: veteres tumores & inflam

inflammationes mitigant: sordida vlcera purgant:
 ta in vino decocta, tonsillarū crustas abrumpit:
 s nomas gargariZatu cohibet. Aiūt, si aqua spar
 tur triclinium, qua maduerit, letiores conuictus
 ri. Datur potandum in tertianis febris, tertius
 terra geniculum, cum folijs circundantibus: quar
 nis, quartum. Sacram vocant herbam, quoniam
 ultum ad amuleta, expiationesq; commendetur.

Astragalus.

CAP. LII.

Astragalus, parvus à terra frutex, folijs &
 ramis ciceri similis: flore purpureo, paruo: ra
 ce rotunda, raphani modo grandi, quæ adnatas
 pendices firmas habet, ingras, præduras, veluti
 cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. na
 tur in ventosis, opacis, & in nivalibus: ea Mem
 bis Arcadia scatet. Alium sistit radix in vino po
 ti: vrinam mouet: vetustis vlceribus, sicca effi
 ciciter inspargitur: sanguinem supprimit: egrè
 propter duritiam tunditur.

Hyacinthus.

CAP. LIII.

HYacinthus folia habet bulbi: dodrantalem
 caulem, læuē, minimo digito tenuiorem, her
 acci coloris: comam procumbentem, florem pur
 pureorum plenam, incuruam: radicem quoq; bul
 baceam. Quæ, vt creditur, pueris cum vino albo
 llita, pubertatem coërcet, & non patitur erum
 pere: sistit alium pota & vrinam impellit, pha
 ngiorumq; moribus auxiliatur. Semē adstrin

gentius est, theriacis expetitur: regium morbum emendat, cum vino potum.

Papauer erraticum. CAP. LIIII

Papauer erraticum, quod rhœada vocant, ver-
quidē in aruis cum hordeo nascitur, flore pro-
tinus deciduo, unde & nomen apud Græcos acce-
pit. * Locum **Folia** erucae, aut origano, aut cichorio, au-
deprauatū thymo similia spectantur: sed longiora, diuisa, sca-
esse mani- bra: iunceus ei caulis, rectus, culitalis, asper: flos sy-
festō appa- uēstris anemones, puniceus, interdū albus: oblongi-
ret. Sunt caput, sed quā anemones minus: semē rufum: ra-
cum her- dix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine,
bæ, quas gustu amara. Huius capita quinque aut sex, in vi-
hic cōme, ni cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis,
morat Dio- quibus somnus accersendus est. Semina acetabuli
scorides, mensura ex aqua mulsā pota, aluum leniter emol-
diuersa pla- liunt: ad idem præstandum mellitis placentulis, &
nē facie, liunt: ad idem præstandum mellitis placentulis, &
vt vni ei- dulciarijs libis admiscetur. Folia cum calycibus il-
demq; re- lita, inflammationes sanant: eorūdem fotu & per-
ctē compa- fusione, somnus allicitur.

quam pos-
sint: quo-
modo au-
tem instau-
randus, pe-
ritioribus
cogitandū
relinqui-
mus.

Papauer satium. CAP. LV.

Esatiui papaueris genere, quod hortense est, se-
men in panem densatur, qui sanis inusu sit: eo
etiam ex melle pro sesama vtuntur: thylacitin vo-
cant. Capitulum habet longum, & semen candi-
dum. Syluestre verò, caput insidens demissumq;
& nigrum semen, quod pithitis nominatur: non-
nullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniā eius
sca

capo lacteus succus emanat. Tertium magis sylue-
 re, & ad medicinas valentius, multo his longius,
 productiore capitulo. Omnium in commune na-
 tura refrigeratrix: quare si capita ipsa & folia de-
 coquantur in aqua, somnum fotu conciliabunt. Bi-
 bitur decoctum contra vigilias. Calyces cum po-
 menta triti, et cataplasmatibus admisti, ignibus sacris,
 & inflammationibus prosunt. Tunduntur quoque
 virides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad
 usum reconduntur. Capita quoque per se in aqua co-
 quuntur ad dimidias, iterumq; adiecto melle, dum
 humor, coeat in eclegmatis lentore. Id medicamentum
 in tussi, arteriae fluxionibus, & celiacorum affe-
 ctu, doloris leuamentum praebet. Efficacius tamen
 redditur, addito hypocistidis succo & acacia. Pa-
 paueris nigri semen tritum cum vino bibitur, con-
 tra citam aluum, & foeminarum profluvia: in per-
 uigilijs fronti temporibusq; illinitur, ex aqua.
 Opium eius magis refrigerat, inspissat, siccataq; sum-
 ptum erui magnitudine, dolorem finit, concoquit,
 & somnum allicit: tussi, atque celiacorum valetu-
 dini auxiliatur: verum si copiosius hauriatur, no-
 cet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad dolores
 capitis cum rosaceo perfusum efficax est: aurium
 dolori, cum amygdalino, myrrha, & croco in-
 stillatur: inflammationibus oculorum cum torrea-
 factio oui luteo proficit: igni sacro & vulneribus,
 cum aceto: podagris, cum lacte mulieris & cro-

co: somnum accersit, subditū sedi pro balano. *Opti-*
um mum habetur graue, & densum, gustu amarum,
 quood opti odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur,
 mum. laue, candidū, neq; asperum, neq; grumosum, quod
 inter colandum non vt cera coeat, & in sole dis-
 fundatur: dein admotū lucernis, nō atra luceat flā-
 ma: extinctū deniq; odoris vim conseruet. Sed opion
 glaucio, gummi, aut syluestris lactuca succo, adul-
 terant. Verum glaucio fucatū, in dilutione croci co-
 lorem reddit: lactucaceo succo fictum, exiliter spi-
 rat, & asperius spectatur: gummi vitiatum, sple-
 descit, & infirmum est. Nec desunt qui eō demen-
 tia deuenerint, vt adipem & admiscerent. Fictili
 nouo torretur ad oculorū medicamenta, dum mol-
 lius, atque rufius appareat. Diagoras, vt Erasistra-
 tus author est, vsum eius damnauit, oculorum lip-
 pitudinibus & aurium vitij infundi vetans, quo-
 niam visus aciem hebetaret, & soporem gigneret.
 Addidit Andreas, illitos eo protinus excacari, si nō
 adulteraretur. Mnedesimus vsum duntaxat olfa-
 ctandi probauit, quoniam ad conciliandum so-
 mnum conueniret, alioqui nobis vt noxio interdi-
 cit. Quae commentitia esse, experimento deprehen-
 duntur: siquidem effectus, virium huiusce medi-
 camenti, fidem faciunt. quare non alienum fue-
 rit scriptis mandare, quonā modo is excipiatur suc-
 cus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & prae-
 lo exprimunt, terentēque in mortario, digerunt

pastillos: id meconium vocatur, multum opio-
gnatius. Porro opij faciundi ratio hæc est: Cum *Opij colli-*
os in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne *gēdi ratio.*
entus adigatur, ex obliquo in rectum summam
utem incidere oportet, lacrymam exeuntem, digito
z concham abstergere: nec multo post redire, vt
öcreta inueniatur: etenim quæ tū, aut postero die
tiam offenditur, in vetere pila teri debet, & in pa-
lillos cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum
st, ne vestibus succus deradatur.

Corniculatum papauer. CAP. LVI.

Papauer ceratites, id est, corniculatum, folia *Vulgò pa-*
habet candida, hirsuta, verbasco similia in *pauer cor-*
ambitu syluestris papaueris more serrata: cau- *nutum.*
le non dissimili: flore pallido: calyculo fœnigræ-
ci, in corniculorum modum inflexo, vnde nomen
mutuatur: semine papaueris, pusillo, nigroq;: ra-
dice per summa cespitum, nigra, crassa: nascitur
in maritimis & asperis. Radici ea vis inest, vt in
aqua decocta ad dimidias, coxendicum & iocine-
ris affectus, potu sanet: prodest his qui crassa
quædam, aspera, aut araneosa cum lotio reddunt.
Aluum leniter purgat semen, acetabulo in aqua
mulsa potu. Crustas emarginant, illita ex oleo fo-
lia floresq; , & argema ac nubeculas in mentoria
perunctas, abstergunt. Sunt qui glaucium, hoc pa-
paueris genere faciliari existimarunt, falsi qua-
dam foliorum cognatione.

Spu-

Spumeum papauer. CAP. LVII.

Aliud papaueris genus, aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab alijs heracleum, caule do-

*Stru- thio. drantali: folijs admodum paruis, * radiculæ simi

*Sic ex libus: fructu inter ea candido. Nam herbula alba Theophras est, & spumea tota: * radice in summo cæspite. flo. Vide- Legitur æstate semen, cum integrè adoleuit, decitur enim ditq; exiccatum. Datum acetabuli mēsurā in aqua locus in mulsa, vomitione expurgat: priuatim huiusmodi græco Dio purgatio, comitialibus prodest.

scoridis co
dice corru
ptus.

Hypecoum.

CAP. LVIII.

Hypecoon, aliqui hypopheon vocant: nascitur in segetibus aruiq; folijs rutæ, exilibus ramis. Natura eadem, quæ papaueris succo.

Apollinaris, siue hyoscyamus.

Nunc Ius-
quiamus.

CAP. LIX.

Hioscyamus, frutex est caules emittēs crassos: folia lata, oblōga, diuisa, nigra, hirsuta: flores è latere caulis, ordine prodeūt, tāquā puniceorū cytini, scutulis septi seminū plenis, vt papaueris. Tres eius differētiæ: Vna semine nigro, floribus penè purpureis, similaceis folijs, cytiniis præduris, & spinosis. Alterius semē subflauū, vt irionis: flores lutei: folia, et siliquæ simpliciores. Ambo insaniā gignūt, & soporē, ideo in cōmuni vsu dānantur. Tertiū genus, vt quod mitissimū esset, medici recepere: pingue, lamuginosum, molle, cādidi flores seminisq; in maritimis rudibusq; nascens. Cuius occasio si nō adsit,

fum vſurpari oportet: niger, vt deterrimus, im-
 probatur. Recenti ſemine, caulibus folijsq; tuſis, ſuc-
 cis in ſole exprimitur, et exiccato humore, vſus ad
 unum vſq; prorogatur: nam facile corruptionem
 patitur. Extrahitur etiã ex ſicco ſemine ſeparatim
 aqua calida tuſo, & expreſſo. Liquamentũ autẽ
 ſicco lacteo præſtantius eſt, & magis dolores finit.
 Contuſa herba recens, addita trimeſtri farina, di-
 eritur in paſtillos, & reconditur. Liquamentum
 rimum, & quod à ſicco ſemine exemptũ eſt, colly-
 ijs, quæ doloris ſenſum auferunt, cõmodiſſimẽ in-
 ri ſolent: cõtra acutas calidasq; fluxiones, dolores
 urium, atq; vuluæ mala, proſunt: cum farina au-
 em aut polento, oculorum, pedũ, cæterarumq; par-
 ium inflãmationes placant. Semen eadem præbet:
 uſſi, deſtillationibus, oculorum fluxioni, & dolo-
 ribus, efficax: contra menſium abundantiam, &
 rumpentem aliunde ſanguinẽ, oboli pondere cũ pa-
 ueris ſemine, & aqua mulſa, bibitur: podagris
 iubenit: teſtibus inflatis, mãmĩs q; tumẽtibus à par-
 uis, tritum ex vino illinitur. Alijs quoq; cataplaſma
 is, quæ doloris leuamentũ præſtant, admifceri ſo-
 let. Folia omnibus medicamentis dolorem ſedanti-
 bus, per ſeſe, et ex polenta, vtiliſſimẽ imponũtur: re-
 centia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinũ-
 tur: cum vino terna, quaternãve pota, ſanant al-
 gidas febres, quas epialos vocant. Cocta olerum
 modo folia, ſi acetabuli menſura manduntur, me-
 dia

diocrem insaniam gignunt: idem efficere tradunt, si colo vlcus sentiente, infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluvantur.

Psyllium.

CAP LX.

Psyllion folijs coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus: sarmentosa fieni modo, in totum herbula: ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusve cōvolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicū simili: unde & nomen: & in aruis & incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandū, inspissandū, & molliendū conueniens: articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, vulsis, illitum auxiliatur: imponitur in dolore capitis: cum rosaceo, aqua, aut aceto: enterocelis infantiū, & prominenti vmbilico, illitū ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aqua sextario madefactum, vbi cōcreuit aqua, illinitur: siquidem vehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum calorem reprimat. Cōtra ignes sacros efficax est. Fama est, si virens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum, sordida vlcera, & quæ cacoëthe vocantur, expurgat. Succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.

Hortense solanum.

CAP LXI.

Hodie solanum
trum corrupte.

Hortense solanum, frutex cibus idoneus, pusillus, multis concavus alis: folio nigro, maiore quàm ocimi, & latiore: fructu rotundo, viridi,

di, qui post maturitatē nigricat, aut fuluescit: herba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi: quare folia vlceribus quæ serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline polentæ illinuntur: ægilopia, capitisq; dolores, trita & imposita per se sanant: æstuantī stomacho auxiliantur: parotidas, cum sale detrita, illitu discutunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum atque vlcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spuma: ad ægilopas cum pane: infantium adustioni, quam syriasin vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in collyrijs, aquæ vel oui vicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus: aurium dolori instillatus prodest. Mensium abundantiam sistit, in vellere subditus. Succus fuluo gallinarum cortaliū fimo subactus, & luteo appositus, ægilopijs præsentaneo est remedio. Est & aliud solanum, quod peculiari nomine halicacabon aut physalida, id est vesicariam vocant, folijs antedicto similibus, verum latioribus: cuius caules, posteaquam adoleuerūt, pro na terram spectant: folliculis orbiculatis vesiculis similibus: semine intus fuluo, rotundo, læui acinorum vuae effigie: quo coronarij vtuntur, corollis intorquentes. Vim vsumq; hortensis solani habet: verum cibus nequaquam expetitur. Regium morbum purgat, semine potō, & vrinā pellit. Ex vtraque herba succus extrahitur, qui siccatus in umbra, reconditur, ad eadem valens.

Oicinis
Alchechem
gi Arabi
exemplo.

Sol

Solanū somniferū. CAP. LXII.

Solanum somniferū, aliqui etiā haliacacabon appellant, fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fractu cōtumacibus, pinguiū foliorū, cotoneæq; mali similiū plenīs: flore grādi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice grandi, subrubro cortice vestita: nascitur in saxis, nō procul à mari. Radicis cortex, in vino drachmæ pōdere potus, somnificam vim habet, opio mitiorē. Semen vehementer urinam cit. Corymbi duodecim, hydropicis dantur: si quid numero adiciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inseritur, & medicamentis quæ doloris leuamentū præbent: decoctus in vina, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

Manicum solanum. CAP. LXIII.

Solanum manicum, aliqui persion, alij thryon appellauere. Huic folium erucæ simile, maius aliquanto, satis acantho, quem pæderota vocant, accedens: caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adolēcentes: caput in cacumine, oliuæ figura, sed vt platani pilulæ hirsutius, verūm maius, latiusq;: florem nigrum: postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus hederæ corymbis, vt vuc mollibus: radice firmatur candida, crassa, cana, cubitali: gignitur in mont

LIBER QVARTVS. 639

montibus, vëto perflatis, & platanetis. Radix dra-
chmæ vnius pondere pota ex vino, facit species va-
nas, imaginesq; non iniucundas obuersari: sed du-
plicatus hic modus, ad treis vsq; dies mentis aliena-
tionē affert: quadruplicatus, interimit. Remedio est
aqua mulsa copiosius pota, & vomitione reiecta.

Dorycnium. CAP. LXIIII.

Dorycnion Crateuas halicacabon, aut cauleā
vocat: frutex oleæ nuper prodeunti similis: na-
scitur in petris, non procul à mari, ramis cubito mi-
noribus, folijs oleæ similibus colore, minusculis, fir-
mioribus, præter modum scabris: flore candido: silē-
quis in cacumine, teu ciceris, densis, rotundis, quinis
intus aut senis seminibus, exigui erui magnitudine,
leuibus, firmis, versicoloribus: radix ad digitum cras-
situdinem & cubiti longitudinem adolescit. Id so-
mniferum esse constat. Copiosius haustum mortē
adfert. Nec desuere, qui dicerent, semen in amato-
ria expeti.

Mandragoras. CAP. LXV.

Mandragoram, aliqui antimalum, alij cir-
ceam vocant, quoniam videatur radix ad
amatoria conducere. Duo eius genera: niger, quæ
femina existimatur, thridacias appellatus, an-
gustioribus folijs, ac minoribus quam lactuæ, vi-
rosis ac graneolentibus, in terra sparsis: mala ge-
rit sorbis similia, pallida, odorata, in quibus se-
men veluti pyrorum: radicibus inheret bene ma-

gnis, binis, ternisve, inter se conuolutis, nigris foris,
 intus albis, crasso cortice vestitis, caule viduus est.
 *Alj morion. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis & no-
 rion vocitatus: huius folia magna, alba, leta, læ-
 uia vt betæ: mala quàm alterius duplo maiora, co-
 lore in crocum inclinante, iucundè cum grauitate
 quadam olentia: quorum pomorū cibo, aliquantum
 opiliones soporantur. radix, alterius similis, maior
 & cādidior, orbata & hæc caule. Succus fit è cor-
 tice recentis radicis tuso, & prælis subiecto: qui in-
 solatus vbi concreuerit, fictili reconditur. Malis quo-
 que succus depromitur, sed aliquanto ignauior. De-
 libratur radix, & traiectus lino cortex, ad vsum
 suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias co-
 quunt, & defacatum ius seruant: cyathosq; vno v-
 tuntur, in pernuigijs, & doloribus, & ante sectio-
 nes vstionesq; ne sentiantur. Succus duobus obolis
 ex mulso potus, vt veratrum, per vomitiones bilem
 atram pituitamq; extrahit: verum potu largiore,
 vita admittitur. medicamentis ocularibus, & his
 que dolores finiunt, pestis quoq; emollientibus, ad-
 miscetur: semioboli pondere inclitus, per se menses
 & partus expellit: subditus sedli pro balano, somni-
 ficus est. Radix ebur emollire fertur, quæ senis ho-
 ris cū eo decocta sit: & ad accipiendam, quam effin-
 gere optaueris, formam, ipsum facile præstat. Fo-
 lia recentia convenienter oculorum inflammationi-
 bus, & collectionibus, quas vlcera citant, cum po-
 len

lenta illinuntur: duritias omneis, suppurationes, stru-
mas & tubercula discutiunt: stigmata sine exulce-
ratione delent, si quiniis senisve diebus, sensim per-
fricentur. Folia seruantur in murijs, eisdem ad va-
sus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpen-
tiū ictibus ex melle aut oleo, medetur: strumas at-
que tubercula, cum aqua dissipat: articulorum cru-
ciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem vi-
num ē cortice radice, ad hunc modum: Ternæ mi-
na in vini dulcis metretam coniiciuntur. Dantur
ex eo terni cyathi, ijs qui secari aut amburi debent,
vt antè dictum est: siquidem nullo tunc afficiuntur
dolore, sed veterno quodam pressi, torpescunt. Ma-
la soporem afferunt olfactu, & etiam si mandan-
tur: item expressus ex eis succus: nimio tamen odo-
re percussi, obmutescunt. Semen malorum potum
vulvas purgat: appositumq; cum sulphure ignem
non experto, rubra feminarum profluvia sistit.
Scarificata punctisq; multifariam aperta radice,
erumpens lacryma, cauo vase recipitur. Liguamen-
tum autem succo lacteo præstantius est: sed non v-
bique, vt experientia docet, radices lacteum suc-
cum delacrymant. Alium tradunt esse mandrago-
ram, nomine morion, in opacis iuxta specus ena-
tum: folijs albi mandragoræ, minoribus, albis, da-
drantalibus, radice ambientibus: quæ mollis est &
candida, paulò maior palmo, pollicemq; crassitu-
dine equat. Tradunt eam in pane, offa, obsonioribus,

drachmæ pondere deuorata, vsum rationis interceptare. Obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis, quaternisve, ex quo data est, horis. Hac medici vtuntur, cū scindendi, vrendiq; necessitas adest. Antidotum esse volunt radicem, cum manico solano potam.

Aconitum.

CAP. LXVI.

Aconitum, aliqui pardalianches, alij cammaron, alij telyphonon, alij myoclonon, alij theriophonon vocant: folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora & *sulhirsuta:

*Ita Plin. caulem palmo altum: radix scorpj caudam emulatur, & alabaſtri modo ſplendet. Torpeſcunt, vt iωσoρpα- fama eſt. ſcorpiones admoſta radice, ſtupentq; : qui Xia, rurſum hellebori contactu, excitantur. Oculorum i. ſubafpe- medicamentis leuandi doloris gratia adiicitur. Era, vtra necat pantheras, ſues, lupos & feras omneis in car autē lectio nibus obiectū. Eſt & alterum aconitum, quod alipotior, her qui cynoclonon, alij lycoclonon appellant. Huius bæ, ſi quan genera ſunt tria: vnū, quod vtūtur venatores: alia do ſeſe ob- duo in vſum ſuū vertere medici. ē quibus tertium, tulerit, a- quod Ponticu nominatur, plurimū in Italia, monſpectus in- tibus Iuſtinis exilit, à priore diſtans, quoniam folia faciat effigie platani, crebriore diuiſura, lōgio- ra, & multo nigriora: caulem ſilicis pediculo ſimilem, nudum, cubitali altitudine, aut ampliorem: ſemen in ſiliquis oblongis recondit: radices in modum ſquilla marine cirrorum nigreſcunt. Quibus ad
venat

venationem luporum vtütur: inserta siquidem crudis carnibus, & deuorata, lupos enccant.

Cicuta.

CAP. LXVII.

Cicuta caulem ælit geniculatum, vt fœniculi, grandem, * folia ferulæ, angustiora, graui odoratu: rami, mox umbellæ in summo prodeunt: flores quoq; albicantes: & semen aniso candidius: radice non alta, concaua. Cicutæ letale venenum inest, suaq; vi refrigeratoria necat. Remedio est vini meraculi potus. Succus exprimitur contusis cuminumibus, priusquam semina & coma siccescant: qui sole densatur in pastillos. Multus ad medendirationem vsus est aridi: commodè miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia temperantur: ignes sacros, & vlcera quæ serpūt, illitu restinguit. Herba cum coma trita, & testibus circumlita, libidinum imaginationes in somno, compefcit: sed genitalale resoluit. lac puerperarū māmīs appositum extinguit: in virginitate mammas coërcet, & increfcere non patitur: pueris præstat, vt eorum testiculi cibum non sentientes, intabescant. Efficacissima vis Creticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio & Cilicia nascentis.

Taxum.

CAP. LXVIII.

Smilax à Græcis, taxus à Latinis appellatur, arbor abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura, in Italia & Narbonēsi Gallia Hispaniæ contermina nascentis. Auicula quæ Italica taxum

*Plinius lib. 25. ca. 13. Coriandro assimilauit, cuiuspius facine quam ferulæ quæ fœniculi constat folijs, Cicuta omnib; hodie cōperta, videtur accedere.

xi baccus deuorant, denigrantur: & qui ederint easdem homines, alui profluvio corripuntur. Narbona tam presentis est veneni, ut si qui dormiant sub ea, aut eius umbra subsideant, ledantur, & sepenumero moriantur: quare de taxo hac traduntur, ut ab ea caueamus.

Apocynum.

CAP. LXIX.

A Pocynon, siue cynocrambe, brassica canina, frutex est longis viticulis constans, male olentibus, lentis, vitiliumq; modo obsequiosis, fractu ferè inuictis: folio hederæ, molliore tamē, & per extremum acutiore, lento, graui odore: id luteo succo turget. Siliquæ, ceu fabarum, folliculari specie, ligiti longitudine protenduntur: semine intus albo, duro, paruo. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant, in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

Nerium, seu rhododendrum.

CAP. LXX.

olad.

Amygdala.

N Erion aliqui rhododaphnem, alij rhododendron vocant, frutex est vulgaris notitiæ, longioribus quàm amygdala folijs, crassioribusq;: flore in rosam conformato: fructu & nucis græcæ simili, corniculato, qui patefactus quandā lanosam naturam ostendit, spinarū pappos representantē, radice longa, acuta, lignosa, gustati salsa: nascitur in æmænis, maritimis, & secus amnes. Flores & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimis

ven

venena sunt: hominibus verò cōtra serpentiiū morsus praesidia, è vino pota: eo magis ruta addita: imbecilla etiā animantes, vt pecus & capra, si aquā bibant, in qua folia ea maduerint, moriuntur.

Fungi. CAP. LXXI.

Fungorū differētia duplex: aut enim manduntur, aut perniciāles sunt. Multis de causis venenosi gignuntur, vbi videlicet clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit, aut si iuxta serpētis cauernā, arborēs ve, quae priuatim pariunt noxios fructus, erūpant. Cōtinent qui tales sunt, ne scio quod strigmentum cōcretamq; pituitā, terraq; eruti, quā celerrimē computrescunt, atq; marcore vitiātur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiā habent: largius tamen sumpti nocent, & agrius concocti stragulant, aut cholerae morbum citāt. Remedio est nitri potus, aut lixiuiū cum acida muria, aut feruesfacta satureia, aut orīgani insculū: debellantur etiam gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdē delinctu cū melle multo. Corpus alunt: sed agre dissoluantur, cū magna ex parte integri ipsi, cum recrementis alui reiciantur.

Colchicum. CAP. LXXII.

Colchicon, aliqui ephemerum, sunt qui agre- Censetur
stem bulbum vocant, autumnī exitu florem Hermoda
edit croci, candicantem, ab eo tempore, folia bul- Etylus offi
bi, sed pinguiora: caulem palmo altum: ferentem cinarum.
rufum semen: radicem foris è nigra rufescentem,

quæ delibrata, candida & mollis spectatur, lacteo succo madet, atque gustatu dulcis invenitur: bulbus eius mediam habet rimam, fissuramq; qua flos erumpit: plurimum in Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesa, fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne à quoquam imprudenter pro bulbo deuoretur: mirum enim in modum saporis voluptate imperitos allicit. Remedio sunt eadem quæ fungis: bubulum etiam lac potum auxiliatur: itaq; cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

Ephemerum. CAP. LXXIII.

Fortè no-
strum Li-
um cōual-
lium.

Ephemerum, aliqui syluestrem irin appellant, folia habet lilij, sed tenuiora: caulem parem: florem candidum, amarum: semen molle: radicem unam, digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam: nascitur in syluis & opacis. Huius radix dentibus præcipua, si decocto colluantur. Folia in vino cocta, discutunt tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

Helxine, id est, muralis herba.

CAP. LXXIIII.

Officinis
Parieta-
ria.

Helxine nascitur in parietinis, sepibus, vineis & segetibus: folia ei mercurialis insunt: hirsuta: cauliculi subrubentes, & circa eos velut semina aspera, adhaerentia vestibus. Folia refrigerandi spissandiq; naturā habent, qua ex causa sanant illitu sacros ignes, adusta, condylomata, pano-

inci-

incipiētes, tumores, inflāmationesq; Succus eius cū cerussa, ignibus sacris, & vlceribus quæ serpunt, cōmodē illinitur, imponiturq; podagris cum hircino adipe aut cerato cyprina: veterē tussim emendat mētar cyathi haustus: tonsillis inflāmationē sentientibus vtiliter & gargarizatur, & oblinitur: aurium dolorem cum rosaceo instillatus leuat.

Alfine. CAP LXXV.

Alsinem, aliqui anthyllion, nōnulli myos ota Vulgō mor vocant, quoniam musculorū aures folia imi sus gallinae tantur. Lucis opacisq; gaudet, vnde alfine dicta est. Hæc erat eadē quæ helxine, nisi humilior esset, & folijs minoribus, *nec hirsuta. cum teritur odorem *Ex Plin. cucumis reddit.] Vim refrigerandi astringendiq; adiecta. obtinet: oculorū inflāmationibus cū polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur: quin & emendat omnia quæ helxine, id est, muralis herba.

Lens palustris. CAP. LXXVI.

Lens palustris, inuenitur in aqua non fluente, Officinæ muscus lenticula similis, refrigeratoriæ natu- lenticula re. Propter quod conuenienter collectionibus, igni aqua. sacro, & podagris, illinitur per se, & cum polenta: glutinat, & procidentia puerorum interanea.

Semperuium, seu sedum.

CAP. LXXVII.

Semperuium magnum idē nominatur, quoniam perpetuō folia vircant: cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pueri

gues, crassitudine pollicari, virentes, characia thymali modo infecti: folia pinguis, * carnosae, * Vox adeli magnitudine pollicari, in cacumine linguae similia ex Plin. lia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem, ita ut ambitu effigie imitentur oculi: nascitur in montibus, & testaceis: supra domicilia etiam feritur. Eius vis refrigerare, & adstringere: medentur igni sacro, nomis, ulceribus quae serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in doloribus, cum polenta aut rosaceo perfunditur: datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, aluique profluvia, teretes tineas potus in vino excutit: subditus in vellere, mulierum abundantiam sistit: succus oculorum lippitudinibus, sanguinis vitio conceptis, inungitur. Semperuium parum in petris, parietinis, & maceris, nec non scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro foliatis: exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis: caule à medio emicante, palmum alto, umbellam herbidosque flores, & tenues gerente. Folia eisdem cum priore viribus praedita sunt. Tertium videtur semperuii genus, quam aliqui andrachnen agriam, aut telephion vocauerunt, Romani illecebram, pusillis, crassioribusque folijs, hirsutis, portulacae proximis: nascitur in saxis. Vis ei excalfactoria, acris, exulcerans: illita cum axungia strumas discutit.

Vmb

LIBER QVARTVS.

349

Vmbilicus veneris. CAP. LXXVIII.

Otyledon, siue vmbilicus Veneris, folio est in
 Sacetabuli formā tornato, ineuidēter concauo,
 cui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice
 nua modo rotunda. Succus cū vino circūlitus, in-
 llatusve, contecta genitalia nudat: inflammatio-
 bus, sacris ignibus, strumis, pernionibus, illitus au-
 liatur: stomachi ardorē refrigerat. Folia cū radi-
 come sa, calculos frangūt, vrinā cient, hydropicis
 melle dātur. Herba vtūtur ad amatoria. Est &
 terū genus eiusdem, cymbalion aliqui vocāt, pin-
 nibus folijs, latioribus, ligularum modo densis cur
 radicem, medium oculi ambitum describentibus,
 in maiore semperuino, adstringētis gustus: cau-
 ulo tenui, in quo flores & semina hyperici: radi-
 mainuscula. Facit eadem, quæ semperuiuum.

Vrtica.

CAP. LXXIX.

Vo vrticæ genera: syluestris, asperior, la-
 tioribus, nigrioribusq; folijs: semine lini,
 minore. Altera non æquē aspera, minuto se-
 mine. Folia r̄ trinsque illita, canis morsibus, addi-
 sale, medentur: gangrenas, carcinomata, sor-
 da vlcera, & quæ cacoethe vocantur, item lu-
 ta, panos, tubercula, parotidas, suppuratio-
 esq; sanant: lienosis cum cerato imponuntur: fa-
 unt ad profluvia narium, cum succo trita, &
 uribus indita: menses ciunt, eadem detrita cum
 yrrha, & imposita: procidentes vuluas, recen-
 tia

tia contactu resiliere cogunt. Semen potum ex passo venerem stimulat, vulvæ ora patefacit: cum meli delinctum, orthopnœæ, lateris & pulmonum inflammationibus prodest: thoracem expurgat: erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt, urinas mouent, inflationes discutunt: decocta cum ptisana, vitia pectoris extrahunt: mulierum menses euocant, cum myrrha modico pota. Inflammatione turgentem vnam gargarizatus succus exprimit.

Galiopsis. CAP. LXXX.

Galiopsis, frutex in totum caulem, & folia habet vrticæ, laniora, & quæ grauē odorē trit reddant: flore purpurascente, tenui: nascitur circa sepes, adificiorū areas, ac semitas ubique. Folia, caules, semen, succusq; duritias & carcinomata discutiant, strumas, panos, & parotidas discutiant. Oportet his die tepidū ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fovere: ad putrescentia, gangrenas, & nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

Galion. CAP. LXXXI.

Galion, nomen ex eo traxit, quod in comitrahendo lacte, coaguli vicem impleat: ramulum foliumq; habet aparinæ simillimum, retum: florem in calamine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos igni ambustis illinitur, sanguinis profluvia sistit. Cerato rosaceo galion admiscetur, insolatum vsquedum albescat.

la.

LIBER QVARTVS. 35^r

Situidines reficit. Radix venerem concitat. Natur in palustribus.

Senecio. CAP. LXXXII.

Senecio cauliculo est cubitali, subrubro, foliis continuis, eruca modo per extremitates diuisis, minoribus multò: luteis floribus, qui celeriter secti vaneſcunt in pappos. Nomen verò ſibi veniit, quoniam flores capillorum ritu, vere canent. radice ſuperuacua: nascitur maximè in maris, & circum oppida. Folia cum floribus refrigerant: quare illita cum vini modico, vel per ſe ſeſe, tium & ſedis inflammationes ſanant: quin & ex omnia thuris medentur, cū reliquis vulneribus, tū qua nerui acceperunt. Illiti per ſe cum aceto pappi dem munus præſtant: verum recētes epoti, ſtruant. Totus caulis, ſi coctus in paſſo potui detur, nachi dolores à bili contractos, perſanat.

Thaliætrum. CAP. LXXXIII.

Thaliætron folia coriandri habet, pinguiora paulò: coliculus ruta craſſitudine, in quo fo Quæ trita, illitu antiqua vlcera ad cicatricem ducunt. Nascitur maximè in campeſtribus.

Marinus muſcus. CAP. LXXXIIII.

Marinus muſcus nascitur in ſcopulis, teſtaceisq; haud procul à mari, gracilis, capillacaulis expers. Præcipua ei ſpiſſandi vis, & colones cohibendi, & podagras, quas refrigerare ſit.

Phyc

Phycus marinus. CAP. LXXXIX

Phyci marini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens: tertium candidum, nascens in Creta iuxta terram, floridum valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim habent refrigeratorem, non podagrico modo, sed etiā inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter utilem: verū in ijs vii humidis conuenit, priusquam exarescant. Nicander, puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc fūco quidam putant mulieres suum colorem mentiri, cum tamen sit & dicula eiusdem nominis, qua se se fucant.

Potamogeton. CAP. LXXXV

Potamogeton, folium beta simile, hirsutum paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat: pruriginibus utile, & contra iterum ulcerum nomas. Nomen ex eo inditum est quod palustribus, & aquosis enascatur.

Stratiotes. CAP. LXXXVII

Stratiotes in aquis nascens, iisdem supernatans & sine radice uiuit: unde cognomentum traxit. Herba semper uiuo similis, ni maiora habet folia: quae refrigerant. Sanguinem qui defluit a membris, pota sistunt: vulnera quae inflammatione minantur, intumescere non sinunt: ignibus sacris & tumoribus ex aceto illinuntur.

Vulgatum millefoliū. **S**tratiotes millefoliū. CAP. LXXXVII
millefoliū. Stratiotes millefoliū exiguus frutex, palmi a

tit.

indine, aut amplius assurgit: folijs auicularum
mas imitantibus, breui admodum dissectoq; fo-
rum exortu. Folia syluestre cuminum simulant,
fertim breuitate atq; scabritia, breuiora paulò,
siore umbella, & pleniore. Surculos in cacumi-
gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flo-
paruos, cādidos. Nasceitur in asperis agris, præ-
uè circa semitas. Eximij vsus ad vlcera vetera,
rentiaq; profluentem sanguinem, & fistulas.

Verbascum.

CAP. LXXXIX.

✓ Erbasum differentias summas habet duas, Tapsus hæc
hoc nigrū, illud album: in quo mas & fœmē batus vul-
intelligitur. Fœminæ igitur folia sunt brassicæ, gò.
osiora multò, & latiora, candida: caulis albus,
bitalis, aut amplior, subhirsutus: flores albi, aut
pallidi: semen nigrum: radix longa, gustu acer-
crassitudine digiti: nascitur in cāpestribus. Ver-
scum, qui mas appellatur, oblongius, albis folijs,
angustioribus, tenuiori caule. Sed nigrū pror-
albo simile esset, nisi nigriore latioreq; constaret. * Sic Plin.
io. Syluestre folia fert saluæ, a'tas virgas, & qui ξυλῶ-
ignosus, & circa eas ramulos quales marrubij: A'is vide-
res luteos, auri æmulos. Sunt & phlomidēs duæ, tur legisse-
suta, rotundis folijs, humiles. Tertia lychnitis ap Græcos co-
llatur: ab alijs autem thryallis, folijs ternis, aut dex A'ev-
aternis, vel paulò pluribus, hirsutis, crassis, pin- A'p'ō A'is,
ibusq;: apta ad lucernarum lumina. Radix prio id est, arbo-
m duarum adstringit: quare quod magnitudine rescentes.
ludic

ludicrum talum aequet, in alui profluuiio, conueni-
 zer ex vino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fra-
 ctis, antiquæ tussi auxiliatur. Dentium dolore co-
 lutione mitigat. Verbasum cui flos aureus, capi-
 los tingit, & quocunq; abijciatur, blattas in se co-
 trahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, in-
 flammationes oculorum, syderata vlcera, ex vin-
 o & melle illinuntur: cum aceto quoq; vulneribi-
 medentur: contra scorpionum ictus, sunt auxili-
 Syluestris folia ambustis igni, sunt cataplasmati.
 Aiunt in folijs eius, quam feminam dicimus, ar-
 dos ficus omnino non putrescere.

Aethiopis.

CAP.

XC.

Aethiopis folia habet verbasco similia, perqu-
 hirsuta, densaq; in orbem circa radicem im-
 redacta: caulem quadrangulum, crassum ac sca-
 brum, similem apiastro, aut arctio, multis conca-
 uum alis: semine erui magnitudine, geminum, in vn-
 conceptaculo: radices ab eodem caespite numerosa-
 longas, plenas, glutinosas gustu, quæ sicca nigrescun-
 duranturq; ut cornua possint videri: plurima na-
 scitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Aux-
 liatur purulentis excreationibus, ischiadicis, pleuri-
 ticis, arteriae scabritijs, decocta radix, et pota: qui-
 & cum melle, eclegmatis vicem præbet.

Arction.

CAP.

XCI.

Arction, aliqui potius arcturon vocant, si-
 milis est verbasco folijs, nisi quod hirsutio-
 ra,

ta, & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine
 humini, paruo: radice tenera, alba, dulciq;. Deco-
 cta cum semine radix in vino, dentium dolorem
 mulcet, si contineatur ore decoctum: ambusta per-
 nionesq; fouentur eodem: bibitur aduersus coxen-
 ticum dolores, & stranguriam, è vino.

Arcion, siue Personata. CAP. XCII.

Personata folia habet cucurbitæ, maiora & Vulgò lap-
 hirsutiora, nigriora & crassiora: caulẽ albi- pa maior,
 antem, quauquã & interdũ vidua caule reperia- & Barda
 ur: radice grandi, intus cãdida, foris nigra. Hac na-
 trachma vnus pōdere pota, cũ pineis nucibus, pu-
 ulenta & cruenta extusientibus auxiliatur: trita
 dolores à contorsionibus artuum cōtractos, illitu se-
 lat. Folia vtiliter antiquis vlceribus illinuntur.

Petasites. CAP. XCIII.

Petasites pediculus cubito maior, crassitudi-
 ne pollicis, à quo prægrande foliũ, galeri mo-
 lo amplum, ceu fungus dependet. Contra phage-
 lenas, & vlcera, quæ cacoëthe vocant, efficaciter
 llinitur.

Epipactis. CAP. XCIII.

Epipactis ab alijs helleborine, parua herba, exi-
 gnis folijs. Iocineris vitijs vtilis, & contra
 enena pota.

Gapnos, seu fumaria. CAP. XCV. Officinis

Fumaria fruticosa herbula est, prætenera, co- fumus ter-
 riandri similis: folijs candidioribus, vndiq; ræ,

numerosis, cineracei coloris : flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis delacrymationemque unde nomen traxit. Illitus cum gummi, euulsas pedibras renasci prohibet. Commanducata herba bliosam urinam trahit.

Lotus urbana.

CAP. XCV

Lotum urbanā alij trifoliū vocant: nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, ceterasque caligines discutit.

Sylvestris lotus.

CAP. XCVI

Sylvestris lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & saepe maiore, alis multis: folijs trifolipratenfis: semine fœnigraci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi, & leniter adstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculasque cum meliperuncta expurgat: trita per sese aut cum malum semine, in vino aut passo bibitur aptissime contra dolores, qui vesicam male habent.

Cytisus.

CAP. XCVIII

Cytisus, frutex est albus in totum, ut rhamnus, ramos spargens cubitales, saepe maiore: in quibus folia fœnigraci, aut loti trifolia minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita erucam olent, gustataque cicer recens sapiunt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutunt, si cum pane trita illinantur. Decoctum potum urinam ciet. Nonnulli, quod apes alliciat, prope aluearia serunt.

Le

longiorum moribus auxiliatur: cit menstrua, & partus secundos, purgatq; à purperio foemina subuenit et phthisicis cocta in sorbitione. Aiunt quae eandem bis die terve potam ex vino in pestilentia salutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstat.

Myagrum.

CAP. CII.

*ΤΗΛΙΔΙ,
non τρα
Χήλω.
MYagron, aliqui melampyron vocant, heri-
nea: semen oleosum. *fenograceo simile. Quod
iusum igni torrent, perunctisq; virgis ad lucerna-
rum lumina vtuntur hoc pingui, scabritias corpo-
ris leuigari, atque expoliri constat.

Onagra.

CAP. CIII.

ONagra, siue onothera, aut onuris, frutex
arboris instar, praegrans, amygdalino fo-
lio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, ni-
gno: radice candida, longa: cum siccata est, vinu-
olente: nascitur in montibus. Aqua, in qua rad-
iculae maduerit, in potu data feras mitigat, & cicur-
facit: illitu quoq; tetra vlcera mulcet.

Cirsium.

CAP. CIIII.

Censetur **C**irsium, caulis est tener, duorum cubitorum
buglossa of-
ficinorū. **C**triangulo similis: ab imo foliola, rosae spec-
Plin. mino-
ra. lia buglossi similia, & maiora, subcandida, modice
hirsuta, partibus extremis aculeata: cacumen ca-
lis orbiculatum, bispidum, in quo capitula in sum-

LIBER QVARTVS. 350.

io purpurea, quæ solvuntur in lanugines. Redi-
m huius loco laboranti adalligatam, dolores va-
icum sedare Andreas scripsit.

Aster Atticus, seu inguinalis. CAP. CV.

Aster Atticus cauliculus lignosus, florem in
cacumine habens purpureum, luteis in re, per
mbitum, anthemidis capituli modo diuisum, fo-
lis stellæ modo radiatis: quæ autem caulem cir-
ndant folia, oblonga sunt ac hirsuta. Feruenti sto-
macho, oculorum inflammationibus, procidua se-
ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradunt purpu-
um florem, si ex aqua bibatur, anginis, & pue-
s comitiale malum sentientibus, opitulari. Ingui-
um inflammationi recentem illinire convenit. Si
ridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, &
guinibus adligetur, dolore liberat.

Isopyrum. CAP. CVI.

Isopyron aliqui phasiolon ob similitudinem vo-
cant, quoniam folium quod est aniso simile in
mpinos torquetur, capitula sunt in summo cau-
tenuia, plena seminibus, melanthij gustum imi-
ntis. Contra tussim, & cætera pectoris vitia,
nen ex aqua mulsæ bibitur: hepaticis, & san-
inem excreantibus utile.

Viola purpurea. CAP. CVII.

Viola purpurea folium habet hedera minus,
tenuius ac nigrius, nec multò dissimile: cau-
culus à radice medius prodit, in quo flosculus,

plin. l. b. 27.
cap. v.

iov. 2. 10.

suauissime olens, purpureus: opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se et espolenta illinuntur aptissime stomacho aestuanti, & oculorum inflammationibus, sedique procidenti.

Cacalia.

CAP. CVIII

Cacalia, quae leontice vocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, rectus, albus, flores ferens robori aut oleae simile: nascitur in montibus. Radix in vino madefacta, ut tragacantha, delinctu aut manducatu per se tussibus, scabritibus arteriae, medetur. Grana quae post excusum florem innascuntur, trita, & cum cerato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Bunium.

CAP. CIX.

Bunion caulem adit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine, in quo ramuli minimis folijs ac floribus scatent: folia proximè radicem, apio similia, longè tenuiora, coriandrini proxima: flores anethi: semen odoratum, hyoscyamo minus. Vrinam ciet, excofacit, secundas euocat: lieni, vesicae, renibus utile. Tam humidi quam sicci, expressique succi caulibus, folijs, radicibusque usus inualuit ex aqua mulsa. Pseudobunion palmarum altitudine fruticat in Creta, folia ramulosque natiui ferens, acri gustu. Tormina, atque stranguriae laterumque dolores, sanant quaterni rami eius potati in aqua: illiti quoque cum sale & vino, tepente strumas discutiunt.

C

Chamæcissus. CAP. CX.

Chamæcissos, folio est hederæ, tenuiore, longiore. ramulis à radice quinis senisve, dorantibus, foliosis: flore viola albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro: radice tenui, candida, inutili: nascitur in cultis. Bibunt inuenientissimè ischiadici folia, tribus obolis in qua cyathis tribus, tricenis quadragenisve diebus: eodem pota modo, senis aut septenis diebus, reum morbum purgant.

Clamæleuce. CAP. CXI.

Chamæleuce lumborū doloribus propitia est, herba virēs, incuruis folijs, surculisq; flore roiceo. Buglossum, seu lingua bubula.

CAP. CXII.

Buglossum nascitur in campestribus, & sabulosis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam quæreis thyrsos emittit, cum semine & radice trita, otamq; contra tertianos horrores prodesse: quæ uatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur. heram abscessibus utilem esse volunt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperū, ubulas imitans linguas. Quod in vinum deiectū, uimi voluptates auget.

ANNOTATIO.

Nostrū Cynoglossum caulem & purpureos flosculos ædēs, nō esse verū ac legitimū, historia ei⁹ apertissimè indicat.

Cynoglossum.

CAP. CXIII.

Cynoglosson folia latifolia plantaginis habet, archnora, minora, lanuginosa: caule vacat, et humi sternit: prouenit in sabuletis. Folia cum suille adipe veteri, mēdētur moribus canū, alopecys, & ambustis. Emollit aluū, decoctū herbæ ex vino potum.

Phyteuma.

CAP. CXIIII.

*Struthij.

Phyteuma folia habet* radiculæ, minora: copiosum semen, perforatum: radicem paruam, tenuem, per summa terræ nitentem: quā ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

Leontopodium.

CAP. CXV.

Leontopodium diuū digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternū quā tenuūve digitorum, hirsuta, quæ iuxta radicē lanosiore flocco canescunt: capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semē vsque ad eō spissa lanugine inuolutum est, ut saepe fallat: radice paruā cohæret: quam tradūt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

Hippoglossum.

CAP. CXVI.

Hippoglosson, frutex est folia habens rusci tenuis figura, & spinosam comā, & in summo seu linguas è folijs exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit: Malagmatis radix succusq; admiscetur.

Antirrhinum.

CAP. CXVII.

Antirrhinon, alij anarrhinō vocāt, herbam

can

caule & folijs anagallidi similem: flore albævio-
 e, purpureo, minore tamen, ideoq; syluestris ly-
 mnus nominata est: semine vituli narium simili.
 radit perunclos ea, cum oleo lilino, venustiores
 eri: nec villo medicamento lædi posse, si quis ap-
 psum gēstet.

Catanance. CAP. CXVIII.

EX eo genere una, folia coronopi habet, longa,
 radicem unci modo prætenue: capitula sena,
 ptenave, in quibus erui semen inest. Arescens in
 rram flectitur, & se cōtrahit ad speciem vnguiū
 ului examinati. Altera mali parui magnitudinē
 eplet, radice exigua oliuæ magnitudine folijs quo-
 ue oliuæ colore, & figura, mollibus, diuisis, humi-
 clinatis: semen, ut cicer, minutum, in virgulis de-
 endet, punice coloris, multis foraminibus pertu-
 m. Vtranq; narrant in amatoria expeti. Thesæ
 æ mulieres his vti traduntur.

Tripolion. CAP. CXIX.

TRipolion in marinis nascitur locis, quæ alli-
 dit vnda, recedensq; dimittit, neque in ma-
 neque in sicco: folio glasti crastore: palmeo cau-
 in mucrone diuiso. Eius, ut tradunt, flores colo-
 m ter die mutant, mane candidi, meridie pur-
 rei, sero punicei conspiciuntur. Radice alba, odo-
 ra, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in vi-
 pota, aquam, urinamq; per alium extrahit. In
 medicamenta digeritur, quæ venena arcent.

Officinarū Capillus veneris. Est enim earum Adiantum, non quod hic Dioscorides, sed Plinius lib. xx. cap. xxi. depinxit, & candidum vocauit: non quin & ipsum, vti suspicamur, fuscis obtineat coliculos, sed quia Trichomani, quod illi nigrum est adiantum, comparatum, album potius, quam nigrum appareat.

Adiantum.

CAP. CXX

A Diaton, polytrichon, pusilla gerit folia similia coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitet, pratenuis palmū alti: radice superuacua neq; caule, neq; fructum, neq; florem profert. Decoctum herbae potum prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felicle suffusis, & vrinae difficili. Calculos frangit, album sistit, serpentium morsibus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas ciet et menstrua. sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit: furfures, & manantia capitis vlcera, ex lixiuio emendat: defluētes capillos continet, cum ladano & myrtino, & susino, aut hyssopo, vinoq; decoctū eius cum lixiuio & vino infusum, idem praestat: coturnices & gallinaceos pugnaciores facit, in cibos eorum additū. Seritur gratia vtilitatis pecorum circa ouilia. Umbrosis, &

pa

alutribus, circa parietum aspergines, & fontiu
specus enascitur.

Trichomanes.

CAP. CXXI.

Trichomanes nascitur eisdem in locis quibus
Adianton: filici simile, sed exilius: folijs leticu
e, tenuibus, in ordinē vtrinque digestis, aduersis in
e, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore splenden
ibus. Eadē quæ & Adianton præstare posse cōstat. *Officinis polytrichō quod idem tamē cum Adianto.*

Xanthium siue Lappa. CAP. CXXII.

Xanthium nascitur lato & pingui solo, & *Vulgò lappa minor.*
lacubus exiccatis, caule cubitali, anguloso,
pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis: folia atri
plicis habet, insecta, nasturtium odore imitantia:
fructum grandis oliuæ modo, rotundum, & ut pla
tani pilula, spinosum, qui contactu vestibis ad
bare scit. Is antè collectus quàm perfectè siccescat,
tunditur, & fictili vase reconditur. Flauos autem
facit capillos, si acetabuli inſtar tepida aqua ma
descat, mox caput, nitro antè perfrictū, illinatur,
Alij in vino tundunt, & ita aſſeruāt. Semen aptiſ
simè tumoribus imponitur.

Aegilops, siue festuca. CAP. CXXIII.

Aegilops herbula folia tritici habens, sed
molliora, in summo capite semina bina ter
nare rubra, quibus aristæ quasi capillaceæ exeūt.
Illita cum farina herba ægilopis medetur, duritias *Marcello*
discutit. Succus farinae admixtus, siccatur, & *suppositio*
eorundem gratia reponitur. * Bromus herba ægi
lops

lopi similis, exciccatoriam vim habens, decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colat par modus mellis adijcitur: rursus incoquitur, & liquidi mellis crassitudo fiat. Linteum eo humor imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam vlcerum efficax est. Aliqui tritam aloë ad dunt, & eo modo vtuntur. Cum siccis rosis coctum in vino, grauem oris halitum emendat.

Glaux.

CAP. CXXIIII

Glaux cytiso aut lenticulæ folijs similis, qui superne virent, auersaq; candidiora spectantur: ramuli à terra exiliunt quini senive, tenues à radice, dodrantem alti: flores violæ albæ, purpurei exeunt, minores tamen: nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale, & oleo in sorbitione, ad reuocandâ extincti lactis vbertatē.

Polygala.

CAP. CXXV

Polygala palmi altitudinē petit folijs lenticulæ gustu adstricto. Quæ pota, lactis abundatiam facit.

Osyris.

CAP. CXXVI

OSyris, frutex est niger, ramulos ferēs tenues lentos, fractuq; contumaces: & in his folia quaterna, quina, senave, ceu lini, nigra in initio vulgò ap- dein colore mutato rubescentia. Decoctum eius popellata. tum, iuuat arquatos.

Aspera smilax.

CAP. CXXVII

Smilax aspera, folia habet periclymeni: sarmenta tenuia, multa, rubi modo aut paliur

acu

eculeata: arbores scandit ab imo ad summa perre-
tans, se cōvoluens eis. Fert racemos exiles, qui ma-
uri rubescūt, gustumq; leniter mordet. Nascitur in
salustribus & asperis: radice dura, crassaq;. Folia
& acini, & ante & post poti, venenorum antido-
ta sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucē editis,
quid ex his tritum propinetur, nulla postmodū ve-
rena nocitura. Inciditur etiā ad alexipharmaca,
id est, ad ea medicamēta quibus venena arcentur.

Lævis smilax. CAP. CXXVIII.

Lævis smilacis folia hederæ similitudinem ha-
bent, molliora, leniora, tenuiora: huius sar-
mēta nullis horrent spinis: conuoluitur arboribus,
ut prior: fructum parit lupini modo nigrum, exi-
guum: flores circūquaque exiliunt candidi, copio-
si, orbiculati. Hac smilace, quadam topiariorum
arte, tentoria contra æstus molestiam faciuntur:
folia per autumnum decidua. Semine cū dorycnio
boto, ternis singulorum obolis, varia & tumultuo-
sa in somnis obseruari traduntur.

Ruscus. CAP. CXXIX.

Sylvestris myrtus, aliquibus oxymyr sine, aut *Officinis*
myrtacantha, Latinis ruscum appellatur: fo- *Bruscus.*
lium fert myrti, latius, in formam lanceæ mucro-
natum: baccae per maturitatem rubescunt, rotun-
dæ, à medio folio dependentes, osseo intus nucleo:
cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modo
lenti, fractu contumaces, foliosi: radice graminis
sim.

simili, acerba, & subamara. Folia & bacca in no pota vrinam cient, menses pellunt, versica callos frangunt, stillicidio vrinae medentur, dolores pitis sanant, & regium morbum. In asperis et precipitibus locis enascitur. Decoctum radice in v potum, eosdem praebet effectus. Cauliculi recens asparagorum vice, in cibo sumuntur. Amari aut sunt, sed vrinam mouent.

Laurus Alexandrina. CAP. CXX

Laurus Alexandrina, folio est rusci maiore molliore, & candidiore: semine inter folia bro, eiceris magnitudine: ramos spargit in teri
Rusco dodrantes, interdum longiores: radice & sylues myrto simili, maiore, molliore, odorata: inuenit in montosis. Difficiles partus accelerat, radice po sex drachmarum pondere in vino dulci: & stillicidio vrinae auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

Daphnoides. CAP. CXXX

Vulgo
Laureola. **D**aphnoides cubiti altitudine fruticat, ram flexilibus obsequiosisq; multis, inde sursum versus foliosis: cortex supra modum viscosus ram vestit: folia lauri, graciliora, & molliora, fractumacia, quorum gustatu os & fauces incerduntur: flores candidi: bacca, cum ematuruit, nigra: radice inutilis: nascitur in montosis. Pituitas extrahit folium recens vel aridum in potu, menses ciet & vomitus: caput inani commanducatum, sternutamentum mouet. Bacca quindecim pota aluum resolunt.

Cha

LIBER QVARTVS. 363

Chamædaphne. CAP. CXXXII.

Chamædaphne virgas omittit cubitales, singu-
lari ramulo constantes, rectas, tenues, leues:
folia lauri similitudine, leuiora multo, ac viridio-
z: semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illi-
untur capitis doloribus trita folia, & stomachi
ardores mulcent: ad sedanda tormina cum vino bi-
untur. Potus cum vino succus, menses & vrinã
et: idem facit pefso appositus.

Veratrum album. CAP. CXXXIII.

Elleborũ album, Latini veratrũ album vo-
cant, fert folia plantaginis aut betæ sylue. *Plin. ca-
ris similia, sed breuiora, et nigriora, *rubescētia, naliũ dor-
ulẽ canum, quadrantalẽ, tunicis conuolutũ, quas so rubescē-
bdicat cum arefcere incipit: radicibus nititur mul tia.
s, tenuibus, ab oblongo & exiguo capite ceparum
modo exeuntibus: nascitur in motibus et asperis. Ra-
ices messibus colligēdæ. Optimũ habetur candidũ,
iabile, carnosum, modicẽ extentũ, nec tamen iun-
modo mucronatum, quod frangēdo puluerẽ emit-
t. & tenuem habet medullã, gustu nõ admodũ fer-
ens, neq; salinã, subinde ciens, (huiuscemodi autẽ
strangulat.) Primatũ Cyrenaicum tenet. Galaticũ
item & Cappadocicum, candidiora, & puluere
quodam obsita, celerius strangulatus mouent.
omitione autem varios extrahit humores. Colly-
is admiscetur, quæ caliginem oculorum discu-
unt. Partus impositum necat, menses pellit, ster-

vni

nutrimenta excitat, mures interficit cū melle & lenta subactū, absūmit carnes si coquatur vna. Datur per se ieiunis, & cū sesamia, aut ptisana succo aut halicæ, aut lentis cremore, cū aqua mulsā, a pulte, aut quauis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Preparatio corporū, ac victu ratio, diligenter tradita est, cum ab his qui de medicina eius potione scriptitarunt, tum maximè à Phlegone Siculo Ennēsi, cui nunc assentimur: quippe legum nimis esset, in hac præsertim editione de materia, simul medicam curandi rationem exponere. Dant nonnulli in pultis sorbitione, aut copioso halicæ cremore: aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim veratrū offerunt, ijs præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, aut si valetudo corpus infirmat: hoc enim modo deiectio nihil periculi minatur, quod cibo minutis nō intempestuè medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subdite ex eo balani, cum aceto.

Veratrum nigrum. C A P. CXXXIII

Helleborum nigrum, appellatur melampodion, quoniam caprarum pastor, nomen Melampus furentes in se Prætidæ, primus purgasse, & sanasse fertur, Folia ei viridia, platani similia, minora, folijs sphondylii proxima, subassera, nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper, flores purpurei, candidi, racematim coherentia, semen cnicī, quod in Anticyra sesamoides vocant.

tant: quo deiectiones moliuntur: radicibus cohaere
nigris, tenuibus, à capitulo, cepae simili confibratis:
quarum est vsus: in collibus, asperis, & sitientibus
locis enascitur. Optimum est quod ex huiusmodi pe-
ritur terris, vt ex Anticyra. Nigrū inibi probatis-
simum gignitur. Eligi debet corpulentum & ple-
num, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensq;
huiusmodi est in Helicone, Parnaso, & Aetolia na-
tum: attamen Heliconium praecellit. Veratrum ni-
rum purgat ventrem, detrahit bilem pituitasq;
latum per se, aut cum scammonia, & tribus obo-
is, siue drachma salis: decoquitur vel cum lente &
usculis, quae purgationis causa sumptitantur. Pro-
dest morbis comitialibus, melancholicis, insanienti-
bus, articularijs doloribus, & resolutis. Menses in-
litum trahit, partus necat, purgat fistulas imposi-
tum, & tertia die detractum. Item contra graui-
tatem auditus in aurem demittitur, ibiq; in alte-
rum aut etiam tertium diem esse sinitur. Scabiem
anat, illitum cum thure, aut cera, & pice, & ce-
lrino oleo: vitiliginibus, lepris, impetiginibus, ex
aceto medetur: detium dolorem collutione mitigat:
rodentibus medicamentis commiscetur: hydropi-
corum ventri vtilissimè imponitur factum ex eo,
farina hordeacea, & vino, cataplasma: consitum
roximè radices vitium, vinum purgandi faculta-
te donat. Huius resparso domos expiari arbitran-
tur: quare inter fodiendum stantes, Apollinem,

Aesculapiumq; precantur, ac vitant aquila volatus, aduolare enim non sine periculo tradunt: namq; si avis effossione hellebori conspexerit, moriturum qui succidit, auguriū est. Celeriter effodiatur oportet, quoniā halitu caput aggrauat: quapropter, ad id arcēdum, fossuri, allium præsumere, & vinum bibere consueuerunt: nulli ita noxae opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

Sesamoides magnū. C A P. C X X X V.

Sesamoides magnum, in Anticyra helleborum vocant, quoniam albo veratro in purgationibus misceatur. Simile est senecioni aut ruta: longo folio: flore candido: radice gracili, ignaua: semen gustu amaro, cetera sesamæ simile. Vētre detrahit: datur tritū ad bilis pituitaq; deiectiones, quantum tribus digitis capitur, addito veratri albi sesquiobolo, ex aqua mulsa. Sesamoidi parua cauliculi sunt dodrantes: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorum cacumine capitula, florum penè purpureorum, medio eorum albo: semen sesamæ, fuluum, amarum: radix tenuis. Detrahibilem pituitasq; semen ex aqua mulsa potum dimidio acetabulo: illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nasceitur in asperis.

Syluestris cucumer. C A P. C X X X V I.

Vulgò Cucumer asinus.

Cucumis sylvestris fructu solo distat à satiuo cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem: folia atque sar-

me

LIBER QVARTVS. 177

menta satini refert: radice candida, magna: nascitur in sabuletis, & ruderibus, frutice in totū amaro. Instillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, veterem omnem tumorem discutit: imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit: ischiadicis infunditur: podagras discutit, decocta ex aceto, & illita eius decocto dentes in dolore colluuntur. Arida farina impetiginem, lepras & vitilignes absterget, nigri cicatricibus colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Radicis succus sesquiboli pondere, & item cortex, acetabuli quarta parte, lilem pituitamque deiciunt, praesertim in hydropicis: (deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet) radicis selibra, in vini praesertim Libyci hemina conteritur, danturq; ex o terni cyathi triduo, dum tumor abunde deprimi ernatur. E fructu huiusce cucumeris, fit medicamentum quod elaterium vocatur, ad hunc modum: Decerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, Elaterii. seruantur nocte vna: postridie imposito supra craterem rariore cribro, vtrisque manibus prehensi, sigillatim supino cultro, sursum versus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in obiectum vas exprimitur: simulq; carnosum quod praesit cribro, quò facilius excidat, eliditur: quod ita pressum est, residere sinitur, atque in vicinam eluim demittitur. Coacervata autem in cribro gmina, dulci aqua perfunduntur, & denuò pres-

sa abijciuntur. Humor in pelui agitur, & linteo
 opertus, soli exponitur: dumq; steterit, tota superna
 tans aqua cum humore concreto, effunditur. Hoc
 verò identidem fieri solet, donec existens aqua lique
 scat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario
 suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt
 qui ad hauriendam protinus succi abundantiam,
 cribratos cineres humi inspargant, & medium ca
 uātes, triplicatum linteum obtendant, per quod ela
 terium cum sua humiditate diffundūt, siccaturq;
 in pila, vt dictum est, conterunt. Aliqui pro dulci
 aqua marinam perfundentes, ita eluunt. Alij in no
 uissima lotionē, mulsam aquam respergunt. Elate
 rium optimum esse constat, laue, non ponderosum,
 cum candore leniter humectum, gustu amarissi
 mum, quodq; lucernarū luminibus obiectum, faci
 le flagret. Porraceum tamē scabrumq;, si turbidum
 spectetur, atq; erui cinerisq; plenum sit, graue &
 vitiosum esse solet. Nec desunt, qui cucumis succo a
 mylum immisceant, vt candorem ipsum & leuita
 tem imitentur. A bimatu ad decemium detractioni
 bus vtile est. Integer modus, obolus est: minimus, se
 miobolus: pueris, chalci duo: siquidem copiosius, peri
 culum adfert. Bilem ac pituitam vtriusque parte ex
 trahit. Optima suspiriosis est purgatio. Quod si in
 animo sit detractionē moliri, adiecto salis duplo, &
 stibij quod colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitu
 dine catapotia dato, postea cyathus vnus aqua re
 pida

pida sorbeatur: ad citādas tamen vomitiones aqua diluens elaterium, subiectas lingue partes penitissimè penna oblinito: quòd si quisquam difficilius euomat, oleo aut vnguēto irino resoluito, somnum inhibeto. Porro his qui eximiè vacuantur, continuè vinum, & oleum dari conuenit: etenim vomendo restituntur. Quòd si vomitiones nō finiātur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachū densando corroborant, offerenda sunt. Cui elaterium menses, & partus enecat, in pēssō subditum: morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum, & diuturnis capitis doloribus liberat: efficacissimè anginis illinitur, cū vetere oleo, melle, aut felle taurino.

Staphis agria. CAP. CXXXVII.

Staphis agria, siue herba pedicularis, folia habet labruscæ, diuisa: & cauliculos rectos, molles nigrosq;: fert florem glāsti: & folliculos virides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluēcentem, intus album, gustu acrem. Grana quindecim, si trita in aqua mulsā dentur, crassum humorem per vomitū purgant: sed qui hauserunt, ambulare debent, prudenter tamen attendere oportet, & aquam mulsam continuò potui dare: quoniā pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita, phthiriasi prodest: item prurigini & psoris. Cit plurimam pituitam commanducata: decocta in aceto, dētiūm dolori, colluto ore, subuenit: rheu-

matissimum gingiuarū sistit: vlcera oris manantia, cum melle sanat. Vrētibus malagmatis imponitur.

Thapsia. CAP. CXXXVIII.

Thapsia nomen ideo accepit, quod in Thapso eiusdem nominis Insula, primum inuenta sit. Tota verò natura ferula similis est: graciliore caule: folijs feniculi: umbella anethi in cacumine, à singulis surculis erumpente: flore luteo: semen quale ferula, latiusculum, sed aliquanto minus: radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro vestita. Lactis extrahendi ratio hæc est: Facto in ambitu scrohe, cortices inciduntur: aut radix in fornicis speciem in se excavata, cooperitur, quò merus succus confluat: oportet illuc sequenti die se cõferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum expressus fictili crasso insolatur. Aliqui folium vñ terunt: sed inualidior huiusmodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui ab radice manavit, grauius olet, & humidus permanet: è folijs autem extractus, exiccatur, atq; teredinum iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus vento: aut potius, cum dies apricus est, & à flatu silet: quoniam ob halitus acrimoniam facies vehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustule: ob id prius liquido cerato, & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam cortex radices, quàm succus, purgandi vim habet,

¶

& lacteus succus in aqua malsa potus: nam utrūque bilem extrahunt. Radicis modus, quaterni oboli, cum tribus seminis anethi drachmis: succi, terni oboli: lactis, obolus unus: quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit suspensiosis, et diuturnis laterū doloribus, reiectionibusq; datur in cibis aut obsonio, quibus difficile sit vomere. Tam radix, quam succus omnium maxime, quæ pares cū eis vires adepta sunt, vim habent extractoriam ex alto, vbi ex imo aliquid euocandum est, aut meatuum laxitas aliò transferenda est: unde succus illitione, aut radix recens affricu, alopecias explent. Radix succusq; cum æquis cera thurisq; portionibus, sugillata luoresq; tollunt: sed nō plus binis horis dimittantur: locus deinde aqua maris calida foveatur. Vitia cutis in facie emendat, cū melle illitus succus: lepras tollit: tubercula discutit, perunctus cum sulphure. In diuturnis pulmonum, laterum, pedum, articularumq; valetudinibus utiliter illinitur. Valet ad integendum colic glandem, ijs qui natura, non circuncisione, curti sunt: tumorem enim excitat, qui pinguiū fotu emollitus, præputij iacturam resarcit.

A N N O T A T I O.

*Sine folijs. Spartiū, vt in agro Mōssessulano eius feracissimo sæpe obseruati (à G. Rondelletio eius loci clarissimo Medico primū admonitus) cū primū

erūpit, plurimis foliolis turget, quibus
 omnibus cū ad cōsistentiam perueniunt
 (quo solo fortassis tempore vīsum Dio-
 scoridi) exuitur, adeo vt ramuli eius iun-
 ceī deinde appareāt. Est tamē hoc diuer-
 sum planē ab eo, cui⁹ Plin. lib. xix. cap-
 i i. meminit. Cæterū an spartū hoc loco
 depīctū, sit idem cū Genīsta Latinorum
 malo equidē dubitare cū Plinio, quā-
 eorū iudicio subscribere, qui diuersi ge-
 neris plātas esse cōtendunt: & pro Genī-
 sta fruticē quendā rebus alligādīs (quo
 in illa tamen requirit Plinius, & Mar-
 in Georgicis cum lentam appellet, satīs
 innuit) parum idoneum ostendant.

Spartium.

CAP. CXXXIX.

Spartium frutex est, longas ferens virgas, & sine folijs firmas, fractu contumaces, quibus vi-
 res vinciuntur: semen lenticula, in folliculis phasio-
 lorum modo nascens: florem, vt albæ violæ, luteum.
 Purgant per superna vehementer, hellebori vice, ca-
 tra periculum flores, & semina, quinīs obolis in a-
 qua mulsā pota. Semen deiectionem mouet. Ram-
 in aqua maceratis, mox tussis, extractus succus
 ischiadici, & angina laborantibus auxiliatur,
 cyathi modū ieiuni bibant. Quidam marina aqua
 macerare malunt, & infundere ischiadicis clyste-
 re. strigmenta autem elicit cruenta.

S

LIBER QVARTVS.

379

Silybum.

CAP. CXL.

Silybon, lata spina est, folia ferens chamaeleonis albi. Hac recens cum sale oleoq. cocta estur. Radicis succus drachma pondere potus, vomitiones ficit.

Glans vnguentaria.

CAP. CXLI.

Glans vnguentaria, fructus est arboris myrica similis, magnitudine auellanae nuci, cuius nucleus gracarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad pretiosa vnguenta pro oleo vtuntur: nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudaeā. Praefertur plena, recens, cādida quae faciliē delibretur. Ea drachmaē pōdere pota, lienē absorbit: cū lolij farina, & aqua mulsa, podagricis illinitur: psoras leprasq; decocta in aceto, vitiligines & nigras cicatrices cum nitro, emēdat: & cū lotio lentigines, varot & papulas in facie: & cutis vitia tollit. Vomitiones mouet, & aluum cum hydromelite resoluit: stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu ciet. Cortex eius magis adstringit: verūm iusse & expressae succus abstergentibus medicamentis adijcitur, quae aduersus prurigines & scabritias idonea sunt.

Narcissus.

CAP. CXLII.

Narcissum sunt qui vt lilium, liriū appellarint, folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora: caulis vacuus, & sine folijs, supra dodrantem attollitur: flos albus, intus

Aa 5

croceus, in quibusdā purpureus: radix intus alb. rotunda, bulbosa: semen velut in tunica, nigrū, longum: probatissimus nascitur in montibus, suavi odore: ceteri porrum imitantur, atq; herbaceum v. rus olent. Radix cocta, siue estur siue bibitur, vomitoria est: ambustis igni prodest, cum exiguo mel trita: præcisos nervos illitu glutinat: luxatis malleolis, diuturnisq; articulorum doloribus, trita ex melle & imposta, subuenit: vitia cutis in facie, vitiliginesq; cum semine urticae, & aceto emaculat: c. eruo & melle, ulcerum sordes expurgat: abscessum rumpit concoctioni repugnantes: infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.

Hippophaës. CAP. CXLIII.

Hippophaës, quo fullones vestes interpolant. In sabulosis maritimisq; nascitur, surculaceo frutice, vndiq; denso & largo, folijs oleæ, longioribus, mollioribusq;: inter quæ cædicates spinæ emicant, siccae, angulosæ, interstiti quodam distantes flores hederæ corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes: radix lacteo succo madet, crassa, molli, amara gustanti: ex qua perinde ac thapsia, succus eximitur, qui per se, & cum erui farina subactus, siccatur, & ad vsum recoditur. Syncerus, pituitas, bilem, aquasq; detrahit, oboli pondere: eruo verò farina subactus, quatuor obolis, cū aqua mulsæ. Frutex cum radicibus siccatus iudicatur, & cum aqua

que mulse dimidia hemina tritus datur. Radice
herba liquamētum depromitur, vti in thapsia:
ius in purgationibus modus est drachma.

Hippophæstum. CAP. CXLIII.

Hippophæstum, id quod aliqui hippophaës ap-
pellant, nascitur eisdem locis quibus hippo-
phaës, estq; spinæ fulloniæ genus, humilis herba, si-
cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis:
lijs parvis, spinosis: radículas habens molles, cras-
sæ. Succus radice, folijs & capitulo exprimitur,
& exiccatur. Datus, cui voles, tribus obolis, in a-
qua mulsa, aquam pituitasq; detrahit: priuatim co-
stitalibus morbis, nervorū vitijs, & orthopnoxæ
inuenit huiusmodi purgatio.

Ricinus. CAP. CXLV.

Rici, aut croton, nomen accepit à ricini ani- Vulgò Cæ
malis similitudine: arbor provenit parvæ fi- taputia
s altitudine, folio platani, maiore, lautore, & ni maior.
iore: ramis, candidibusq; cauis, in arundinis mo-
m: semine in vuis asperis, quod corticibus exu-
m, ricinum animal repræsentat: ex quo oleum,
mine cicutinum, exprimitur, cibis fixum, lucer-
emplastrisque vtile. Grana triginta numero
rgata, trita potu, pituitas, bilem, aquamq; per
um extrahunt: vomitionesq; mouent, sed in-
cunda admodum est, & molesta purgatio: siqui-
m stomachum vehementer subuertit. Tusa &
posita, vitia cutis in facie, varosq; expurgat.

Fol

Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum
tumoresq; leniunt: rigentes mammas cohibent: e-
dem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.

Tithymali.

CAP. CXLV

Tithymali genera septem, quorum masculus
characias appellatur, ab aliquibus amygo-
lides: alter, myrtites, qui foemina existimat
eūq; myrsiniten aut caryiten vocant: tertius, pa-
lius, quē tithymalida appellarunt: alius, helio-
pius: quintus, cyparissias: sextus, dendroides: sep-
mus, platyphyllos dicitur. Characia caules sup-
cubiti altitudinē attolluntur, rubri, lacteo succo a-
acri madentes: folijs oleæ circum ramos, angustis
ribus, & longioribus: radice crassa, lignosa: pen-
in cacuminibus caulium, coma iunci, sub qua
neolæ soliolis balnearū similes, in quibus semen
tinetur: nascitur in asperis, & montibus. Succus
um purgat: trahit pituitam bilemq; binis ob-
in posca sumptis: & cum aqua mulsa, vomitio-
mouet. Appetente vindemiarum tempore, suc-
congestis ramulis, mox dissectis, & vase conc-
sis, excipitur. Aliqui adiungunt farinam erui,
in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem im-
pleant. Alij in aridas ficos, ternas quaternasve
tas instillant, ut cum his inarescant: quas ad re-
recondunt. Per se etiam tusus in pila, & in pas-
los coactus reponitur. Porro cum extrahitur,
neque quò ventus aspiret, stare quaxquam, neq;

LIBER QVARTVS. 383

mus oculis admouere conuenit: sed antequam
ligas, corpus, præsertim faciem, collum, scro-
nq; genitalis, adipe aut oleo cum vino perun-
e. Fauces autem exasperat: quapropter cata-
ia cera aut decocto melle oblini par est, & hoc
do lari: binas tamen ternasve ficos, purgatio-
gratia sumpsisse, satis est. Recēs lac ex oleo, per-
tos in sole capillos euellit, renascentesq; flauos,
exiles efficit: deniq; omnes perimit. Dentiū ca-
nis inclusum, leuat dolores: sed cera dentes obli-
ndi, ne suo delapsu, fauces & linguā vitiet. Tol-
illitu impetigines, formicantes verrucas, pēsiles,
quæ thymi florē representant. Valet aduersus
rygia, carbunculos, phagedenas vlcerum, gan-
euas, fistulasq;. Legitur semen autumnō, & sic-
um sole leuiter tunditur, seruē factūq; loco mun-
reponitur. Folia item siccantur. Semen & folia
lei succi effectum præbent, dimidio acetabulo
a. Sunt qui inueterant, admisto cum lacte lepi-
, & caseo contuso. Radix drachmæ pondere in
dromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum
eto, dentium dolcri auxiliatur, colluto ore.

Fœmina, quam myrsinitem, aut caryiten voca-
nt, similis suapte natura daphnoidi: folijs myr-
, sed maioribus, firmissis, in cacumine acutis, &
ngentibus: ramulos ab radice mittit doctanta-
fructum fert alternis annis, nuci similem, mor-
ci gustu. nascitur & hæc in asperis. Succus, ra-
dix,

dix, semen, folia, consimilem antedicto sortiuntur
cultatem: sed ad citādas vomitiones invalidior
est. Aliud tithymali genus dicitur paralios, quod
tithymalida, aut mecona aliqui appellauere: na-
tur in maritimis, ramis subrubentibus, palmum
in, quinis senisve à radice exeuntibus: folijs lini,
gustis paruis, oblongis, in versus quosdam digesti
capite in cacumine orbiculato, in quo semen, ut
unum, vario colore emicat: flos albus. Frutex tot
cum radice lacteo succo turget. Similes ad vsus
conditur. Helioscopius dicitur, folijs portulacæ,
nuioribus, rotundioribusq;: ramulis prodeuntibus
à radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodra-
ntali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: cap-
anetbi: semine velut in capitulis incluso: Heliosco-
pion nomen accepit, quoniam comas cum sole circun-
agat: circa oppida nascitur, potissimum in ruderi-
bus. Colligitur succus semenq;: ut aliorum. Eade-
que superioribus vires, non tamē vsq; adeo valide

Ciparistas in caulem exit dodrantalem, vel m-
iorem, subrubrum: ex quo folia piceæ similitudine
exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora: & i-
totum nascentem piceam emulatur, unde nome-
traxit. Candido succo madet, cui eadem vis qua
superioribus. In petris nascens, dendroides cognomi-
natur. ampliter opacat, in cacumine frondosam
spargens comam, succo lacteo prægnans, cauliculis
rubentibus folijs myrti tenuioris: fructu characia

Ei

LIBER QVARTVS. 389

usdem effectus, cuius superiores, similiq; modo
conditur. Platyphyllos, verbasco similis est. Ra-
ce, succus, & folia, per inferna trahunt aquas. Pi-
s nccat, tusus, & aqua insparsus. Reliqua tithy-
alorū genera quæ suprà scribuntur, idem efficiunt.

Pityusa. CAP. CXLVII.

Itysam specie à cyparissia differre constat,
etsi tithymalorum generi assignetur. caulis
ora cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: fo-
piceæ, acutis, exilibus: flore paruo, velut pur-
reo: semine instar lenticulæ, lato: radice crassa,
nidida, succo referta, quibusdam in locis frutex
prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum ra-
ce, drachmis duabus data in aqua mulsæ: item se-
minis drachma: succi cum farina subacti cochlea-
um, in catapotio datur: modus foliorum drach-
e tres.

Lathyris. CAP. CXLVIII.

Athyris, quam aliqui tithymalum appellant, Officinis
eamque tithymalorum numero adscribunt, Cataputia
olem emittit cubiti altitudine, & digitali cras- minor.
udine, inanem: gignuntur in cacumine alæ, &
ia in caule oblonga, amygdalinis proxima, la-
ra, & leuora: quæ autem in summis ramulis
ierunt, minora conspiciuntur, aristolochiæ, aut
longæ hederæ figura. In cacumine fructum sum-
s surculis gerit, triplici loculamento insignem,
undum, ceu capparin, in quo grana inter-

CHD

curvantibus membranis inter se distincta continentur, eruis maiora, rotunda: quæ dum corticibus exuntur, candida sunt, & gustu dulcia: Nullus radicis usus. totus frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Grana sex aut septem in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, aluum purgant: sed aqua frigida postea sorbenda: trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. Succus, tithymali modo exceptus eundem effectum præbet. Cum gallinaceo aut olei bus folia decoquuntur adeo sdem effectus.

Peplus.

CAP. CXLIX.

Peplos frutex est lactei succi plenus, folijs paruis, ut ruta, paulo latioribus: rotunda comæ ferè dodrantali, humi respersa: semine sub folijs rotundo, minore quam candidi papaueris: pluribus scitet auxilijs. vnicam radicem habet, supernuacua ex qua fruticat: nascitur inter vites, & in hortis. Colligitur messibus: siccatur in umbra, & continue versatur. Fructus tussis & feruescentis reconditur. Bilis ac pituita detrahatur, acetabulo eius in hydromelitis cyatho poto: obsonijs inspersa conturbat aluum: muria conditur.

Peplis.

CAP. CL.

Pepelis, quam aliqui syluestrem portulacam vocant, Hippocrates peplion, in maritimis maximè nascitur, late opaco frutice: candidi succi pleno: folijs satiuæ portulacæ, rotundis, inferne rubentibus: semine sub folijs rotundo, uti in peplo

peplo, feruente gustu: radice singulari, superuacua,
enui. Colligi, & reponi ac dari, vti peplos, & sale
condiri solet. Easdem habet vires.

Chamæsyca.

CAP. CLI.

Chamæsycaen aliqui sycen nominant. ramos e-
mittit quaternum digitorum, teretes, succosos, in
errâ deiectos: folia lentis, parua, peplo, planè refe-
rentia, tenuia, quæ à terra nõ attolluntur: semine sub
folijs rotundo, vt in peplo: neq; caulem, neq; florẽ pro-
nit: radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex
vino triti vuluæ dolores sedant, in pessa appositi: tol-
unt tumores ac verrucas omnium generum illiti: de-
doctorum cibo, aluus resoluitur. Succus simili effectus
prodest: illitus contra scorpionis ictum auxiliatur:
duersus caligines oculorum utilis, & hebetudines,
incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle
unctus. In squallidis petrosisq; nascitur.

Scammonia.

CAP. CLII.

Scammonia, ramos abvna radice emittit trium
digitorum, multos, pingues, & qui nonnihil
crassitudinis præ se ferant: folijs helxinae, aut he-
ræceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangu-
laribus: flore candido, rotundo, in calathi modum ca-
pitato, graneolente: radice prælonga, crassitudine cu-
cumeris, candida, graui odore, succo grauida. Legi-
tur ad hunc modum succus: Capite exempto, radice
testitudinis speciem cultro excanatur, quo fit vt
cauum confluat succus, qui conchis demum ex-

cipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fo-
 diunt, in quos subiectis ingladij folijs: profundum
 succu, siccatumq; extrahunt. Laudatur autē scam-
 monium leue, nitidum, rarum, & colore quam si-
 millimum taurino glutini, fungosum, tenuius si-
 stulis, quale ex Mysia regione Asiae deportatur. Ne
 attendere solu par est, si linguae tactu albescat (ho-
 enim euenit adulterato, quod admisto fit tithymal-
 lacte) sed longe magis antea narratis. item si non
 vehementer lingua exurat, id quod misti tithymal-
 argumentum est. Natione autem Syriacū & Iu-
 daicum deterrima habentur, graua, densa, erui fi-
 rina & tithymalo vitata. Succus drachmae vniu-
 aut quaternū obolorum pōdere haustus, ex aqua
 pura vel mulsa, per inferna bilem & pituitā ex-
 trahit. Ad resoluendā aluum binos obolos cum sesa-
 ma, aliōve semine, sumpsisse satis est. Dantur effica-
 cioris purgationis causa, succi tres oboli, cū duobus
 veratri nigri & aloēs drachma vna. Fiunt purga-
 torij sales, drachmis viginti succi scamoniæ, in se-
 nos salis cyathos adiectis. Horum modus proportio-
 ne viriū: integer quidem, tria cochlearia: medius
 duo: minimus, vnu. Radicis drachma vna aut al-
 zera purgat, cum ijs quæ retulimus. Nonnulli deco-
 Etum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cū ho-
 deacea farina teritur, cataplasmate ischiadicis vti-
 li. Partus enecat succus, vuluæ in lana subditus: tu-
 bereula discutit cum melle aut oleo illitus: decoctio

in

In aceto peruncta lepra abeguntur: diuturni capi-
tis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

Chamelæa.

CAP. CLIII.

Officinæ

CHamelæa surculosa fruticat, ramis dodran-
talibus: folia oleæ similitudinem habent, te-
nuiora & amara, quæ gustata linguam mordet,
& arteriam deradunt. Detrahit pituitâ bilemque,
folijs præsertim in catapotio deuoratis: nanque
lucæ absinthij partes, adiecta, chamelæa vna, hy-
lromelite excipiuntur, & in catapotia coguntur:
illa autem in ventre non liquescunt: siquidem quot-
quot fuere deuorata, regeruntur. Folijs cum melle
ritis sordida vlcera & crustosa repurgantur.

Thymelæa.

CAP. CLIIII.

Granum

Gnidium.

THymelæa est, qua granum gnidium, quod
est semen ipsius, colligitur. Hoc Syri apo-
linum vocant, quoniam satiui lini frutex suapte
natura similitudinem referat. Virgas ædit per-
pulchras, multas, tenues, binum cubitorum altitu-
line: folijs chamelææ, angustioribus, & pingui-
oribus, viscosis, gummosisque, si mordeantur: flore
andido: fructu myrti in modum rotundo, qui in-
ter initia viret, & tandem rubescit: inuolucrum fru-
tus durum, foris nigrum, intus album. Hoc per-
nferna bilem, pituitam, aquasque detrahit, si vi-
nti granorum pars interna bibatur: verum fau-
es adurit. Itaque cum farina aut polenta, aut in vna
icino dari debet, aut melle cocto obductum deuor-

rari. Qui agrè desudant, trito semine cum nitro et aceto, inunguntur. Folia quæ peculiariter cneorū appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recodi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere convenit. Illitum acetabuli modo cum diluta vini portione, aquam extrahit: mediocrius purgat, addita lente cocta, aut contritis oleribus. Thymelæa farina vnae acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta, partus imposita necat. Nasitur in montibus et asperis. Hallucinatur, qui coccon gnidium fructū esse chameleæ existimant, decepti quadalā foliorum similitudine.

Sambucus.

CAP. CLV.

Sambuci duo genera: vñ in arborem assurgit, surculos spargens arūdinaceos, teretes, cauos, cādicantes, proceros: folia iuglādis, terna quaternave, ex intervallis circa ramos exeūt, grauiā odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorū cacuminibus cauliculisq; circinate umbellæ, quæ florē candidum pariunt, mox acinū terebintho similem, in nigredine suppurpureū, racemosum, succo madentem, vinosumq;. Alterū genus, Chameactē vocatur, Romanis ebullū, longè humilius est, magisq; herbaceo generi assignandū, caule quadrāgulo, geniculato: folijs amygdalæ, ex intervallo lōgioribus, geniculatim expansis, pinnatisq;, graueolentibus, in ambitu seruatis: muscario sambuci: flore & acino eiusdem
rad

LIBER QVARTVS. 391

radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem
vtriusque vis, & vsus exiccans, aluo detrahens
aquam, stomacho inutilis. Folia, olerum more co-
quuntur, ad pituitam bilemque detrahendam. Cau-
les teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix
in vino decocta, & in cibis data, hydropicos adiu-
uat: prodest viperarum morsibus, eodem pota mo-
do: vulvas emollit insidentium decocto, patefacit
earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino
poti eodem funguntur munere: denigrant capil-
los illiti. Folia, si prætenera ac mollia ex polenta
illinantur, inflammationem mitigant: ambustis
& canis morsibus illitu prosunt: vlcera quæ dehi-
scent in fistulam, agglutinant: ijs qui podagra
tentantur, cum seuo taurino aut hircino prosunt
illita folia.

Picnocomum. CAP. CLVI.

Picnocomon constat eruce folijs, acrioribus,
scabris & crassis: caule quadrangulo: flore
cymy: semine marrubij: radice nigra, aut palli-
da, rotunda, exigui mali figura, terram redolente:
nuenitur in saxosis locis. Semen graui somnia
& tumultuosa facit, drachmæ instar potum: tu-
nores discutit, illitum cum polenta, & spicula, ad-
ictosque corpori aculeos, extrahit. Folia illitu tu-
ercula, panosque discutiunt. Radix eius in aqua
nulsæ duum drachmarum pondere, aluum soluit
& bilem extrahit.

Apios.

CAP. CLVII.

Apios ramulos duos siue tres iunceos spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur: folijs ruta, oblongioribus tamen & angustioribus, herbaceis semine paruo, radice * hastulae regiae, in formã pyri turbinata, rotundiore tamẽ, succi fecunda, intus habet corpus candidũ, extra cortices nigros. Superior pars eius vomitione bilẽ pituitasq; extrahit: inferior, per aluum: tota vtrinq; purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix in fictili mergitur, & agitata aqua, quod supernatat penna selectum, exiccatur. Purgat vtraque parte is succus, sesquiobolo potus.

Colocynthis.

CAP. CLVIII.

Coloquin-
tida offici-
nis.

Colocynthis sarmẽta foliaq; satini cucumeri. Emittit per terram repentia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilae conglomeratũ, vehementer amarum: quem legere oportet, cum cœperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriã vim habet, si quatuor oboli cũ aqua mulsamelle cocto, myrrha & nitro excipiantur, & coquantur in catapotiu. Arefactae pilae teruntur, & in fusae clysteribus pro sunt neruorũ resolutioni, coxædum doloribus, & coli vitijs, vt quæ bilem, pituitam & strigmẽta, interdũ etiã cruorem eliciamfactus admota enecant: dentium dolorem tollit, vna repurget, et luto oblita cũ aceto & nitro infuescat, hocq; iure decocti dentes colluantur: si aqua

mi

mulsa aut passum in eadem incoquatur, & sub di-
uo refrigerat, potu crassum humore & strigmēta
alui detrahet: stomacho supra modum aduersatur:
subdita ex ea balano, alui excrementa eijciuntur.
Virentis succo vtilissimè ischiadici perfricantur.

Epithymum.

CAP. CLIX.

E Pithymon, flos est è thymo duriore, satureia. Aliud à no-
simili: capitula habet tenuia, & leuia, & in stro Epi-
eis candiculas, quasi capillamenta. Potum cum thymo-
melle detrahit pituitam bilemque atram, per infer-
na. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis,
acetabuli mensura, ad quatuor drachmas, cum
melle, sale, & aceti exiguo. Plurimum in Cappado-
dia & Pamphylia gignitur.

Alypum.

CAP. CLX.

A Lypon surculosa herba est, subrubra: graci-
libus rariulis: tenuibus folijs, flore molli, le-
ui, & copioso: radice betæ, tenui, referta acris suc-
co: semine epithymi: gignitur in maritimis, maxi-
mè Libyæ, quam largissima: quanquā alibi quoque
plurima prouenit. Semen atrā bilem deijcit, si men-
sura epithymo pari cum sale & aceto sumatur: ve-
rū interanea leuiter exulcerat.

Empetrum seu calcifraga.

CAP. CLXI.

E Mpetron aliqui * phacoides vocant, nasci-
tur in montibus, & maritimis, salso gustu: prasoides.
sed quo propius terreno fuerit, amarius sentitur.

Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur iure aliquo, aut hydromelite.

Vitis sylvestris.

CAP. CLXI

Vitis sylvestris sarmenta vitis modo praelongamittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, foliis hortenſis foliis, longioribus ac latioribus: musco flore, & capillaceo: fructu exiguis uvis simili, per maturitatem rubente: rotunda est acinorum facies. Feruefacta radix in aqua, & in cyathis dulcis vini aqua marina diluti, pota, humorem allicit: ideo hydropicis datur. Vuae eius, vitia cutis in facie, & maculas omnes expurgant. Enascentes tuniculae, cibi gratia, sale conduntur.

Officinis

Vitis alba.

CAP. CLXIII.

Bryonia.

Vitis alba aliqui bryoniam vocant. Foliis, viticulis, papinisque, sativam vite imitatur, sed hirsutiora sunt omnia: ea quos prope se nata sit frutices, suis claviculis complectitur: fructus rubens in vva dependet, quo coria pilis spoliatur. Ex ea asperagi, qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo alium & urinam cient. Folia, fructus, radix, acrimiam fortiuntur: itaque ulcerum phagedenis, gangraenis, chironis putrentium tibiariu tadio, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat. vitia cutis in facie, varosque, lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta Chia, & facinograceo. Eodem effectu prodest decocta in oleo, usque dum liqueſcat: sugillata tollit, & redunias

com

ommittit: inflamationes discutit illita ex vino: sup-
 urationes rumpit: medicamēto aptè immiscetur,
 quod carnē exest: infracta ossa extrahit, trita et im-
 posita. Datur comitialibus in potu drachmæ ponde-
 re, quotidie, anno toto. Prodest attonitis, & vertigi-
 bus, & laborantibus, cōsimiliter assumpta. Cōtra viperæ
 um ictus pota drachmis duabus, auxiliatur: par-
 us necat: mentē interdum subvertat: foeminarū lo-
 nis apposita, partus secundasq; morātes trahit: cit-
 rinā pota. Eclegma ex ea fit cum melle, difficile
 viratibus, strangulatu oppressis, tussietibus, vulsis,
 ruptis, & laterū doloribus. Lienem ternis obolis po-
 ta ex aceto, triginta diebus, consumit: illinitur ad ea-
 dem cum fico. Ad muliebres infusus decoquitur: si-
 uidē vulvas purgat, sed abortū facit. Succus è ra-
 dice vere exprimitur, qui trahit pituitam, cum
 qua mulsa potus. Ad psoras & lepras, semen effi-
 ciciter illinitur. Lactis abundantiam facit succus
 us, si cum tritico decocto sorbeatur.

Vitis nigra. CAP. CLXIII.

Nigra vitis, quam aliqui nigram bryoniam
 vocant, folia fert hedera, smilaceis proxi-
 ma, sed maiora: caules etiam cognatos: capreolis
 is arbores, quasi adminicula, comprehendit:
 uctus racematim coherent, qui inter principia
 irent, & post maturitatem nigrescunt: radix fo-
 is nigra, intus buxæ colore. Viticulae quæ pri-
 o germinum partu erumpunt, in olera recipiunt

tur: menses pellunt urinas cient, lienem absumunt
vertiginosis, comitialibus, nervorum resolutio
tentatur, prosunt. Radix eadem, quæ vitis alba p
stat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis
mentorum cervicibus commodissimè illinuntur. l
xat is itidem imponitur.

Filix.

CAP. CLXV.

Filici folia sine caule, sine fructu, sine flori
ex vno pediculo, cubitali longitudine exeu
multifida, et lateribus pennata, subgravi odore: r
dice per summa cæspiti nigra, oblonga, silices m
tas fundente, subastringente gustu: nascitur in m
tibus, & saxosis. Radix latus tinea excutit, sur
pta drachmis quatuor ex aqua mulsa: melius si
scammonia aut veratri nigri totidem obolis detu
sed qui sumunt, allia prægustare debent. Laboranti
lienens incremento recreat. Radix & potu & illi
cū axungia vulneribus sagitta arundinea factis, &
auxilio: cuius rei probatio talis fertur: Peribit fili
quæ per ambitum sata copiosior arundo coronet:
contra, euanesceat abibit arundo, quam obsepier
multa filix in orbem cinxerit. Filix fœmina foli
est filicis, surculosis, altioribusq; & quæ non sin
gulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicibus lon
gis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flai
scunt: aliquæ etiamnum rubræ inveniuntur. Pe
lunt lata interaneorum animalia, cum melle, eeli
gmate sumpto: pota cum vino, drachmis tribu

retes tineas eijciunt: data feminis, sterilitatem fa-
ciunt, & prægnantibus abortum, si superegredian-
tur. Farina humidis vlceribus & cicatrici repu-
nantibus inspargitur: iumentorū cernicibus me-
tetur. Folia recentia, in oleribus cocta māduntur,
et ventrem emolliant.

Filicula, siue polypodium.

CAP. CLXVI.

Filicula nascitur in muscosis petris, & vetu-
stis arborum caudicibus, præsertim quercuīs,
almi altitudine, filici similis, subhirsuta, non
enui perinde diuisura: radix pilosa, in qua con-
inentur cirri, ceu polyporum, crassitudine digiti
minimi, coloris intus herbacei, austera aliquan-
tum, & gustu subdulcis. Purgandi vim habet: co-
quitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut
malua, ad aluum soluendum. Arida farina aquæ
mulse insparſa, detrahit bilem & pituitam: trita
uxatis efficaciter illinitur, & aduersus rimas quæ
inter digitos fiunt.

Dryopteris.

CAP. CLXVII.

Dryopteris nascitur in veterum roborum
musco, filici similis, multo minore foliorum
incisura: radicibus inuicem implexis, hirsutis, gu-
stu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Psilothrū
est cum radicibus trita: illinitur enim primū
usque dum sudorem euocet, mox sudor abluatur, &
recens imponitur.

Cui

Cnicus.

CAP. CLXVII

Officinis
Cartamus

CNicus folijs constat oblongis, per ambitū dissis, asperis, spinosis: caule sesquipedali: capitulo magnitudine gradis oliuæ: flore croci: semine candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore obsonijs vtuntur. Seminis tusi & expressi succum cum aqua mulsa, vel iure gallinæ aluum purgat, sed stomacho aduersatur. Ex eo autē fiunt offiæ, quas placentulas vocant, adiectis succo amygdalis, nitro, aniso, et melle decocto, quæ aluum emolliunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucjuglandis magnitudinem impleant: è quibus antecenam duas vel tres sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est: Cnici candidi sextarius, amygdalorum tostorum et delibratorum cyathi tres, anisi sextarius unus, aphronitri drachma una, cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendæ alui facultate donat.

Mercurialis.

CAP. CLXIX.

Lynozaotis, aliqui parthenion, alij hermubotanion appellant: folijs constat ocymi, helxine cognatis, sed minoribus: ramulis duplici geniculorum nodo cinctis, alarum cauis multis: fructu frumina, copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari, è foliorum sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis una coherentibus. frutice dodrantali aut maiore. Vtraque in oleribus manditur, ad aluum ciendam: cocta in aqua,

epo

oto iure, bilem aquamq; detrahit. Constat ut
ares gignantur, hunc facere: ut femina, illā, si a
rgatione bibatur, & trita folia genitalibus ad-
oueantur.

Cynocrambe. CAP. CLXX.

Cynia aut cynocrambe, cauliculum binum do-
drantum altitudine emittit, mollem, subalbi-
m folia mercuriali aut hederæ similia, certis in-
stitijs suballida: semen folijs adheret, paruum,
tundum. Folia cum caulibus pota, aluum cient:
ribus commendantur. Ius decocti & pituitam
bilem aquamq; detrahit.

Heliotropium CAP. CLXXI.

Heliotropio magno flos est effigie scorpionis
cauda, unde scorpium ei nomen: & quoniā
ia cū sole circumagat, heliotropion dicitur. Folia
ymia habet, hirsutiora, cādidiora, & maiora: ra-
uli à radice terni, quaterni, aut saepe quini exi-
unt, multis alijs cōcaui: flos in cacumine cādidus,
t subfuluus incuruatur ut scorpionis cauda: ra-
e tenuis est, & inutilis: nascitur in asperis. De-
tū herbe ex aqua, fasciculo manus plenæ, potus
uitā bilemq; per alium extrahit: cōtra scorpionū
us ex vino potū, et illitū prodest: adalligatur ad
ceptus arcēdos. Aiunt per horā vnā ante accessio-
s, seminis grana quatuor cū vino quartanas fini-
: tria verò, tertianas. Illitum semen formicantes
rrucas pensilesq; et thymos, & epinyctidas exie-
cat.

cat. Folia infantium destillationibus, quas syri
 seis vocant, podagris, luxatisq; vtilissime illinun-
 tur menses cient: partus trita & imposita pellunt.
 Heliotropion paruum, nascitur in palustribus
 iuxta lacus, folijs antedicto proximis, rotundioribus:
 semine, acrochordonum verrucarum modum
 pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota, ac
 recto nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua, latas t
 weas teretesq; excutit. Pensiles verrucas, quæ acro-
 chordones vocantur, cum sale illita tollit.

Scorpioides herbula est, folijs paucis,
 semine caudæ scorpionis effigie.

Illita scorpionum ictibus
 presentaneo est
 auxilio.

QVARTI LIBRI
 FINIS.

PEDANI
DIOSCORIDIS
ANAZARBEI, DE
Medicinali materia,
Liber V.

Ioanne RVELLIO Sueſſionenſi
interprete.

Superioribus quatuor libris, amicissime
Aree, tradidimus de aromatibus, oleis,
unguentis, & earundem lacrymis ac
fructibus: item animalibus, melle, la-
dipe, cerealibus, oleribus, necnon de omni radi-
um, herbarum, succorum, seminumq; ratione. In
autem totius operis quinto differemus de vi-
& metallicis, à vite nostram commentatio-
nem auspiciati.

Vitis vinifera.

C A P. I.

Olia vitium & triti capreoli, capitis dolo-
res illitu mitigant, & inflammationem sto-
machi ardoremq; cum polenta: folia etiam per
ut quæ refrigerent & adstringant, imponi so-
let. Potus eorū succus dysentericis, sanguinem ex-
antibus, stomachicis, & gravidarum malaciæ
edetur. Eadem efficiunt madefacti in aqua capreo
& poti. Lacryma vitium, quæ veluti gummi
candicibus concreſcit, ex vino pota calculos
pellit:

pellit: illita lichenas & psoras leprasq; nitro prius
 perfrictas sanat: eadem cum oleo sæpius pilis illi-
 tis, psilothri effectū habet: maximeq; sanies, quam
 accensa sarmenta vitium viridia exudarunt: qua
 & peruncta verrucarum infornicationes extra-
 huntur. Cinis sarmentorum & vinaceorum, de-
 tractis in sede condylomatis, & thymis, illitus ex
 aceto medetur: prodest luxatis & viperarum mor-
 sibus: contra lienis inflammationem illinitur, cum
 rosaceo & ruta & aceto. Labrusca duorum gene-
 rum est: alterius vva non maturescit, sed flore te-
 nus cenanthen nominatam perducit. Altera ad fru-
 gem peruenit, parvis acinis, nigra, & adstringēs.
 Folia, caules, & clauicula quibus repunt, vim ha-
 bent culte viti similem.

Vua.

CAP. II.

Vvæ recentes aluum turbant, & stomachum
 inflant: innocentiores, quæ decerptæ diu pe-
 pendere, (ideo quod in eis copia humoris exicca-
 tur) vtilisq; sunt stomacho, ægrisq;, atque cibi
 auditatem excitant. In vinaceis & ollis seruata,
 ori & stomacho gratæ sunt: aluum sistunt. (sed
 vesicam & caput tentant) & sanguinem excre-
 tantibus conueniunt. Similesq;, quæ in musto fue-
 re. Sapa aut passio condita, stomachum magis in-
 festant. At quæ solem prius passæ in aqua cæle-
 sti conduntur, minus vinosæ sunt, siticulosi, ar-
 dentibus & longis febribus salubres. Reconditi

vin

LIBER QUINTVS. 403

vinacei inflammatis mammis, rigentibus ac præ-
 turis, cum sale illinuntur: decoctura eorum dysen-
 tericos, celiacos, & fœminas fluxione vuluæ labo-
 antes iuuat infusa: ad defeciones, ac fœtus assumi-
 ur. Nuclei acinorum adstringendi vim obtinent,
 stomacho vtilis sunt: inspargitur farina testorum,
 dolente modo, dysentericis, & celiacis, & solutis
 stomacho. Vua passa alba adstringentior est: pro-
 est esitata caro earum tussi, faucibus, renibus, ac
 vesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis: &
 decocta in patinis cum melle, admixta milij ac hor-
 dei farina & ouo, valet ad purgandum caput: eius-
 demq; gratia cum pipere commanducatur. Testis
 inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum,
 ut cumini farina. Fauos, epinyctidas, carbunculos,
 uelut in articulis putredines, & gangrenas, sine
 nucleis trita, & cum ruta imposita sanat: podagræ
 inuenienter cum panacis succo illinuntur: mobiles
 ngues illita, celerius extrahit.

Oenanthe. CAP. III.

Oenanthe vocatur vitis sylvestris fructus,
 cum floret. Recondi debet fictili non picato,
 collectaq; substrato linteo, in umbra siccatur. Lau-
 atissima in Syria & Cilicia & Phœnice. Vis es-
 t strictoria: quare pota stomacho ac ciuicæ urinae
 utilis: aluum sistit, ac sanguinis excreationes: con-
 tra fastidia, & acorem stomachi, sicca & illita
 ficax est: capitis doloribus tam viridis, quam sic-

Cc

ca, ex aceto & rosaceo perfunditur. sanguinolenta
vulnera cataplasmate, & incipiētes agilopas, ori
ulcera, & genitalium nomas, trita cum melle, cro
co, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione vindi
cat: pessis miscetur, ad sistendum sanguinem: contri
oculorum delacrymationem, & stomachi ardores
cum polline polentæ & vino illinitur. Cinis crem
tæ in testâ, candentibus prunis, facit ad oculorum
medicamenta: reduvias & pterygia, abscedētes gi
giuas, cruentasq; cum melle sanat.

Omphacium. CAP. IIII.

Omphacion, succus est acerbæ vuæ, nondun
maturescētis, è Thasia vite aut Aminæa
Oportet autem ante Canis ortum, expressam mel
liginem in rubro ære, linteo cooperto, insolare, vj
que dum cogatur, semperq; quod cervici vasis con
cretum hæsit, reliquo humori permiscere: noctuq;
à subdialibus locis in lectum referre: quandoqui
dem nocturni rores ipsum concrefcere non sinunt
Eligendum est flauum, friabile, vehementer ad
stringens, & linguam mordens. Sunt qui coquen
do melliginem cogant. Prodest contra tonsillas, v
uam, ulcera oris, humida gingivarum vitia, puru
lentas aureis, cum melle aut passō: item ad fistulas
vetera ulcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis, &
mulieribus fluxione vuluæ laborantibus clyster
infunditur: oculorum claritati, & scabritiæ, &
erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad rece
ter

tem sanguinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat: sed paucio, & aquatior est vten-
lum: valde siquidem exurit.

Vini natura.

CAP. V.

VIno vetere nervi læduntur & reliqui sensus, quod tamen gustu suavius est: quare cauendum ijs qui intestinae alicuius partis imbecillitate sentiunt. Attamen in secunda valetudine paucum, aqua dilutum, innoxie sumitur. Nouum inflat, agere coquitur, insomnia parit graua, & vrinam ciet. Etate mediū, vtraq; vitia fugit: quare ad victus sanorum egrorumq; usurpatur. Album, tenue, stomacho vtile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum verò, crassum est, & concoctu difficile, arnem alit, & ebrietatem creat. Gilium, utpote modum medium est, medias inter vtrunq; vires habet: in secunda tamen & sinistra valetudine, cum rimis laudatur album. Quin & vina sapore distat: siquidem dulce crassis partibus constat, & difficilius à corpore expirat: stomachum inflat: aluum & interanea, ut mustum, turbat: sed nimis ineriorat. renibus, & vesicæ aptissimum. Austerū, per urinam celerius transit: sed capita dolore tētat, & emulentiā gignit. Acerbū, ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum, & eteras fluxiones cohibet, minusq; urinā expellit. nouum nervos minus tentat. Vinum aqua marina ictum, stomacho aduersatur: sitim stimulat, ner-

uos infestat, aluo aptum, à valetudine se recolligit
 tibus inutile. Passum, quodvuis sole siccatis in are
 aut in sarmento torrefactis exprimitur, Creticu
 cognomine, aut pramnion, aut protropon: & sa
 quæ fit musto igni decocto, Græci sirion aut hep
 ma appellant: nigra quidem, & quæ dicunt
 melampsithia, crassa sunt, & corpora multum
 lunt: candidum, tenuius: & heluola inter hæc m
 dia, medias sortiuntur vires. Omnia tamen a
 stringunt, & pulsus reuocant: faciunt aduersus v
 nena, quæ exulcerando necant, ex oleo pota, &
 mitionibus reddita: contra cicutas, meconium, pi
 ricon, toxica & concretum in grumos lac: ite co
 tra renum, ac vesicæ pruritus, rosiones, exulcer
 tionesq;. Inflant tamen, & stomacho aduersantur
 Priuatim, prodest melampsithium, si venter rbe
 matismum sentiat. Album, magis cæteris emolu
 aluum. Gipso conditum nervis officit, caput aggra
 uat, & incendit, ac vesicæ aduersatur: contra v
 nena cæteris aptius. Picata, aut resinata, excalfa
 ciunt, concoquunt: sanguinem excreantibus inimi
 ca. Quæ verò aparachyta vocant, vt quæ adm
 stam sapam recipiunt, caput implent, temulentiam
 gignunt, ægrius in halitum expirant, stomachum
 malè habent. Inter Italica vina Falernum prin
 cipem locum obtinet, quod inueteratum perquân
 facilè coquitur, pulsus exuscitat, aluum adstrin
 git, stomacho vtile: sed vesicæ nocet, atque ijs qu
 visu

isus hebetudinem sentiunt, & ad potus crebros
minimè idoneum. Albana crassioribus constant
artibus, dulcia: stomachum inflant, ventrem emol-
unt (sed concoctionem non aequè adiuvant,) &
peruosa minus infestant: vetustate, eadem auste-
rum saporem concipiunt. Cecubum, cum sit dulce,
& Albano crassius: corpus & colorem alit: æ-
rè tamen coquitur. Surrentinum, valde austerum
est: quare intestinorum & stomachi fluxiones co-
hibet, & cum tenue sit, caput minus tentat: inue-
ratum suavius redditur, & stomacho vtile. A-
rianum & Mamertinum in Sicilia aequè crassis
artibus gignuntur: modicè adstringunt, & ocu-
lè inueterantur, minusq; , ob suam tenuitatem,
nervos tentant. Parætypianum, quod ex Adriatico
defertur, odoratum ac tenuius est: quare libe-
raliter epotum fallit, diu seruat ebrietatem, & so-
rem adfert. Istricum Parætypiano simile est, sed
vinam vehementius pellit. Chium tamen antedi-
is mollius, & aptum potui est: bene alit, & mi-
us inebriat, fluxiones cohibet, oculorum medica-
entis vtile. Lesbium facile membra subit, Chio
uius, & aluo idoneum. Ephesium eandem vim
habet, quod Phygelites nominatur: verùm Asia-
um è Tmolo monte, Mesogites appellatum, capitis
lores ciet, & nervos lacidit. Coum verò & Cla-
memum, quoniam multam sibi maris aquam
inducant, facile corrumpuntur: flatus mouent,

alium turbant, nervis officiunt. Vinum omne (ut
 reliqua in commune dicantur) merum ac synce-
 rum, & sua natura austerum, excalfacit, facile in
 membra distribuitur, stomachum adiuuat, appe-
 titiam ciborum inuitat, vires alit, ac robur auget.
 somnum conciliat, & commendat colorem. Potum
 liberalius auxilio est contra assumptam cicutā, co-
 riandrum, pharicum, ixiā, meconium, argēti spu-
 mum, taxum, aconita, fungosve: contra serpentium
 morsus, & omnium ictus quæ refrigerando necant,
 aut stomachum in vomitiones effundunt. Facit ac
 longas inflationes, rosionesque precordiorum, ac di-
 stentiones, stomachi resolutionē, & si venter aut in-
 teranea rheumatismum sentiant. Conueniunt suda-
 toribus, & quibus corpus immodico sudore digeri-
 tur, maximè alba, vetera, & odorata. Quæ tamen
 vetustate dulcescunt, renibus ac vesicæ accommoda-
 tiora redduntur: vulneribus, inflammationibusque
 in succida lana imponuntur: tetra vlcera, & pha-
 gedænica, & fluxionibus obnoxia, comodè perfun-
 duntur. Quæ marinam non receperunt, austera &
 alba, ad sanorum victus vsurpantur. In his præ-
 stant Italica, Falernum, Surrentinum, Cecubum,
 Signinum, & permulta Campaniæ, & Parety-
 pianum ab Adriatico sinu, & Siculum quod Ma-
 mertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Lesbium, &
 Phygelites ex Epheso. Crassa verò & nigra, sto-
 macho negotium exhibent, inflationem pariunt, cor-
 pus

us augment. Tenuia tamen & auſtera ſtomacho
roſunt, & minus carnes alunt. Vetera valde te-
nia, & candida vehementius vrinã ciunt, & do-
res capitis mouent, neruoſq; largius pota tentãt.
a media etate, vt à ſeptimo anno, potui ſaluberri-
a ſunt. Modus autem pro etate, & tempore an-
, & conſuetudine, & qualitate vini definiatur.
o ſitire, & modicè cibos prolui, optimum eſt præ-
ptũ. Nocet ebrietas omnis, & maximè aſſidua:
quidẽ obſeſſos neruos quotidie remittit: largiorq;
tus, acutorum morborum adfert initia. Medio-
is tamen vinolentia, aliquot diebus, maximè poſt
ua pctus, utilis: nanq; modo quodam ex alto euo-
t, ſenſilesq; expurgat excretus, & per cæca cor-
ris ducit ſpiracula. Sed aquam poſt vinolentiam
bere oportet ſiquidem valetudinis alicuius gratia
ſta temulentia remedium aſſert frigida. Om-
acites nomine, peculiariter ſit in Leſbo, ſiccata
e acri vna, paulo ante maturitatem decerpta, tri-
o aut quatrinduo, donec racemi in rugas contra-
ntur, expreſſumq; vinum cadis inſolatur. Vim
ſtringendi habet: prodeſt diſſolutis ſtomacho, &
dolore laborantibus: item prægnantium mala-
, & crudis: in peſtilentia quoque ſorptum au-
diari dicitur. Huiusmodi vina non niſi poſt mul-
annos bibi poſſunt. Lora, quam deuteriam,
potimon appellant, fieri ſolet, adiectis metre-
tribus aquæ, in vinacea, quibus triginta vini

metret & extracta fuerint: calcatis vinaceis, expresseq; decocto ad tertias parteis, & additis in singulos congios modi eius qui remansit, binis salis sextariis, post hyemem transfunditur in vasa. Lora intra annis vtendum: etenim celeriter exolefcit. Conuenit agris quibus timemus noxam vini, coacti saepe de siderijs eorum obtemperare: item à longa valetudine se recolligentibus. Fit & vinum quod adynamon vocant, lora vires habens, hoc modo: Pares aquae, & musti mensura coquuntur molli igne, donec absumatur aqua, quod, vbi refrixerit, elutriatum, picato vase reconditur. Alij marinae & coelestis aquae, mellis & musti pares miscent portiones decapulant, & quadraginta diebus insolant: quod ad annum vtuntur ad omnia eadem. Vinum è syuestri vna nigrum adstringit: prodest alui & stomachi fluxionibus, & ceteris quibus constrictio, & contractione opus est.

Vinum melitites. CAP. VI.

Melitites datur in longis febribus, quae stomachum infirmarunt: namq; aluum leuiter emollit, vrinam ciet, stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renum vitijs, imbecillo capiti & mulieribus abstemijs: odoratum siquidem est & corpus alit. Distat à mulso quod fit è vino vetere, austero & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinq; congios austeri musti, mellis congio & salis cyatho. Coriinis magnis, quò magis ad effectum

LIBER QUINTVS.

4^{te}

feruescendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale: cumq; effervere desierit, in alia vasa transfunditur.

Mulsum.

CAP. VII.

Mulsum è vetere vîno, austeroq; et bono melle factum, præfertur: minus enim inflat, ac celeriter id genus in vsum venit. Vetus, corpus alit: media ætate, aluo prodest, vrinam pellit: à summo cibo sumptum, nocet: & inter initia potum, implet: dein appetendi aviditatē reuocat. Fit mulsum duabus vini metretis, admixta vna mellis. Aliqui, quo celerius præberi possit, mel cū vino coquunt, & ita transfundūt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis, vnum mellis adijciunt: & vbi fuerit, vase recondunt. Dulce autem permanet.

Aqua mulsa.

CAP. VIII.

Aqua mulsa easdem quas mulsum vires possidet. Cruda vtimur, cum moliri deiectionem, aut vomitionem incitare volumus: vt ijs qui venena hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi lixere microsphyclos, tussientibus, peripneumonicis, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Iam paratum conditiumq; quod aliqui hydromeli propriè vocant, media ætate adynamo vino, aut lora in recreandis viribus respondet, & similem vim adipiscitur: quare inflammationibus alicuius membri plus quàm lora prodest. Inueterati tamen

C 6 5

usus damnatur, inflammatis, aut constrictis: sed
 laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, suda-
 toribusve conuenit. Fit, duabus pluuiæ aquæ vete-
 ris ad vnā mellis partē additis, & insolatis. Alij
 fontanam aquam adiiciunt, ad tertias parteis deco-
 quunt, & ita recondunt. Nec desunt qui hydromeli
 appellent, quod à melle elutis aqua sauis confici ac
 seruari soleat: sed meracius confieri conuenit: aliqui
 id coquunt. Aegrotantibus noxium est, quoniā plu-
 rimum ceraginis sibi vendicat.

Aqua.

CAP. IX.

DE aquis in vniuersum decernere, propter lo-
 corum proprietates, & peculiare naturas,
 cælum, & alia pleraq; difficile est. Magna tamen
 ex parte optima est dulcis, sincera, nullius omnino
 qualitatis particeps, & quæ ne minimo quidem tē-
 pore in præcordiis commoratur: ad hæc, quæ & fa-
 cili via fertur, & citra molestiam, nec inflationes
 creat, & minimè computrescit. Aqua maris cali-
 da est, & acris: stomacho aduersatur (aliū enim
 conturbat) pituitam expellit. Si verò calida ad fo-
 tus adhibeatur, elicit & discutit: neruorum vitis,
 & perniciis, ante vlcera prodest. Miscetur cata-
 plasmatibus ex hordeacea farina, & emplastris, &
 discutientibus malagmatis. Ad mouendas deiectiones
 tepesacta infunditur & ad tormina: calida,
 psoras, pruritus, impetigines, lentes, & mammas
 rigentes, foueri vtile est: liuores fotu discutit: ad ve-
 nena

venacos ictus, qui tremorem & refrigerationem
 adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpio-
 rum, phalangiorum, aspidumq; etiam si quis in ea
 idam descendat, auxiliatur. Et malo habitu con-
 ectis iam diu corporibus, nervisq; balnea ex ea uti-
 les: hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates,
 cruentis vapor leuat. Syncera, & sine potabilis
 aquae mistione reposita, virus deponit. Sunt qui
 tiam praecoquant, & ita recondant. Datur ad pur-
 ganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum vi-
 no, aut melle: verum post deiectionem, dant galli-
 nae aut piscium iuscula, ad domandam morsus a-
 rimoniam.

Thalassomeli.

CAP. X.

Quod thalassomeli vocatur, vehementer pur-
 gare constat. Temperatur autem aquis por-
 tionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defecatis,
 & picato vase per Canis aestus insolatis. Alij ad bi-
 bus marinae coctae singulas mellis adijciunt, & va-
 se condunt: huiusmodi moderatius est aqua marina
 & mitius.

Acetum.

CAP. XI.

Acetum refrigerat, & adstringit: stoma-
 cho utile, & appetentiam excitat: erumpen-
 tem vndeunq; sanguinem, potu in se sive sistit:
 prodest alui fluxionibus coctum cum cibus: cruen-
 tis vulneribus inditur & inflammationes arcet,
 & succidis lanis aut spongia impositum: reprimat
 pro

procidentia sedis, vuluæq; : item abscedentes gingi-
uas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem
sacrum, vlcera quæ serpunt, lepras, impetigines,
pterygia, cū aliquo cōuenienti efficax est: phagedæ-
nas vlcerum, nomasq; fotu continuo colibet, poda-
gricis calido fotu, cum sulfure auxiliatur : sugilla-
tiones rapit, cum melle illitū. Contra capitis ardo-
res cum rosaceo in succidis velleribus, aut sponsia
imponitur. Ad aquam inter cutem, grauitatem au-
rium, & sonitus, sibilosq; feruentis vapor proficit:
instillatum quoq; aurium vermes necat. Panos coër-
cet tepidi fotus, aut si imbuta aceto sponsia admo-
ueatur, & pruritus permulcet. Contra venenatos
serpentium ictus, qui refrigerando nocent, calidum
commodè fouetur: & frigidum, ijs quæ exurens vi-
rus eiaculantur. Calidum potum, atq; vomitioni-
bus redditum, aduersus omnia venena efficax est,
præsertim contra meconium, & haustam cicutā,
conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatum,
fungos, ixiā, taxumq; cum sale. Haustus vora-
tas hirudines, si sorbeatur, eicit: tussim veterem mi-
tigat, & recentem laceffit. In orthopnæa calidum
commodè sorbetur, gutturis fluxiones gargari-
zatum inlibet, anginis & vuæ procidenti conuenit: cōtra
dentium dolorem, calidum colluitur.

Acetum mulsum. CAP. XII.

Acetum mulsum, quod oxymel vocant, hoc
modo temperatur: Aceti heminas quinque,
salis

LIBER QUINTVS. 45

salis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescente cortina: atq; ubi refrigerit, diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischiadicis, comitialibus, & articulorum morbo conflictatis prodesse creditur. Contra morsum eius viperæ quam sepe vocant, haustum meconium, ixiâmve, auxilio est. Anginis vtiliter gargarizatur.

Acida muria. CAP. XIII.

Acida muria, quam Græci oxalmen vocant, contra nomas fotu, putrida vlcera, canum morsus, & venenatos ictus auxiliatur. Sanguinis luxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in vulnus iniiciatur, & prociduam sedem reprimat: dysentericis, si nomas sentiât, infunditur: oportet autem ex lacte instillare. Hirudines sorbitione ut gargarizatu necat: furfures & manantia cauitis vlcera exterget.

Thymoxalme. CAP. XIII.

Thymoxalme veteres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quatuorve cyathos, aqua calida dilutos, in articulis morbis, & inflationibus. Crassos humores, trahit. Hoc modo facitatur: Thymi tritum acetabulum, salis idem modus, rutæ, pulegij, polenæ, singulorum exigua portiones in vas coniunguntur, aqua terni sextarij, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumpositò linteo sub dio madescunt.

Scil

Scillinum acetum. CAP. XV.

Scillinum acetum hoc modo fit: Scilla, quæ candida fuerit, expurgata conciditur, traiectioneque lino segmenta modicis intervallis, ne se contingant, siccantur in umbra quadraginta diebus: mina eorum in aceti boni sextarios duodecim immergitur, & vase diligenter operto septenis diebus in sole madescit: post eum numerum dierum scilla eximitur, expressa abijcitur: defecatum acetum transfunditur, & reponitur. Aliqui scillæ minam, quinque aceti sextariis miscent. Alij citra exiccationem repurgantes, parem mensuram adijciunt, & senis mensibus macerari patiuntur. Id multo magis humorilentitias digerit: gingivas humore pregnantibus colitione stringit firmatque, & motos dentes stabilit: putredines oris, & graues habitus tollit: durat faeces sorbitione, & callosas facit: vocem expedit, & lymphidam canoramque reddit. Datur stomachicis, ægrè cibum concoquentibus, melancholicis, comitialibus, vertiginosis, mente captis: item vulvarum strangulationibus, lienis incremento laborantibus, ischiadicisque. Imbecillos admodum recreat: corpus sanum reddit, & bonum colorem præstat: oculorum aciem exacuit: tarditatem quoque aurium infusione purgat. In summa, ad omnia efficax. Cauendum tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut nervorum vitijs. Datur quotidie ieiuniis sorbendum, inter initia exiguum, paulatim ad

adlaugendo, ad cyathum vsq;. Nonnulli binos dant
cyathos, aut largius.

Scillinum vinum. CAP. XVI.

Scillinum vinum fit hoc modo: Dissectam, vt
dictum est, scillam, & sole siccata contundi-
to, minam eius tenui cribro incernito, & linteo ra-
ro illigatam, in videnos sextarios musti recentis ac
boni demergito: vbi trimestri spatio maduerit, elu-
triatum vinum, obstructo diligenter vase, recondito.
Licet quoq; sic humida scilla vti: In orbiculos, rapē
modo, dissectā duplicato pondere, quadraginta die-
bus insolari oportet, & valde inueterascere. Alia
parandi ratio: Scillæ dissectæ & repurgatæ tres
minas, in Italicam metretam musti demittito, &
senos menses in vase obstructo macerari finito: post
id tempus defecatum & excolatum vinum recon-
dito. Vtile est contra cruditates, & ciborum corru-
ptiones: item ijs qui reuomunt cibum, et si pituita in
ventre, aut stomacho coierit. Prodest lienosis, male
habitis corporibus, aquæ inter cutem, regio morbo,
difficili vrina, torminosis, inflationibus, resolutio-
nibus nervorum, horroribus longis, vertiginosis, &
mulsis. Menses pellit, minimeq; nervos infestat. Hoc
vinum vetustate fit melius. Cauendus in febre vsus,
ut si interanea vicus sentiant.

Marina vina. CAP. XVII.

Marina variè factitantur: Aliqui enim
statim quum decerpæ sunt vna, aquam
mar

maris admiscunt. Alij in area vuas sole siccant: quibus calcatis, marinam adijciunt. Alij passas prius vuas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt: id magis passi generibus adscribitur. Quæ tamē austeriore gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia valent, si modum meliora non adsint: aluum subducunt: prosunt purulenta extussientibus, aut si dura aluius exerceant. Quæ ex Aminacis vuis fiunt, caput tentant, stomacho aduersantur, flatus creant. Verū quo plenius habeatur historia, ijs qui huius studio tenentur, non inutile existimamus varias vinorum compositiones adferre, non quod frequens eorum aut necessarius existat vsus, sed ne quid omisisse videamur quod ad eorum rationem attinet. Sunt autem quædam ex ijs factitia, minoris curæ ac impendij, quæ cadunt in vsus: vti quæ ex cotoneis, malis, pyris, si liquis, item myrti baccis componuntur.

Cydonites. CAP. XVIII.

Cydonites nomine alio melites appellatur, & Cita fieri consuevit: Mala cotonea exemptis seminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarum pōdo, in mūsri metretam, triginta diebus macerantur, postea defecatum vinum reponitur. Alia faciendi ratio: Oportet a singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorum pressorumq; adijcere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit: prodest stomacho, dysenteria

ria

LIBER QVINTVS. 419

ria, hepaticis, renum vitijs, & vrinae difficultati. Melomeli, quod et cydonomeli nominant, sic fit: Cotonea mala seminibus suis castrata, in quam plurimum mellis, quo penitus demersa contegantur, concuuntur: id post annum mutescit, mulso non dissimile. Praestat eadem quae superior compositio.

Hydromelum. CAP. XIX.

Fit hydromelon duabus mensuris aquae coctae, & sub Caniculae sydus insolatae, additis ad unam melomelitis facili ex cotoneis. Vis huius eadem est.

Omphacomelites. CAP. XX.

Omphacomelitis faciendi ratio haec est: Acerbae vuae adhuc immaturae, & tribus diebus insolatae exprimuntur, & ad ternas succi partes mellis optimi, despumati singulae partes adijciuntur: & insolatur in vasa transfusum. Vim reprimendi ac refrigerandi habet: stomachicis celiacisque conuenit. vsus post annum est.

Apjtes. CAP. XXI.

Fit & e pyris, perinde atque cotoneis, vinum, apjtes nomine, sed ita ut pyra non magnopere maturescant. Ex siliquis etiam, mespilis, sorbis, simili modo temperatur. Omnia haec genera acera sunt, & adstringunt: stomacho utilia sunt, atque intestinas fluxiones cohibent.

Oenanthinum. CAP. XXII.

Fit e feraci vite syluestri, quod vocatur enanthum.

D d

rhinum: Sicci flores minis duabus musti cado macerati, post triginta dies mutantur, mox colatum vinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, celiacos, & dysentericos.

Rhætes.

CAP. XXIII.

Fit è puniceis malij maturis quod rhæten nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, apyrena vocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuii exorta: stomacho vtile: adstringit aluum, & urinam mouet.

Rhodites.

CAP. XXIII.

Rhodites sic fit: Rosarum siccarum tusarumque minam linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito: & post tres menses defecatum vinum transfundens, recoclito. Vtile ijs qui febre carent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo potum, & contra humidas aluos, & dysenterias. Fit quoque ex succo rosarum, addito melle, quod rhodomeli vocant, quod arteriæ scabritijs conuenit.

Myrtites.

CAP. XXV.

MYrtites fit, baccis nigris, quæ maturitatem exceßerint, tussis, & organo expressis. Alii ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aque heminas adiiciunt, & vini veteris parem modum postea exprimunt, & seruant. Magnope-

re

LIBER QUINTVS.

422

re adstringit: stomacho vtile: fluxionibus ventris
ac stomachi prodest: & contra intestinas vlcera-
tiones, & profluvia: denigrat capillos.

Myrsinites.

CAP. XXVI.

MYrsinites, sic temperatur: Rami nigrae myrti
cum suis baccis & folijs tusi, decem minarum
pondo, in tribus musti congijs feruescunt, donec duo
supersint, aut certe dimidium: id vinum colatum ad
usum recoditur. Contra furfures, vlcera in capite ma-
nantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas,
& purulentas aureis efficax est: sudores sistit.

Lentiscinum & terebinthinum.

CAP. XXVII.

Lentiscinum similiter vt myrsinites tempera-
tur, nec secus terebinthinum. Nanque bacci-
feri eorum rami sumi debent. Similes insunt vires:
adstringunt, stomacho accommodantur, & deflu-
xionibus intestinorum, vesicae, & stomachi, &
sanguinis profluvio: vlcera omnia fluxionibus ob-
noxia: fotu ad cicatricem perducunt: fluxiones
vulvae ac sedis, in seissione colibent.

Palmeum vinum.

CAP. XXVIII.

Palmulas maturas, quas vocant chydeas,
in vrceolum imo pertusum, & obstruclum
picata arundine, demittito: lino foramen sit obtu-
ratum, & quadragenis sextarijs ternos aquae con-
gios infundito: quod si ipsum ita dulce esse non
libeat, quinque congijs infudisse satis est, post de-

D d 2

cem dies detracto ab arundine linteo assumito vinum crassum & dulce, & reponito. Suave illud quidem, sed capiti noxium contra fluxiones, propter adstrictoriam vim, efficax: stomachicis, colicis, sanguinem expuentibus conuenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sextoque faciunt, quod tandem acore vitiatum.

Cathorchites.

CAP. XXIX.

Cathorchites, aliquibus sycites vocatur, in Cypro fit, ita ut palmeum: sed hoc interest, quoniam pro aqua tantumdem humoris adijciunt, in qua recentem pressam vinacea maduerint. Caricæ quæ chlidonia aut phœniceæ appellantur, præsertim nigrae macerantur, ut diximus, & post decem dies humor excipitur, atque iterum aut tertio, idem modus aqua in qua vinacea maduerint infunditur: simili modo intercedente spatio, quarto aut quinto assumitur. De maceratarum liquor non secus acorem contrahit, & acuti usum præbet. Id tenue est: flatum gignit, stomacho aduersatur, fastidium parit, aluo tamē prodest, vrinam ciet, menses trahit, lactis ubertatem facit, vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio quam xylthon appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adijciunt. Alii muricæ amphoræ: quoniam non facile vitiatum, & aluo idoneum fore censeant. Alii thymum & feniculum imo subiiciunt, & caricæ superponunt: et ita vicissim, donec vas expleuerint. Fit & sycomoræ eodem modo vinum, sed in

acet

acetū acre degenerat: quoniā nō ita praualet vis eo-
rum, vt fluētis liquoris dulcedinē retinere possit.

Refinatum vinum. CAP. XXX.

Refinatum vinum populatim facituri solet:
copiosum in Galatia: quoniā vinū illic coa-
rescat, vna nō maturescēte, ob cæli algorem, nisi pi-
nea resina temperetur. Resina autem cum cortice
munditur, et amphoræ dimidiata hemina permisce-
tur. Aliqui vbi efferbuit, excolant. separātes resinā:
ilij relinquūt. Hæc vina vetustate dulcescūt. Omnia
capitis dolore, et vertigines faciūt: concoctionē tamē
adiuuant, & vrinā cient: tussientibus, ac destilla-
tione vexatis conueniunt: itē cæliacis, dysentericis, et
hydropicis, & fœminis fluxione vuluæ laboranti-
bus: altis exulcerationibus infunditur. In hoc autē
genere nigricans magis albo constringit.

Strobilites. CAP. XXXI.

Strobilites fit maceratis in musto nucibus pi-
neis, recētibus, fractisq; præbetq; resinati effe-
tus. Si quis madefactas nuces pini musto deco-
quat, potum affatim cōuenit ijs qui talitudine con-
ficiuntur.

Cedrinum vinum. CAP. XXXII.

Cedrinum, iuniperinum, cupressinum, lauri-
num, pineum, aut abiegunum, simili ratione
fiunt. Diuisos recēter ramos, cū fructum adunt,
ut soli, aut balneo, aut igni, admonere oportet,
vt consudent, congioq; vini minam vnā permi-

scere, & post duos menses transfundere, & ante
quàm recondantur, insolare. Factitiorum vino
rum vasa impleri debent: nanque non plenis va
sis, vina in acorem corrumpuntur. Medicata au
tem vina, rectè valentibus insalubria. Omnia ex
calfaciunt, vrinam cient, & substringunt. Lau
rinum tamen vehementius excalfacit. Fit quoq
è fructu cedri maioris vinum, congio musti, ad
iecta tusarum baccarū selibra: diebus quadragi
ta insolari debet, & defecatum in vasa trāsferri.

Eit etiam vinum è bacceis iuniperis, non alite
quàm cedrites, & ad eadem valens. Cedrites ho
modo fit: Cedriam dulci aqua lauant, & singu
las amphoras singulis cyathis diluunt, & ita mu
sto replent. Hoc genus vini excalfacit: extenuat, tuss
antiqua viile sine febre, pectoris laterumq; dolori
ribus, torminibus, ventris & interaneorum vlce
ribus, purulentis excreationibus, mulieribus vulu
causarijs, hydropicisq;: facit aduersus vētris tinea
& horrores: cōtra venenatos ictus auxiliatur: ser
pentes necat: aurium doloribus instillatū medetur.

Picatum vinum. CAP. XXXIII.

Picatum ex liquida pice & musto tēperatur
Picem autem primum marina aut muria tā
tisper eluere oportet, dum inalbuerit, & sincer
maris aqua defluat, mox aqua dulci proluenda
congijis octo musti, vncia picis vna aut altera adi
citur: vbi efferbuerit & cōstiterit, in vasa diffun
di.

ditur. Hoc genus vini excoquit, concoquit, purgat, abstergit: vtile doloribus pectoris, alui, iocineris, lienis & vuluæ, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exulcerationibus in altum recedentibus, tussi, suspirijs, concoctionibus tardis, inflationibus, et luxatis, præsertim in succida lana impositum.

Absinthites. CAP. XXXIIII.

Absinthitæ faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodequingenta sextarijs Italicarum amphorarum, admistam absinthij. Pontici librâ decoquant ad tertias: & ubi infuderint sex aceti sextarios, & absinthij selibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in vas: dumq; conquieuerit, defæcant. Alij absinthij minâ in amphoram demittunt, tusamq;, & raro linteo deligatam, in cado musti macerant, binis mensibus. Alij absinthij quadrantem, alij trientem, & nardi Syriacæ, cinnamomi, cassiæ, floris iunci odorati, calami, elatæ, palmarum singulos sextantes inijciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstructo vasis spiraculo, binis ternisve mensibus dimittunt: postea defecatum vinum transfundunt ad vsus. Alij addunt in musti cadum, Celticæ nardi drachmas quatuordecim, & absinthij drachmas quadraginta, linteo inuolutas: & post quadragesimum diem elutriant. Alij in senos sextarios musti, absinthij libram, & sicca pini resina sextantem immittunt, & post decem dies excolant, & recondunt. Vtile est stoma-

cho: vrinam cit: tardā concoctionē accelerat, hepaticis, regio morbo, & renū vitij auxiliatur: fastidia discutit: ijs prodest quibus stomachus negotium exhibet: valet contra longam præcordiorum distentionē, & inflationes, teretesq; vētris tineas, et remoratos menses: contra hausta ixiæ venena quā plurimum potū, & vomitionibus redditū, auxiliatur.

Hyssopites.

CAP. XXXV.

Hysopites è Cilicio hyssopo maximè laudatur, sitq; similiter, foliorum hyssopi tusorum libra in amphoram musti coniecta, linteolo raro cum quibusdam lapillis, folia inuoluuntur, vt degrauiatus pondusculo fasciculus sidat: vinum post quadraginta dies defecatum elutriatur. Contra pectoris, laterum, & pulmonis vitia, veterem tussim, & suspiria prodest: vrinam cit: torminibus, & horroribus febrium circuitu repetentibus auxiliatur: menses mouet.

Ex diuersis plantis facta.

CAP. XXXVI.

Simili modo chamædrytes fieri solet. Excalfacit, discutit: conuulsis, regio morbo, vuluæ inflationibus, tardā concoctioni, incipienti aquæ inter cutem, subuenit. Inueterascens melius redditur. Stæchadites non secus temperatur. Congijs, sex stæchadis minam addere oportet. Crassitiem, inflationes, laterū, nervorumq; cruciatus, & perfrictiones discutit: comitialibus commodè dat.

clatur cum pyrethro & sagapeno. Fit ad eadem acetū ē stachade herba, vt paulo ante diximus, aceto macerata, quod eosdē implet effectus. Fit vinū ē betonica, quam cestron psychotrophon appellant. Herbam semine maturo pregnantem, cum suis ramulis minæ pondō, congijs duobus vini macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad multa interaneorum vitia, vt frutex ipse, pollet. Et vt in vniuersum dicatur, factitia vina, sibi mīsturarum vires adsciscunt: quare non difficile fuerit, ijs qui illarum naturas norint, vinorum vires coniectura quadam consequi: veruntamen vinorū vsus febricitantibus abdicandus. Fit etiamnum ē betonica acetum, ad eadem vitia vtile. Tragorigantes fit quaternis tragorigani drachmis linteolo colligatis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, vulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, agris concoctionibus. E nāpis fit vinū, nomine lunites, drachmis duabus tusi nāpi in sextarios duos musti additis, & ceteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. Dictamni drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia: menses, & purgamentum à partu subducit. Marrubij adulti folia tundo, & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc

vinum pectoris vitij, & omnibus quibus marrubium. Thymi tusti & cribrati vncias centū linteo colligatas, in amphoram musti adijcito. Valet contra aegras coctiones, fastidia, dysenteriam, nervorum & prae cordiorum dolores, hybernos algores, & venenata animalia, quorum morsum frigus insequitur, aut putrescit locus. Simili modo est satyria vinum fit, quod eadem quae thymites praestat. Si quoque origanites ex heracleotico origano conficitur similiter cum suprascripto. Facit eadem quae thymites. E calamintha, pulegio, et abrotono vina sunt eodem quo thymites modo, prosunt stomachicis, cibum fastidientibus, & regio morbo: quod urinam moveant. Fit item est conyzia vinum, contra venenata ante alia efficax.

Aromatites.

CAP. XXXVII.

Aromatites ita fit: Palmae, aspalati, calami, nardi gallici, singulorum quatuor sextarios sumito: postquam contriueris, passo subigito, coactis ingentibus offis et in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato vase, quadraginta diebus quiescere finito: deinde ubi face expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio: Calami vncia, plu drachma septem, costi drachma duae, nardi syriaci drachma sex, cassiae vncia, croci drachma quatuor, amomi drachma quinque, asari drachma quatuor: omnia simul trita et linteo colligata in cadu musti demergunt, et postquam vinum deferbuerit, transfundit.

Fac

Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores: difficili vrinæ, horroribus, retardatis mensibus, atque ijs qui per frigora iter faciunt, potum conuenit: pituitæ crassitiem extenuat: colorem alit, omnium conciliat, dolorem finit, renum & vesicæ vitijs auxiliatur.

Ex diuersis odoramentis facta.

CAP. XXXVIII.

FIt & vinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, et si humor in stomacho coit: Myrrhæ duæ drachmæ, piperis candidi drachmæ vni, aridis drachmæ sex, anisi drachmæ tres: omnia plenius tusa et linteolo inueluta in sex vini sextarios conijciuntur: vinum post triduum colatur, & in lagena reconditur. Datur post deambulationem, meraculum, cyathi vnius mensura. Fit quoque nectaries ex helenio herba: Radice sicca pondo quinque drachmarum linteolo colligata, & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pectoris vitia: vrinam pellit. E Syriacæ nardo, et Celtica, malabathroque; vinum factitatur, hac ratione: Singulorum selibra in binos musti congios mittito, post menses duos colato. Datur cyathus vnus cum tribus aquæ. Hoc vinum efficax est contravitiis renum, hepaticos, regium morbum, & vrinæ difficultatem: prodest stomachicis, atque ijs quos pallor decolorat. Alij vnciam, aut sextantem acori, & Celiacæ nardi quadrantem, in musti ampho-
ram

ram adiiciunt. Asari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id vini genus urinantiet: hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq; conuenit. Radicis syluestri nardi recentis & iritæ cribratæq; bessem, in congiu musti conijcito, duos menses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili urinae, inflationibus, stomachicis.

Ex diuersis herbis facta.

CAP. XXXIX.

Radicis dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram imposito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & vuluæ menses pellit, ructus ciet, & urinā: prodest tussi, ruptis, vulsisq;. Saluæ vnciam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, vesicæ, & laterū dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vulsa, et suppressos menses. Panacis vnciam in musti congiu mittito, & transfundito. Prodest ruptis, vulsis, contusis, orthupnææ: lienis crassitiem extenuat: cōtra tormina, coxendicū dolores, efficax est: tardas concoctiones accelerat: menses & partus extrahit: aquæ inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur. Vrina ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorum vncias octo in senos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus, & latera, & vri

vinam mouent. Seminis apij recentis, maturi
 & cribrati vncia nouē in linteo colligata in musti
 amphoram demittantur. Appetitum excitat: stoma-
 chicis, & difficili vrinae auxiliatur: faciles spi-
 ritus facit. Ex feniculo, anetho, & petroselino,
 in eodem modo fiunt, & ad eadem efficaciam. Fit
 & è flore salis vinum, multo ad purgandum ef-
 facius, quam vinum aqua marina temperatum.
 auces, vesicam, renes, & stomachum infestat:
 uare neque in secunda, neque aduersa valetudine
 rodest. Fit etiam vinum quod philhorion vo-
 cant, quoniam partus necat, & abortus facit, ve-
 atro aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta
 radices vitium sato: siquidem vites sibi illorum
 vires adsciscunt. Id vinum partus enecat: datur
 eiunis mulieribus, quae antè vomuerunt, cyatho-
 rum octo mensura, dilutum. Ramorum thyme-
 ae cum suis folijs & fructu triginta drachmas
 mittito in congios tres musti, & leni igne coquito,
 donec cōgij duo supersint, defaecatumq; recondito.
 aquosa purgat excrementa, & lienem absumit.
 Chamelaea dum floret, cum folijs tusa & cri-
 brata decē drachmarū pondere, in musti congiū
 additur. Post duos menses vinū in vas transfertur.
 Aquae inter cutem, hepaticis, & lassitudine confra-
 ctis, efficax est: item mulieribus quae à partu agrè
 purgātur. Chamepityinum simili modo fit, ad ea-
 dem conueniens: vrina quoq; ciet. Librum radices
 mar

mandragoræ concidito, segmenta lino traiecit
 quod selibrâ æquat in musti caldū demittito, ibi
 esse finito ad menses treis, deinde transfundito. Me-
 dia portio, hemina dimidiū: bibitur, passo in dup-
 addito. Aiunt hemina vini congio mistam, potu
 pore adferre: cyathus unus cū sextario vini po-
 tus, enecat: mediocris vsus citus, doloris sensum au-
 fert: fluxiones intrassat: olfactu, potuq; & cū iudi-
 tur idem præstat. In congiū musti aqua ma-
 rina dilui, drachmas duodecim nigri veratri tri-
 in linteo mundo, mittito: dumq; efferbuerit, in ma-
 rinae aquæ congios quatuordecim aut quindecim
 ubi pleniusculè fregeris, inijcito: post aliquot dies c-
 lato, & utitor. Dato cyathum unū ex aqua balne-
 in potu, ad alium soluendā, ijs qui euomuerunt
 cœna. Alia ratio: Veratri drachmas viginti, iunc-
 odorati uncias duodecim, spissæ Syriacæ uncias tr-
 decim, cribratas, et linteo colligatas in septem vin-
 Col sextarios diebus quadraginta materandas in-
 dito, postmodum colato: dabis in potu sesquihemi-
 nam. Aliter: decoctæ marinæ aquæ ex alto pe-
 zite sextarios duodecim, veratri candidi libra
 sex, in musti amphora quadragesimo die, quan-
 madefeceris, colato, & utitor. Alia ratio: Vera-
 tri drachmas duodenas, & aphrontiri quaternas,
 in senis musti sextarijs diebus quinisdenis mace-
 rato, mox colato: & semestri exacto, utitor. Id vi-
 ni genus abortus facit, & partus necat. Aut vna

in

sole siccatas imposito in musti metreta (implet
 item metreta congios duodecim) & gypsum in
 inu mittito pondo drachmarum viginti, & biduo
 sidere finito, conijcito veratri nigri drachmas tri-
 ginta, iunci odorati, calami, singulorum drachmas
 viginta, baccarum uniperi sextarios duos & trien-
 m, myrrhae & croci singulorum drachmam, inuol-
 is linteolo diebus quadraginta appedito, postea co-
 cto. Dabis heminas treis aut duas dilutas. Purgat
 partu, et abortu feminas: fetus extrahit, contra
 regulatus vulvae efficax. Scammonites sic fit. Radi-
 es scammoniae per messes effossae, tritae, et linteo colli-
 catae drachmas quinque in musti congiu mittito, ad
 dies triginta. Aliu purgat, bile et pituita extrahit.
 Metallica omnia, & primum Cadmia.

CAP. XL.

EX cadmiae generibus optima est Cypria, bo-
 tryitis nomine, densa, modice grauis, & in
 uitate magis declinans, racemosa facie, colore
 bodu, quae fracta cinerulenta est, & aruginosa.
 proxima habetur foris caerulea, intus candidior,
 internatis venarum discursibus, onychitae lapidi
 similis, cuiusmodi sunt, quae à veteribus metallis
 fodiuntur. Quaedam etiam placodes, id est, cru-
 mosa dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi
 conis cincta, ob quod eam Zonitin appellauere.
 alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna
 ex parte nigra. Sed quae testaceam faciem habet,

ter

terram amplexa est. Improbatur candida. Oculo
 rum medicamentis botryitis nomine, & onychiti
 utiles: reliqua ad emplastra, & farinas quæ cic
 tricibus inducendis insparguntur. Ad eadem Cy
 pria prodest. Ex Macedonia verò, Thracia, & Hi
 spania delata improbant. Cadmiæ effectus adstri
 gere, cana explere, sordes expurgare, exiccare, cor
 poris meatus infarcire, excrescentia in carne coë
 cere, crustas creare, et ulcera, quæ cacoëthe vocantur
 ad cicatricem perducere. Gignitur cadmia ex æ
 in fornacibus candente, fulgine egesta flatu, & la
 teribus camerisq; fornacum inherente. Prægran
 des autem ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appell
 tæ acēstides, per summa fastigia connexæ & cō
 cameratæ, ut quæ ab ære iactantur sursum corpus
 cula cohæreant, & inibi detineantur: quæ cum
 spissius insident, in corpus cōcrescunt, & modo ge
 nus vnum eius, modo duo, modo omnia persciunt
 Extrahitur & cadmia in Cypro è monte, qui So
 lis incumbit, cremato lapide cui pyritæ cognome
 est: in quo etiam monte quædam quasi vena chal
 citis, misyos, soresos, melanteriæ, cæruleæ, chryso
 collæ, atramenti sutorij, diphrygisq; inueniun
 tur. Nec desunt qui cadmiam in lapidu fodinis in
 ueniri tradant, falsæ quædam lapidum cognatione
 qualis inuenitur, & apud Cumas lapis, nullam su
 vim ostendens. In eo deprehenduntur, quod sum
 cadmia leuiiores, nullumq; alienum mandentibus

sa

LIBER QUINTVS. 435

saporem exhibent: commanducatus item lapis, den-
 tes offendit: cadmia, utpote cum cedat, esum non
 respuit. Alio autem discerni possunt argumento:
 Cadmia in farinam detrita, & aceto subacta, at-
 que in sole siccata, coit: quod in lapide non accidit.
 Item tritus & igni appositus lapis, prosilit, & fu-
 mum igni similem eiaculatur: cadmia verò quieta
 manet, fuliginemq; luteo colore aut areo splenden-
 tem expuit, vario Zonarum discursu. Insuper lapis
 ignem expertus, atq; refrigeratus, colorem muta-
 rit, ac leuior multò fiet. sed cadmia nihil euariat, nē
 quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in ar-
 genti fornacibus candidior, ac minus ponderosa,
 sed viribus nequaquam comparanda ærariæ. Vri-
 tur Cadmia superior carbonibus obruta, donec trās-
 lucida spectetur, & ferrei stercoris modo bullet:
 nox extinguatur vino Aminæo, quæ ad emplāstra
 præparatur: sed quæ ad psorariū medicamenta præ-
 paratur, aceto. Alij hoc modo existā conterūt in vi-
 no, rursumq; fictili crudo torrent, donec pumicosa
 videatur: iterumq; tritam ex vino, tertio vrunt, do-
 nec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiæ re-
 inens: hac spodiū vice vtuntur. Lauatur autem in
 mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum
 nihil emergat: dein coacta in pastillos reponitur.

Pompholyx.

CAP. XLI.

Pompholyx specie sola, non genere, à spodio
 distat. Siquidem spodos nigricat, & ple-

Ec

runq; ponderosior est, palearum pilorumq; plena,
 quasi purgamentum quoddam, quod ab aerariorū of-
 ficinarū pavimentis & fornacibus euerritur: pom-
 pholyx verò pinguis est, & candida, usque adeò le-
 uis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerim
 genera: unū ad aeris colorem vergens, subpingue.
 alterum magnopere candidum, summamq; leuita-
 tem nactū. Candida sit pompholyx, quoties in per-
 ficiundo ere, fabri præstantiorem facere volentes
 detritam cadmiam cumulatius insparserint. Nan-
 que tenuissima fauilla, quæ effertur, in pompholy-
 gen coit. Caterum pompholyx non ex aeris mod-
 materia, & fabrilis industria factitatur, sed ex ca-
 mia quoq; ad gignendā ipsam, eximie follibus pr-
 flata. Cuius faciunda ratio hæc est: In domo gemi-
 na contignatione operta, fornax extruitur, iuxta
 quam mediocris fenestra ad tabulatum à superni-
 partibus pateat: domicilij paries fornaci proxi-
 mus, tenui foramine ad fornacē usq; perforetur, a-
 excipiendam follis narem ostium mediocre habeat
 pro exitu ingressuq; artificis fabricatum: domuncu-
 la altera huic cōiuncta sit, in aqua & folles, & fla-
 tor suo munere fungantur: deinde carbonibus in ci-
 mino succensis, assidens artifex cadmiam particul-
 tim fractam inspargit, à locis supra infurnibulum
 extructis: idem negotiū obit infernè artificis mini-
 ster, simulq; carbones adiicit, usque dum indit
 cadmiæ copia prorsus absumatur. Itaque egest
 suffit

suffitu tenuis pars, & leuis materia in summā domum euolat, & parietibus, tectis, fornicisq; adhære scit: cōflatum autem inde corpus, inter initia erumpentibus, aquarum bullis simile prodit, postea maius incrementū capeffens, glomusculis vellerum simile redditur. Ponderosius autē in ima loca se recipit: sed hoc fornacibus offunditur, illud domus paruum mento coheret. Quod t. minore deterius existimandum est, ideo quod multū terra collegerit, & spurcicia in aceruatiōe referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spodium arbitrantur, de qua antedictum est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto halitum aris præstat, colore aliquantum præco, sapore cœni horrido: & si fraudem non experta flagranti carbone inferuescit, aëreum colorem contrahit. Antedictis autē notis diligenter attendendum est. Siquidem à nonnullis adulteratur taurino glutine, ouillo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus, quod facile cognitu fuerit, quippe nihil in ijs probādis inuenietur eorū quæ antē dicta sunt. Pompholygen in commune ita lauare oportet: Ligatam linteo mūdo modiceq; raro, aut siccam, aut aqua respersam, in labellum demittito, quod imbrē contineat, & huc atque illuc si sciculum deferens, immergito: ita enim limosa pars eius ac utilis effluet, & omne sedimentum in linteolo remanebit. Postea residere sinens, aquam cum cinere colis incernito, & nouam infusa

dens, agitato, & effundito: mutata tantisper aqua,
 & colata, dum arenosi nihil sidat. Demum aquam
 exprimito, & siccatur cinerem recodito. Alij, quan-
 tum maxime fieri potest, siccant, & manibus in a-
 qua coterunt, dum mellis crassamentum imitetur:
 deinde linteo faucibus excepturi vasis obtento, aut
 laxius illigato, colant, & quò facilius transeat, in-
 fusa per linteum largiore aqua, cinerem contur-
 bant: mox spumosum, quod traiectum est, & su-
 pernatat vasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad
 vsus recondunt. Quod verò resedit, sensim cribra-
 tum, in aliud vas transfundunt, relicto arenoso quod
 pessum ierat: rursus lapidosa sidere patiuntur, &
 in vas aliud excolant: hoc identidem faciunt, donec
 cinis merus & arenae expers inueniatur. Alij pau-
 latim integram in aqua respergunt, arbitrati are-
 nas lapillosq; suo pondusculo degrauatos, pessum
 ire: pilos autem & paleas leuitate sua in sublime
 attolli. Cæterum cinerem medium separant, & in
 pilam coniectum, ut cadmiam, eluunt. Quinetiam
 lauatur vino Chio marina aqua diluto, modis
 quos supra diximus: & ita redditur adstringen-
 tior, quàm aquis elota. Vis pompholygis adstringe-
 re, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & ali-
 quantum exiccare. Inter medicamenta numeratur,
 quæ leniter crustas obducunt. Quod si spodon tor-
 rere libet, diligenter tritam, & irrigatam aqua,
 colliges in pastillos, fictiliq; nouo, subiectis leu-
 bus

bus prunis, orbiculos continuò versabis, dum assiccati fuluescant. Neq; ignorandum, ex auro, argento, plumboq; fieri spodium: verum post Cyprium, plumbeum maximè commendatur. Quoniam spodos sæpenumero desideratur, necesse est ostendere, quæ simili virtute polleant, vt in spodij locum suffici possint, antispoda vocant, quoq; modo sumi debeant. Folia itaq; myrti, cū floribus, & baccis immaturis, in fictile crudum coniecta, indito operculo continua foramina habente, vruntur fornacibus, donec figlinum percoquatur: iterum in fictile aliud crudum transferuntur, quod vbi perassatum fuerit, exempta lauantur ad vsus. Idem quoq; sit è termine syluestris oliuæ, si habeatur: sin secus, satiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detrahitis ossibus, aut gallis, aut laceratis linteolis: item ex moris immaturis, id est cædidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, ænanthe, aut molibus rubifolijs, vel è buxi coma, vel pseudocypereo cum flore. Alij ficulneas frondes in sole antea siccatas, eodem modo parant: alij taurinum gluten: alij succidas lanas asperas, pice aut melle irrigatas: quæ omnia in spodij vicem vsurpantur.

Aes vstum. CAP. XLII.

AEs vstum probatur rubrum, & quod contritu colore cinnabarim imitetur: nigrum verò plusquam deceat exustum est. Fit autem è clauis solutarum nauium, fictili crudo compositis:

Ee 3

subperso sulphure cum sale pari, omnibus vicissim insparsis, fictile, circumlito singulari creta spirameto, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen insparunt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies vrun. Alij sulphure solo vrun, fuliginem tamen excutiunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cum sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla aceto respersos, vrun, & iterum ac tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet, in Memphide combustis: proximum in Cyprio. Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, attrahit: ulcera purgat, & ad cicatricem perducit: vitia oculorum emendat, excrecentia in carne consumit, nomas cohibet, vomitus ciet, cum hydromelite potum, aut cum melle delinctum, illitumve. Lauatur ut cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recrementum, stercusve quam scoriam vocant, eodem modo lauatur: & eandem vim, sed imbecilliolem, habet.

Flos æris.

CAP. XLIII.

Flos æris, quem nonnulli clauorum veterum psegma quasi resegmen aut segmentum, nominarunt, optimus est friabilis, in attritu fuluescens, milij effigie, & numero, brevis, ponderosus, modicè splendens, atq; constringens, qui delimitam æris scobem non recepit, qua saepe adulteratur. Sed id facile deprehenditur, cum dentium illis dilatat

dilatantur ramenta. Fit autem, cum æs fornacibus
 fusum, in receptacula delabitur, per cola fistularum
 ad ea pertinentium: tum huic negotio additi mini-
 stri, sordes expurgantes, aquam clarissimam infun-
 dunt, refrigerandi proposito: itaq; repentino concre-
 tu, ac addensatione, velut expuitur, & erūpit an-
 nediectus flos. Adstringit, & excrescentia coercet: of-
 fusam oculis caliginē emendat, sed magnopere mor-
 det. Quaternū obolorum pondere datus, crassum
 humorem extrahit: carnosā narium & sedis vitia
 absūmit: eruptiones papularum cum vino cohibet.
 Candidus contra diuturnas aurū grauitates tri-
 tus, in eas per fistulam flatu impellitur: ruam, ton-
 sillasq; reprimat, farina eius cum melle admota.

Squamma æris. CAP. XLIIII.

Squamma æris excussa ex Cyprijs officinarum
 clauis, crassa quidem ipsa præstantior quæ he-
 litis, id est clauaris, nominatur. sed ex vili promi-
 scuoq; ære, aut candido, vitiosa intelligitur: quam,
 utpote tenuem, & inuolidam, damnamus, maxi-
 mē approbantes crassam, rufam, præsertim si aceti
 respersu aruginem contrahat. Vim habet adstricto-
 riam, extenuantem, reprimentem, & erodentem:
 nomas coërcet, vlcera ad cicatricem perducit: pota
 ex aqua mulsā, aquam trahit. Aliqui farina sub-
 actam, dant in catapotio. Additur ad oculorum
 medicamenta, quod genarum scabritiam absu-
 mit, & fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo.

Sicca eris squamma expurgata selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter cōturbatur, quousq; pessum ierit: abicitur quod subsidit, & effusa aqua, hemina caelestis imbris adicitur, & distenta manu, squamma, quasi destringenda sit, vehementer confricatur: dumq; lentorem emittere ceperit, aqua sensim ad sex heminas vsq; superinfunditur, terendo valide: squamma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur: quo facto, expressus humor pyxide ex ere rubro facta, excipitur. Hoc est enim velut flos squamæ, valens viribus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficax. Inutile imbecillumq; quod superest, lauatur donec nullā prorsus lentitiam excernat, & linteo apertum biduo conquiescere sinitur, effusaq; extante aqua, ubi siccatum erit, reconditur pyxidicula. Alij vt cadmiam lauant, & reponunt. Squamma ex acie aut mucronibus decussa, quam vocant stomoma, eadem vis. Lauatur modo simili, & reconditur: sed ad moriendam alui deiectionem, inefficacior est.

Aerugo rasilis. CAP. XLV.

Aerugo rara fit his modis: In cadis, aut aliud consimile vas acetum quàm acerrimum infunditur: superponitur inde inuersum æneum vas, præsertim concameratum: sin minus, planum: sitq; obstructum, nullumq; habeat spiramentum, exempto, quo doliolum obturaueris, operculo: decimum post diem insidens aerugo deraditur. Aut eris lami-

na

in cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum attingat, & totidem post dies raditur. Aut massula aeris, aut lamina vna pluresve, vinaceis non recentibus, sed iam acescentibus conduntur, & simili modo versantur. Quinetiam ex delinata aeris scobe æruginem facere licet, necnon è laminis, quibus bractea auri conclusæ malleo ducuntur: si quis eas aceto respargat, & ter aut quater verset, donec æruginem contrahant. Tradunt æruginem in Cypris metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil aeris habentibus, quibus ærugo efflorescit: adduntq; per Caniculæ æstus è quodam specu manare: sed illam paucam & optimam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed vitiosam, quod lapides multos collegerit. Pluribus autem rodus adulterat: aliqui pumice admixto, alij marmore, alij atramento sutorio. Sed deprehendemus pumicem aut marmor, dum pollice sinistra manus madefacto, æruginis portuunculam altero atterimus: siquidem eam diffundi constat, marmoris autem pumicisq; partes coeunt non dissipatæ, demumq; trituratione crebra & humoris complexu dealbesunt. Quin & dentium appressu: si quidem sincera cedit, levis, & sine asperitate. Atramentum verò sutorium igne coarguitur: nanque si fictile, aut lamina, adulterata ærugine illinatur, & feruenti cinere aut carbonibus incalascit alterutrum, mutabitur, rubeſcetq; id quod atramentum sutorium

acceperit: quod id vstum suapte natura talem sortitur colorem. Aeruginis, quam vocant scoleciam, duo sunt genera: quaedam fossilis est, altera factitia ad hunc modum: In mortario Cyprii aeris dimidia heminam aceti albi acrisq; pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam vnam, cum salis fossilij, translucentis, aut marini quam albisimi, solidiq; aut certe cum nitri pari pondere terito in sole, aestuosissimis diebus, subsydus Caniculae, donec colorem aeruginis contrahat, & concretu strigmento sum fiat, ubi autem se in vermiculorum Rhodiacis similium speciem coegerit, recondito. Efficax & valde boni coloris redditur, si duas partes vrinae veteris cum vna aceti adieceris, & alia, quae dicta sunt, peregeris. Sunt qui aeruginem rasilem, quae in apparatu non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita vendant: quod genus, ut vitiosum, improbatur. Fit & quaedam crugo ab aurificibus, mortario & pistillo Cyprii aeris, cum vrina pueri impubis, qua aurum ferruminant. Antedicta aeruginum genera, vsto aeri omnino respondent, sed magis effectu valent. Sciendum fossilem scoleciam praestantissimam esse: derasam sequi: postremo loco factitiam. Mordacissima tamen est haec, & magis adstringens. Auriscum autem crugo rase respondet. Aerugines omnes adstringunt, extenuant, excalfaciunt: oculorum cicatrices emendant, lacry-

mas

as cient, nomas sistunt, vulnera ab inflammatio
tuetur. Vlcera ex oleo ceraq; ad cicatricem per-
cunt: callos & sordida vlcera purgant, cum mel
coctæ: callum fistularum erodunt, cum amonia-
collyrii modo in eas adactæ. Ad gingivarum au-
m excrecentias, & extuberationem vtilis. Ma-
iopere extenuant genarum crassitiem cum melle
ita: verum post illitionem spongia ex aqua cali-
locus fovendus est. Resina terebinthina exceptæ,
in ere & nitro lepras abigunt. Vritur ærugo,
ancuq; velis, minutissimè fracta comminutaq;,
fictili patina, flagrantibus prunis superposita:
rsaturq; donec se mutet, & colore cinereu concii-
it: postea refrigerata reponitur ad usum. Sunt
i cruda olla eam vrant, uti dictum est: sed non
orsus eundem colorem cremata reddit.

Rubigo ferri.

CAP. XLVI.

Rubigo ferri restringit: sistit fœminarum
profluvia, admota, potuq; præstat ne conci-
unt. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papula-
m eruptionibus medetur. Perquam utilis ad
britias genarum, reduvias, & pterygia, con-
lomatis prodest, gingivas firmat, podagras il-
lemit, alopecias replet. Vinum aquæve in qua
adens ferrum sit restinctum, potu celiacis, dy-
tericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissol-
is stomacho auxiliatur. Stercus ferri, quam sco-
m vocant, eadem potest quæ rubigo, sed ineffica-
cus.

cus. Aconito, ex aceto mulso potum, opitulatur.

Plumbum elotum. CAP. XLVII.

Lotura plumbi sic fit: In mortariū plumbeū aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut turgentia reddatur: linteo deinde colato, aquā superfundēs, quo facilius quicquid est resolutum incerpōsit. Hoc iterum facito, usque dum satis tibi habuisse videatur. Vbi cōsederit, priore aqua effusa, non adijciens, ut cadmiam lauato, donec nulla extet nigritia, postea in pastillos cogens reponito. Quod scobem mundi plumbi lima quæsitam, mortario stilloque lapideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat: mox ubi pessum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos. Tritum vehementer, cerussa simile redditur. Alij mata scobi modicā plumbaginem adijciunt, affirmantes ita elotum plumbum præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, extirpare cana, sistere oculorum fluxiones, & ulcera et crescentia. Sanguinem supprimit: prodest contra dis ulcera, condylomata, & hæmorrhoidas, ex resaceo: item ad ea quæ agrè cicatricem ducunt: et in totum spodij effectus præbet, nisi quod non obicit crustas. Syncerum plumbum affrictu, maris scorpionis draconisque plagis auxiliatur.

V Plumbum vstū. CAP. XLVII.

Ritur plumbum sic: Super quā tenuis

m

las plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur
 spargito, additisq; alijs rursus laminis, interie-
 to semper sulphure, vsquedum vas expleueris, suc-
 cundito: flagrante autem plumbo, ferrea rude ver-
 to, donec perfectè redigatur in cinerem, nihilq; e-
 lumbo non vstum hæserit: tum dcum obstructis
 aribus, eximito: alioquin halitus plumbi noxius
 ntitur. Aut elimatum plumbi scobem in olla sul-
 hure vrito. Alij laminas in fictili crudo, vt dictū
 t, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes
 erculum, dato exili spiramēto, vrunt. Alij pro sul-
 hure cerusam aut hordeum inspargunt. Alij inte-
 ras laminas imponentes, acri igne vtūtur, & ru-
 cula ferrea cōtinuè mouent, dum in cinerem sol-
 untur. Sed difficilis huiusmodi vstio, & si vehe-
 entius vratur, cōtrahit spumæ argenti colorem.
 agis tamē nobis placet prima vrendi ratio. Plum-
 um vstū laisatur vt cadmia, & reconditur. Eos-
 m effectus habet, quos plumbum elotum, sed mul-
 acriores. Recremētum plumbi, quod scoriam vo-
 nt, optimum est, densum, fractu contumax, cerus-
 m planè representans, nihil plumboſi habens,
 iod ad luteum colorem accedit, & vitri splendo-
 m imitatur. Eadem quæ plumbum exustum po-
 t, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs in-
 sa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ lu-
 um colorem duxit: idq; sæpius, dum recremen-
 m absumatur. Dein vbi confederit crassamen-
 tum

tum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Molybdos lapis à plumbi similitudine dictus, respondens recremento vim habet, & eodem modo lauatur.

Stibium.

CAP. XLIX.

Antimonium.

Stimmi optimum, quod splendidissimum est modoq; nitidarum emicat, confractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabile, quo stibi appellant, alij platyophthalmon. Vis eius adstringere, meatus obstruere, refrigerare, excrescentia in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere, sordes & ulcera oculorum expurgare. Sistit & sanguinem è cerebri membrana profluentem: & ut in vniuersum dicatur, vis vsto plumbi similis est. Priuatim, ambusta igni, in pustulas rumpere non patitur, cum adipe recenti illitum: crustosus exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cera & exigua cerusa. Torretur pinsita farina cuculitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crusta, exemptumq; restinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut vetere vino. Virtus etiam carbonibus succensis efflatum, quoad igni aflagret: si enim paulò magis cöcremetur, plumbum fit. Lauatur, ut cadmia & æs. Sunt qui ut plumbi recrementum eluant.

Molybdæna, seu plumbago. CAP. L.

Molybdæna optima est flaua, argentea spumosa emula, modicè splendens, cum teritur rufa, cocta cum oleo iocineris colorem trahit. Virtus

tio

LIBER QUINTVS. 449

leſa eſt, quæ aërem aut colorem plumbeum refert. gignitur ex auro & argento. Eſt etiam quædam oſſilis, ad Sebaſtiam & Corycum inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidoſa non ſit, aut recre- mentoſa, ſed nitens & flaua. Vim habet ſpumæ ar- genti, aut recremento plumbi ſimilem. Vritur laua- urq; eodem modo. Miſcetur convenientiſſimè me- dicamentis, quæ liparas vocant, atq; emplaſtris mi- nimè mordentibus. Carnem recreat, & vlcera ad cicatricem perducit: glutinantibus tamen medica- mentis, aut abſtergentibus non conuenit.

Argenti recrementum. CAP. LI.

Recrementum argenti quod ſcoriam vocant, aut helcyſma, aut encauma, molybdenæ vim habet: quare emplaſtris quas phæis appellant, addi- tur, ac medicamentis quæ cicatricem obducunt, vt- pote cum adſtringat, extrahatq;.

Spuma argenti. CAP. LII.

Spuma argenti quædam gignitur ex arena, quam molybditin vocant, in fornacibus conſla- a, donec perfectè igni incandeſcat. Altera ex argento: tertia ex plumbo. Probatiffima eſt At- ica: ſecunda, Hiſpanienſis: hæc ſequitur quæ ſit Dicæarchiæ, id eſt Puteolæ, Baij, in Campa- nia, & Sicilia: plurima enim hiſce locis è fla- rantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ fla- uo colore ſplendet, chryſeis appellatur, omnium optima: quæ in Sicilia, argyrius: quæ ex argen-

Lithargiriū.

20, calabritis. Vis autem adstringere, mollire, exp-
 re caua, excrescentia in carne reprimere, ad cicat-
 cem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur arge-
 ti spuma, confractis partibus ad magnitudinem
 glandium, prunæ superpositis: ita accensa folli-
 bus ut conflagret, abstergitur insidens spurcitia, &
 conditur. Aliqui ter aceto aut vino restinguente
 rursus vrunt, & eadem prosequuti, reponunt. La-
 uatur ut cadmia. Ut argyritidi nominata, aut,
 desideretur, alteri candor detur, ea in parteis ma-
 gnitudine fabarum confracta, chenicis Atticæ mi-
 sura, fictili nono superfusa aqua, addito candidi ti-
 tici pari pondere, priuatimq; pugillo hordei, lin-
 teolo puro, raro, ansulis vasis alligato, coquitur, &
 nec hordeum fractum dissiliat: deinde omnia in ni-
 uum craterem oris ampli transfunduntur: trit-
 cum abicitur, spuma argenti vehementer mani-
 bus affricando infusa aqua lauatur, assiccataq; i
 Thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua
 donec soluta fatiscat: excolata aqua, iterum tot
 die teritur, & vesperi infusa calida aqua sinitur
 mane colis excernitur, alia infunditur, atq; ter di-
 excolatur. Id septem diebus fieri solet: postea addi-
 tis ad singulas minas spumæ argenti, quinis sali-
 fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter die te-
 ritur, & addita aqua excolatur: cumq; inal-
 bue-
 rit, calida infusa, idem facito, dum nullam pror-
 sus salsedinem recipiat. Demum ardentissimo sol-
 sicca

LIBER QUINTVS. 458

siccata, eiectio prius humore, reconditur. Sin minus,
mina spumæ argyritidis diligenter teritur, addi-
to sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile no-
uum conijcitur, aqua infunditur, ita ut superemi-
neat: mouetur quotidie mane & vespere, aqua q; su-
perinfunditur, priore nequaquā effusa. Hoc fit tri-
ginta diebus: nanq; nisi moneatur, crassescit, usque
in duritiem teste. Post hæc, effusa leniter muria, in
Thebaico mortario spuma argenti teritur, conie-
cta q; in fictile aquam continens, manibus diligen-
ter agitatur, mutata subinde aqua donec nullū sal-
uginis indicium præbeat. Deinde quod ex argenti
spuma cādidum apparet, in vas aliud transfertur,
& redactum in pastillos, plumbea pyxide condi-
tur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudi-
nes confractam, in ventre suillo crudo ex aqua co-
quunt, dum viscus eliquenscens contabescat, exem-
tam q; cum sale pari terunt, & ut supra dictum
est lauant. Sunt qui salis libram vnā, & spumæ
argenti tantundem, in sole terāt, aqua continuè mu-
tata, dum cādor ei detur. Alia ratio: Sumito quan-
tā vis argenti spumā: vbi lana candida inuolue-
ris, fictili nouo indita aqua, cū pugillo fabarū recē-
tū repurgatarum q; decoquito. Cum q; fabæ disru-
ptæ dehiscant, lana q; non denigretur, exemptam ar-
genti spumā, & altera lana inuolutā, iterum coqui-
to, cyathum aquæ & parem fabarum modū adij-
ciens: eadem tertio, quæ supra, facito: in summa,

Ff

tantisper, dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortarium, ad singulas salis fossitij libras, adijcito octogenas spumæ argenti drachmas Atticas, et terito: intermittensq; nitri quàm albißimi cum aqua diluti drachmas quadraginta septem indito: iterum terito, donec satis candoris cõtraxisse videatur. Ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi cõsidere desierit, colato: tum nouam supradictiens aquam, manibus probè versatam finito vt considat, ac rursus per colum traicito. Alternis eadem prosequere, dum pura aqua dulcisq; effluat, et nullam salsedinem præ se ferat. Postremò in fictile nouum translata, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus sub Canicula sydus exposito, & siccata vtitor. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum fæditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatricosas, lateratasq; & macularum plenas.

Cerulea.

CAP. LIII.

Cerulea fit hoc modo: Infuso in vrceū oris laticati, aut fictile labellū quàm acerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculū, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiecißisq; velaminibus, ne halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, humorem purum ad summa delatum colato, crassamētumq; transfundito: debet quoq; siccari in sole, mox tru-

sas

salili mola teri, aut aliàs tritum cribrari. Postea quod superest duri, in tenues partes redigendū, cribrandumq;: vicissim eadem tertio quartoq; facienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculorum assumenda. Secundum locum tenet sequēs, & reliquæ suo ordine. Nec desunt qui ligneas rudes, in medio vase appendant, & derafo ceu situ imposito, ita vt acetū non contingat, inditoq; operculo circumlinentes dimittunt. Post dies decem, laxato obturamento visunt: cumq; resoluta materia fuerit, reliquæ, vt supra diximus, exequuntur. Si autem quis in pastillos velit digerere, aceto acris subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate tamen supra dictum opus obeundum est: ita enim candida atq; efficax redditur. Quinetiam hyeme paratur, vrceis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis: ascendens enim calor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedæmone, proximam Puteolis. torretur hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, maximè Attico, tritam cerussam imposito, & assidue versato: cumq; cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & vitior. Est & illud vrendi genus: Trita patinis nouis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec colore similis sandarachæ fiat: extractaq; ad vsus ministratur. Quæ verò ita parata est, sandyx à quibusdā dicitur, Lauatur cerussa cadmiæ modo.

Vis ei refrigerare, occludere, emollire, explere, extenuareq; in super excreſcentia leniter reprimere, & ad cicatricem perducere. Miſcetur ceratis, & emplaſtris quæ liparæ vocantur, paſtillis q; eſt autem letalis eius potus.

Chryſocollo.

CAP. LIII.

Chryſocollo laudatiſſima Armeniaca, colore porri quàm ſimillimè reddēs. Secundū locum ſibi vendicat Macedonica, & proximum Cypria, quò in genere præfertur pura: damnatur, quæ terram aut calculos collegerit. Ratio lauādi hæc eſt: Tuſam infuſa aqua, mortario expaſſa manu ad pilam vehemēter fricato, & ſtatim quàm conſederit, colato. Alteram infundens aquam, ruſum terito: hæc viciffim proſequere, donec pura ſynceraq; ſpectetur. Dein ſiccato in ſole, & ad uſus recondito. Quòd ſi vrere volueris, ex ea terens. quod ſatis eſſe videbitur, patinis ſupra carbones adponito, et alia facito quæ ſuprà diximus. Dos chryſocolle ad purgandas cicatrices: excreſcentē carnem coërcet: adstringit, purgat, excalficit, & modicè corpus mordendo exēſt. Inter medicamenta intelligitur, quæ vomitiones concitant, & necem inferre poſſunt.

Lapis armenius.

CAP. LV.

Armenius lapis præfertur leuis, colore cæruleo, perquàm equabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quæ chryſocollo præſtat, ſeu inefficacius. Quinettam uſum habet ad pilos in

pa

palpebris alendos.

Cæruleus.

CAP. LVI.

Coerulei origo ex ararijs metallis in Cypro: copiosior ex arena litorali: secundū quosdam sub cauatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur vt chalcitis, lauatur vt cadmia. Vim habet reprimentem, & modicè erodentem: crustas gignit, & exulcerat.

Indicum.

CAP. LVII.

Indici duo genera, vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alterum infectoria dant officinae: & est spuma purpurea innatans cortinis, quam detractam artifices siccant. Optimum existimatur quod cærulei speciem præbet, succum suum sorbet, et læue. Inter medicamenta est quæ leuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpunt: purgat, & reprimat vlcera.

Ochra.

CAP. LVIII.

Ochram leuissimam, & omninò luteam eligere oportet saturatam non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare: excrecentia in carne reprimat: caua cum cerato explet, & articularum tofos comminuit.

Cinnabaris.

CAP. LIX.

Hallucinantur qui cinnabarim minio ean-

F f 3

dem esse existimāt. Minium enim in Hispaniis ex lapide quodam argentea arena permisto, temperari solet, alioqui non dignoscitur. Fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumq; colore permutatur, in metallis verò strangulantem halitū eructat: itaq; facies incolae vesicis obuelant, ut per illas spectent, nec respirādo noxiū aërem attrahūt. Eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris verò ex Aphrica deferitur, & magno constat: haec tenus inuenitur, ut vix versicoloribus pictorum lineis satisfaciat: intento colore nec diluto praeditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris haematita lupillo eandem: conuenit ad oculorū medicamēta, verū efficacius: magis enim adstringit, & sanguinē cohibet. Ambustis igni, & papularum eruptionibus, cerato excepto, medetur.

Argentum viuum. CAP. LX.

Argentum viuum fit ex minio, quod abusuē cinnabaris dicitur, patinis fictilibus imposita, ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt siquidem deteresa fuligo, quae calici insidet, refrigerata in argentum viuum coit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinatum tectis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stanneis, aut argenteis vasis: siquidem aliam materiam

riam omnē excedit. & defluere facit. Potum vinū perniciousē habet: suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum & vomitionibus reiectum, aut vinū cum absinthio, aut apii decoctū, aut semen homini, aut origanum, vel hyssopum cum vino: auri limata scobs, id est ramentum quā tenuissimum epotum mirabili est auxilio.

Rubrica Sinopica. CAP. LXI.

Rubrica Sinopis maximē probatur grauis, densa, ad iocineris imaginem vergens, calcu-
lorum expers, concolor, cum diluitur, impendio fu-
silis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdā,
expurgataq; defertur in Sinopem urbem, in qua
venditur: vnde cognomentum accepit. Vim habet
exiccatoriam, quasi inducendo obstruētem, & ad-
strictoriam: quapropter vulnerarijs emplastris,
& pastillis exiccantibus, & adstrictorijs com-
misceri solet. Aluum sistit, in ouo sumpta aut cly-
stere infusa: datur iocineris vitio laborantibus.

Rubrica fabrilis. CAP. LXII.

Rubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior
est. Optima Aegyptia, & Carthaginensis,
lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Ibe-
ria quae ad occidentem spectat, ochra exusta, &
degenerante in rubricam.

Lemnīa terra. CAP. LXIII.

Lemnīa terra, cuniculoso in specu nata ē
Lemno insula, palustri loco defertur, inibi

electa, & caprino sanguini permista: quam inco-
le cogunt in pastillos, & imagine caprae signant:
vnde & sphragida egos, hoc est, sigillum caprae,
appellauere. Vim antidoti habet contra perniciofa
venena singularem, pota cum vino, & praesumpta,
euomi venena cogit. Contra ictus morsusq; anima-
lium, quae exitiale virus eiaculantur, prodest. An-
tidoti familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia vtan-
tur: est & dysenteriae utilis.

Atramentum futorium. CAP. LXIII.

Atramentum futorium genere quidem vnum &
idem est, molle & concretum: sed in specie dif-
ferentias treis habet. Vnum namq; humoribus stil-
latim in cuniculos quosdam colatis, concrescit: quare
ab ijs qui Cypria metalla perficiunt, stillatitium ap-
pellatur. Petesius ipsum pinarion vocat: alij stala-
clicon, id est, stillatitium. Alterum simplici ratione fit
in speluncis: postea transfusum in excavatos scrobes,
concrementum capeßit, quod pecton, id est concretum
tium, proprie nominatur. Tertium dicitur coctile,
& in Hispania fieri solet: sed inutile ac inualidissi-
mum esse constat. Ratio parandi haec est: Aqua ma-
defactum decoquant, mox in piscinas transfun-
dunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus co-
alescit, in complureis formulas digestum, tessera-
rum speciem reddentes, quae racematim inter se co-
haerescunt. Optimum esse creditur, caeruleum, gra-
ue, concretum, translucens: cuiusmodi stillatitium
est

ab alijs lonchoton nominatum. Proximum, con-
retitum. Cocleile verò ad infectus, & denigratio-
es, aptius cæteris esse compertum est: sed ad medi-
næ vsus inualidius esse, experimenta docent. Va-
t adstringere, calfacere, & crustas inducere: latas
entris tineas necat, drachmæ pondere deuoratum,
ut cum melle linctum: vomitus ciet: aduersus hau-
a fungorum venena, ex aqua potum auxiliatur:
urgat caput, aqua dilutum, & in vellere naribus
istillatū. Vritur, vt paulò post in mentione chal-
tis ostendemus.

Chalcitis.

CAP. LXV.

Chalcitis præfertur similis æri, friabilis, nec la-
pidosa, nec inueterata, intercurrentibus oblon-
gis venis, splendentibusq;. Huic abstersoria vis in-
t, exalfaciens, & crustas vlceribus obducens pur-
at quæ oculis & eorundè angulis hærent. In ge-
ere leuiter excedentiū est. Ad ignem sacrum, & vlce-
i quæ serpunt, efficax est. Sanguinem è vulua, &
aribus erumpentem, cum succo porri sistit: gingi-
arum vitia, depascētia vlcera, tonsillasq;, eius fa-
na cōpescit. Vsta, & cum melle trita, oculorum
medicamētis longè utilior redditur. Callum gena-
um, & scabritiam absūmit, abstergetq;. Fistu-
s tollit, collyrij modo in eas adacta. Fit ex chalci-
medicamentum quod psoricon vocāt, duabus eius
artibus, cum vna Cadmiæ additis, & ex aceto
itis. Oportet autem in fictili obruere fimo, diebus

F f 5

quadraginta, per Caniculæ ardore: sic enim fit acrius. Idem quod chalcitis potest. Alij pares utriusque portiones in vino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, viniis carbonibus superposito. Modus autem vstionis in humidioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare desierit, perfecte inaruerit: in reliquis verò, dum mutata floridum colorem fuerit, et sanguineum & minimum colorem contraxerit, tum demum exinienda est. Insidens autem spurcitia flatu expellenda, mox reponenda. Torretur etiamnum perflatus carbonibus, vsquedum luteo colore palle scat: aut fictilibus subditis candentibus prunis, subinde versata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

Misy.

CAP. LXVI.

Misy assumendum natione Cyprium, aut simile, durum, quod friando auri color imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet & vstionem cum chalcitide eandem, præterquam quod psoricum ex eo non conficitur, excessus defectusque ratione tantum differens. Aegyptium autem ceteris præstat, utpote quod efficacius habetur, sed ad ocularia medicamenta multò superaculo inerior.

Melantheria.

CAP. LXVII.

Melantheria gemina est originis: quædam in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur, salis modo concreuit. Alia verò in summis fa-

icie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Inmetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus, fossilis quadam. Præstat, quæ sulphuris colorem trahit, læuis, pura, æquabilis, & a contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticam eam obtinet, quam & misy.

Sory.

CAP. LXVIII.

Sory existimarunt aliqui melantheriam esse, aberrantes, siquidem sui generis est sory, & non absimile: verum soræi virus inest graue, & auferam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, vt in Libya, Hispania, & Cipro. Præfertur Aegyptium, quodq; ianti nigrius apparet, in multa foramina deiscens, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuorationeq; magnum virus olens, ita vt stomachus in vomitione effundatur. Quod autem iatum scintillas misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & vstionem supradictis similem habet: dolori dentium, cauernis inditum medetur, eosque labantes firmat: ischiadicis ex vino infusum auxiliatur: illitum cum aqua, varos extinguunt, medicamentis admiscetur, quæ capillos denigrat. Hæc autem ferè omnia, & alia quæ vstionem exerta non sunt, perustis validiora esse existimantur: præter salem, & vini facem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Com-
busta

busta enim, viribus efficaciora redduntur.

Diphryges.

CAP. LXIX

Diphrygis tria genera esse creduntur. Quod-
dam enim metallicum est, quod in Cypro sol-
gignitur lutosum namque extrahitur, ex luto cuius-
dam inibi specus: extractum, sole siccatur, mox cir-
cumpositis sarmentis vritur, diphryges ideo vo-
catum est, quod & à sole, & à sarmentis vratur
arescat, & ferme torreatur. Alterum perfecti aeris
quasi subsidens faex est: siquidem post frigida aqua
offusione, ut supra retulimus, cum de flore aeris disse-
reremus, sublato aere, fornacum ima parte coherens
id genus inuenitur, & adstrictione & gustu aeri
habens. Tertium sic fit: Lapidem pyriten, ut calcen-
multos dies cremant in camino: cumque colorem ru-
bricæ contraxerit, eximentes recondunt. Quidam
tradunt hoc ex sola materia, quæ lapidem aeris gi-
gnit, fieri: quando indictis aeris assata, & in scro-
bes translata peruritur. Tunc enim ambientem scro-
bis, locum comprehendit, et exemptis lapidibus nihil
minus inuenitur. Praefertur quod saporem aeris red-
dit, æruginisque, adstringens, et vehementer exccan-
linguam: quod sibi exusta oclra non vendicat: quæ
cremata, diphrygis vice venit. Vis eius adstrin-
gere, perpurgare, extergere, siccare, excrescentia
consumere, ulcera serpentia, & quæ cacoethe vo-
cant, ad cicatricem perducere. Suppurationes te-
rebinthina aut cerato exceptum discutit.

Aur

LIBER QUINTVS. 463

Auripigmentum. CAP. LXX.

Auripigmentū in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optime existimatur crassum, aureo colore micans, nulli materiae permixtum, in squammas fissile: quale in Mysia Hellespō nascitur. Huius duo genera fluxerūt: Vnū supraētū est. Alterum glandis effigie, pallidū, & coloris sandarachā imitans, glebosum, ex Ponto, et Capadocia defertur quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testa noua viuis carbonibus subiectis, assiduoq; versatur, donec igne flagret, & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumq; recoditur. Habet adstrictoriam, & erodentem, crustas in vehemēti vredine, & violento morſu excutit: reprimat quæ excrescunt, & capillos euellit.

Sandaracha. CAP. LXXI.

Sandaracha probatur rufa, & saturatioꝝ, & aliena materia vacans, friabilis, cinnabaris colore, sulphuris virus redolens. Dos eadem & stio, quæ auripigmento: explet alopecias, resinaecepta, & scabros vngues cum pice eximit: contra phthiriasin ex oleo efficax est. Tubercula cum dipe discutit. Prodest ad narium orisq; vlcerum, & cæteras papularum eruptiones cum rosario: item condylomata. Datur ex mulso, purulentis extusſientibus. Suffitur quoque cum resina, diuersus veterem tussim, rapto per fistulam minore: vocem expedit, cum mille delincta: suspiriosis

cum

cum resina in catapotio optimè datur.

Alumen.

CAP. LXXII.

OMne aluminis genus ferè in Aegypto, & i
eisdem metallis inuenitur: etenim scissile quod
dam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & i
alijs quibusdā locis, in Melo, in Macedonia, in Li
paris, Sardinia, Hierapoli Phrygia, Aphrinea, Ar
menia, & plerisque alijs regionibus, sicut & ru
brica. Plurimæ eius species: verum ad medendi
usum, scissile, rotundum, & liquidum expetuntur.
Optimum est scissile, præsertim recens, candidissi
mum gustu perquam adstringens, graue olens, ca
culorum expers, nec glebuloſe aut assuloſe compactū
sed sigillatim in capillamenta quædā canescenti
dehiscens, quale est quod trichites, quasi capillare no
minatur, in Aegypto natū. Reperitur quoq; lapi
huic alumini persimilis, qui gustus iudicis digno
scitur, quod nō adstringat. Damnatur in rotundi g
nere, quod manu confectum est: sed ex figura depre
henditur. Assumendum autem suapte natura rotū
dum, bullis turgens, albo propius, atq; validius ad
stringens, præterea nōnihil palloris cum quadā pin
guitudine præ se ferens, sine arenis, friabile, natio
ne Aegyptium, aut ex insula Melo. Liquidum proba
tio, ut sit lymphicum, lacteum, æquale, et semper sui
co madens, sine lapidibus, atq; quendā coloris igni
culum expirans. Vim habent excalfaciendi, strin
gendi, & expurgandi, quæ caliginem pupillis ocu
lor

lorum offundit: genarum carnem, ceterasq; excre-
 scencias extenuant. Scissile rotundo efficacius intel-
 ligitur. Vri et torreri chalcitidis modo debet. Putre-
 scencia vlcera cōpescunt: sanguinis fluxiones inhi-
 bent: gingiuas humore pragnātes cōprimunt: mo-
 tus dentiu cum aceto & melle firmant. Prosunt cū
 melle vlceribus oris, eruptionibus papularum, &
 fluxionibus auriū, cum sanguinalis herbæ succo: le-
 pris cōueniunt cum brassicæ folijs aut melle cocta:
 itē pruritui, & vnguiū scabritijs, pterygjs, et per-
 nionibus, aspersa cum aqua. Valent cū aceti fæce, et
 galla, pari pondere cremata, ad phagedænas vlce-
 rum, & cum salis duabus partibus, ad vitia quæ
 pascūt: furfures cum eruo & pice illita abstergunt:
 ad lendes, pediculos, ambusta, cum aqua illita au-
 xilio sunt. Contra tumores, & graue alarum in-
 guinumq; virus, illinuntur. Ex Melo autē aduectio,
 mulieribus præstat ne concipiant, ante coitum ori
 vuluæ inditum: partus quoque extrahit: gingiuis,
 si caro excreuit, vna ac tonsillis accōmodantur: ori,
 auribus & verendis cum melle illinuntur.

Sulphur.

CAP. LXXIII.

Sulphur optimum existimatur viuū, quod apy-
 ron vocant, nitedule modo splendidum, perlu-
 cens, minimè lapidosum. Probatur in genere sul-
 phuris ignem experti. quod viret, ac prapinguae spe-
 ctatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur.
 Supradictum sulphur calfacit, discutit, & cele-
 riter

riter concoquit: prodest tussibus, suspiriosis, purulenta extusientibus in ovo sumptis, aut suffitum: pterea partus, vsti nidore extrahit: lepras, lichenas, scabros vngues, cum resina terebinthina mistis, affert: cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est: tiligines tollit: scorpionis ictibus, addita resina, medetur: cum aceto vero, draconis marini scorpionis plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes, cum nitro detersum, sedat: regium morbum emendat, in sparsum fronti cochlearis mensura, aut in sorbili os sumptum. Facit ad grauedinem, & destillationes sudores quoque: conspersum inhibet: podagricis, cum aqua & nitro illitum, conducit: grauitatem auditus, suffiti nidore raptim per fistulam hausto, sanat: lethargicos suffitu excitat: erumpentem vnde decunque sanguinem sistit: contusis auribus, cum vino & melle illitum medetur.

Pumex.

CAP. LXXIIII.

Pumicis probatio, ut magnopere leuis, spongiosus, scissilis, nec arenosus, item teri facillius, & candidus. Crematur fragrantissimis carbonibus obrutus, & ubi canduerit, extractus, vino restinguitur odorato: iterumque incensus extinguitur: & tertia vstione exemptus, & per se refrigeratus, ad vsus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere: purgat cum calfactione, quae caliginem pupillis offundunt: explet vlcera, & ad cicatricem perducit: excrescentia cohibet. Fit ex far

LIBER QUINTVS. 457

rina eius dentifricium. Corpori crustam obdu-
at auellentis capillis aptus. Theophrastus author
si quisquam in bullientem vrceum vini pumi-
in iniecerit, feruorem statim sedari.

Sal.

CAP. LXXV.

Al fossilis efficacior est: communiter, si est can-
didus, calculis vacans, & perspicuus, densus,
quali compage. Peculiariter Ammoniacus natio-
laudatur, si modo findi facile possit, & in recta
menta diduci. In marino sale eligendus est candi-
s, & equalis, densus. Probatissimus in Cypro fit, et
alamine Cypri, & Megaris, in Sicilia & Aphri
Sed inter dicta salis genera lacustris praefertur:
multo validissimus est Phrygius nomine ta-
us, aut triteus, aut gantius Salis natura in com-
une perquam utilis est: adstringit, absterget, ex-
ergat, dissipat, reprimat, extenuat, & crustas in-
cit. Sed hoc interest, quod alius alio sit praestan-
r. Quin & a putredine vindicat. Admiscetur
dicamentis psoras abstergentibus. Excrecentia
oculis reprimat, & pterygia consumit, ceterasq;
nis exuberationes tollit: clysteribus infunditur:
cutit lassitudines ex oleo illitus. Contra hydropi-
um tumores auxiliatur, doloresq; in saxis fotu-
tigat, & pruritus sedat, ex oleo & aceto infri-
s ad ignem, donec sudent. Item lichenas, lepras, pso-
q; Angina ex melle, aceto, & oleo illitus leuat:
illis vnaq; cum melle tostus. Vlceribus in ore

Gg

manantibus, gingiuis quas humor vexat, & phagedænis vlcerum, cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus, cum lini semine: contra serpentium morsus, cum origano, melle, hyssopo. aduersus cerasen, cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopendræ morsus, cum melle & aceto: aduersus vesparum ictus, & teredines, albidasq; capitis pustulas, thymos & turbercula, cum seuo vitulino: furunculos cum vna passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumores cum origano, & fermento maturius concoquit. Crocodilorum morsibus auxiliatur, tritus, in linteolo, & intinctus aceto, ita vt vinculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in facie, ex melle. Contra haustum opium, & fungos, cum aceto mulso bibitur. Luxatis imponitur cum farina, & melle: ambustis igni cum oleo impostus, pustulas erumpere non patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus cum aceto: ignes sacros, & vlcera quæ serpunt cum aceto aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter operatus ne exiliat, conditusq; prunis, vsquedum efferuescat. Aliqui fossilem subactis polline obliniunt, & carbonibus subiiciunt, vsquedum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo vri: Aqua semel abluitur, & succatus in ollam coopertam mittitur, subdito igne, moueturq;, donec iam non exiliat. Spuma salis, spumosi maris lanugo siue ra-

men

LIBER QUINTVS. 469

mentum est, in exilibus petris inuentum, cui vis eadem qua salis.

Muria. CAP. LXXVI.

Muria effectus salis præbet, abstergitq; dysentericis infunditur, etiam si nome intestina corripit: et ischiadicis veteribus. Ad fatus, aqua marinae usum præstat.

Flos salis. CAP. LXXVII.

Flos salis flumine Nilo defluit: lacubus tamen quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, tenuis gari. Interdum longè magis virus olet, gustuq; mordacior, & pinguius. Fucatus autem rubrica, aut scrupulosus, improbat. Præterea syncerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiã aqua, diluente facilius colorem. Ad vlcera quæ cacoethes vocatur, & phagedenas, genitalium nomas, & purulentas aureis, efficax est: oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. Emplastris vnguentisq; coloris causa, vt rosaceo, miscetur. Sudorem cit: alui turbat, in vino aut aqua sumptus: stomachum male habet. Additur acopis, & smegmatis, quæ albanis capilli gratia cõponitur: & in vniuersum acris est, & feruentis naturæ, vt sal.

Nitrum. CAP. LXXVIII.

Præfertur nitrum leue, roseo colore, aut candido, in foramina delibescens, perinde quass

Gg 2

spongiosum quidam, quale ex Bumis affertur. Ha-
 mores euocat, qui in alto concreuerunt. Spuma in
 tri optima esse putatur, leuissima, glebosa, friabili
 colore penè purpureo, aut spumosa, & morden
 qualis ex Philadelphia Lydiae defertur. Secunda e
 Aegyptia. Quin & in Magnesia Caria gignitur
 Vim & vstionem salis habet, tam nitrum quàm
 spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, si tri-
 tum cū cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa-
 aut aliquibus, quæ inflationes discutere possunt, v-
 ruta, vel anetho. Febris circuitu redeuntibus i-
 linitur, ante suspectam accessionem. Miscetur em-
 plastris, quæ extrahunt, & discutiunt, extenuant
 & lepras abstergunt. Cum aqua autem calida
 aut vino infusum, inflationes, purulentas aureas
 & sonitus earundem sanat: sordes expurgat, cum
 aceto instillatum. Canum moribus ex asinino ac-
 pe aut smillo medetur: resina terebinthina admist-
 furunculos aperit: aqua inter cutem cum fico illin-
 tur: oculis ad claritatem visus cum melle succurrit
 & venenis fungorum, ex posca potum: aut si bupr-
 stis momorderit, ex aqua: ijs verò qui taurinum
 sanguinem biberint, ex la serpitio: ijsq; qui cibum
 non sentiunt, vtiliter obducitur: opisthotonisq; iam
 remissioribus, & luxatis, cum cerato: in resolutio-
 ne linguae, panis commodè permiscetur. Aliqui su-
 pradicta carbonibus vrunt, subiecta prius testa ne-
 ua, donec incandescant.

Fax.

ELigenda fæx maximè à vino vetere, Italico: sin minus, ab alio consimili. Fæx aceti viribus ongè acrior est. Crematur vt alcyonium, antè diligenter siccata. Sunt qui noua testâ igni largo vrant, vsq; dum penitus incendatur. Alij viniis carbonibus facis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ vstionis, vt aërio nitore, in albescat, linguamq; tactu vrere videatur. Eadem vrenula facis aceti ratio. Vis ei supra modum vrens, & abstergens: vlcera ad cicatricem perducit, adstringit, vehementer exest, siccatur. Sed recenti vtendum est, quoniam celeriter exanimatur: proinde nō nisi in reconditorio, & vase aliquo reponi debet. Lauatur, vt pompholyx. Quæ vstionem experta non est, tumores & per sese, & cum myrto cohibet: ventris stomachiq; fluxiones illita sistit: muliebri profluvium, imo ventri aut genitalibus imposita, mitigat: panos discutit: nondum exulceratos, & tubercula: rigentes mammæ, sui q; lactis impatientes, cū aceto peruncta extinguit. Cremata verò, vngues scabros cum resina aufert: addito lentiscino oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elota oculorum medicamentis, vt spodos, adijcitur: cicatrices eorum & caligines eadem abstergit.

Calx viua.

CAP. LXXX.

CAlx viua hoc modo fit: Marinorum buccinorum testas igni condito, aut feruenti cli-

Gg 3

bano nocte dimittito: postera die, si candidissimo fuerint, extrahito: sin aliter, iterum vrito, vsque dum vehementer in albuerint. Dein vbi in aquam frigidam immersa fuerint, in fictile novum conijcto, & exacte pannis operiens, noctem vnā conquiescere finito: mane eam extrahens, vbi perfecto omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è litoralibus calculis igne crematis, necnon è vili et fusaneo marmore, quæ cæteris præfertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens: quibusdam alijs immista, vt adipi, oleo, concoquendi vim assumit, mollit & dissipat: vlcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

Gypsum. CAP. LXXXI.

Gypsum vim habet adstringendi, obstruendi: sanguinis eruptiones sudoresq; colibet: sed potum, strangulationis modo ingulat.

Sarmentitius cinis. CAP. LXXXII.

Sarmentorum cinis vrendi vim habet: cum Saxungia autem vel oleo illitus, fractis nervis, articulorum collisionibus, & nervorum nodis prodest, cum nitro & aceto, excrescentias carnis in scroto reprimit: serpentium canumq; morsibus illitus ex aceto medetur crustas obducentibus medicamenti admiscetur. Fit ex eo lixiuium contra præcipitationes, & fungorum venena, cum aceto, Sale, & melle.

Alc

Alcyonii quinque esse genera compertum est: unum enim spissum, acerbis saporis, spongiosa facie, item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in litoribus inuenitur. Alterum pinnulae oculorum aut spongiae simile, fistulosum, & leue, odorem algae referens. Tertium vermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam vocant. Quartum succidis velleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue. Quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris leue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur, patrio nomine halos achnen vocant. Duo priora in foeminarum smegmata assumuntur, contra lentigines, lichenas, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in facie reliquoq; corpore. Tertium ijs qui difficili vrina vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est, item renibus affectis, aqua inter cutem, leni. Vstum autem, & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum deallandis dentibus aptum est: in alia smegmata, psilothraque assumitur, cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare velit, cum ale in crudum fictile mittat, & oblinens vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum sigillum percoctum fuerit, extrahens ad vsus recodet. Lauatur ut cadmia.

Adarces. CAP. LXXXIIII.

Fit in Cappadocia quod adarces appellatur: est autem tāquam concreta falsilago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asij similis, & omni forma molli alcyonio, & ali quātum cauo proxima, vt videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, & similia accommodatur: & in summa, vis ei acris. Humorem euocat qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

Spongiæ. CAP. LXXXV.

ESpongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarum duriores tragos nominant. Fœminas autem, quæ contrarias dotes habent. Vruntur eæ vt alcyonium. Recentes sine pinguedine, vulnerariæ sunt, & tumores reprimunt: recentia vulnera ex aqua poscæve conglutinant: veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetustæ autem inuiles. Aridæ ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa vlcera, callosq; laxant, siccæ recentes & vacuæ senilia vlcera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatim excedunt, impositæ siccant: sanguinis profluium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridæ lippitudini auxiliatur: & vbi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius, in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit.

Cand

Candida cura fiunt, e' mollissimis recentes, per ætus tinctæ salis spuma, quæ petris cohaeret: insolan-
tur inuersæ, hoc est, parte caua sursum spectante,
& quæ abscissæ fuerunt, deorsum. Si verò æstiuâ
serenitate ad lunam sternatur, perfusæ salis spuma,
aut maris aqua, maximum candorem referent.

Corallium. CAP. LXXXVI.

Corallium, quod aliqui lithodendron appel-
larunt, marinum esse fruticem constat, qui
alto extractus, duratur statim atq; emergit, tan-
quam offuso aëre protinus concreseat. Plurimum
inuenitur ad Syracusis, in promontorio cui Pachy-
no nomen est. Laudatissimum, rubens, colore an-
therici aut sandycis saturatæ, nec secus terenti fa-
cilè cedens, æquabili vsquequaq; concremento, rur-
sus algæ aut fuci marini odore, quàm ramosissi-
mum, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod
autem in lapidis duritiam coit, scrupulosum, ina-
ne, & lacunosum, vitiosum existimatur. Adstrin-
git, & refrigerat mediocriter: excrescentia coër-
cet: oculorū cicatrices abstergit: vlcerum caua, &
cicatrices explet: contra sanguinis reiectiones ma-
gnopere efficax est, vrinæ difficultati auxiliatur.
Quin & potius ex aqua lienem absumit. Quod an-
tiphtes vocant, corallium esse arbitrantur, specie
tantum distans. Est autem colore nigro, arboris
figura, ramosum magis. Vires supradicti habet.

Phrygius lapis. CAP. LXXXVII.

Gg 5

Phrygius lapis, quo infectores in Phrygia vñtur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadicia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, vt in cadmia. Vrinur autem vino optimi perfusus, viuisq; carbonibus obrutus, perflatur assidue follibus, donec mutato colore rufescat: rursus extractus eodem vino restinguitur. Hoc iterum & trinis vicibus faciendum: attendendum tamen, non minutim cōfringatur, & in fuliginem euanescat. Vis crudo vstoq; adstrictoria, expurgans: vlceribus crustas quadātenus inducit, ambustis cum cerato medetur. Lauatur vt cadmia.

Asius lapis. CAP. LXXXVIII.

Asus lapis assumi debet pumicis colore, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles venas lutei coloris ad imum actas habens. Eius flos, salsugine subflaua est, summo lapide insidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum vergente: admotus lingua aliquantum mordet. Vim habet vterq; adstrictoriam, & modicè erodētem: admistus liquida pici, aut terebinthinae, tubercula discutit. Longe validior flos existimatur. De cetero siccatus flos, vetera vlcerā & cicatrici repugnantia sanat: excrescentia colibet, tetraque vlcerā & fungis similia, cum melle expurgat: vlcerum caua explet, & expurgat cum melle depascentiaq; cum cerato sistit. Fit cataplasma ex eo

o podagris, misto fæle lomento: & lienosis, ex
 aceto & uina calce. Prodest flos ex melle phthi-
 sis linctus. Podagrici uiuantur, pedibus in solio (æ
 lapide cauato inditis. Fiunt quoque pulueres,
 ui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, &
 corporum crassitiem absumunt, cum uice nitri in
 alneo sparguntur. Si lauare libet, cadmiæ modo
 uatur.

Pyrites.

CAP. LXXXIX.

PYrites lapidis genus est, à quo æs conflatur. Eli-
 gi debet æris similitudine, facile scintillas ædes.
 ritur sic: Melle irrigatus molli pruna continuè
 latur follibus, donec rufescat. Alij in multos carbo-
 es igni candentes, lapidem copioso melle perfusum
 eiciunt, & ubi ad fuluum colorem vergere cœ-
 erit, extrahunt: efflatoq; cinere, rursus madesa-
 tum cremant, donec æquabiliter assiccatus, fri-
 lis reddatur: siquidem sepe facies summa solum
 ritur. Ita crematus, siccatusq;, reconditur. Si
 otopus sit, lauari debet ut cadmia. Tam crudi-
 uam vsti vis est, excalfacere, abstergere, offusam
 oculis caliginem expurgare, duritias concoquere,
 & concoctas discutere. Resina exceptus excrescen-
 a in carne cohibet, sed calorem quendam & ad-
 rictionem parit. Ita vstum nonnulli diphryges
 ppellant.

Hæmatites.

CAP. XC.

HÆMATITES optimus habetur friabilis, satu-
 rato

rato colore niger, durus & suo pte ingenio equalis, nulla sorde admista, nulloq; Zonarum discursu. Vim habet adstringentem, & excalfactoriam ali quantum extenuantemq; oculorum cicatrices & scabritiam cum melle purgat: cum lacte autem muliebri, lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusi conuenit: bibitur contra difficultatem urinae, & fluxiones mulierum in vino: & ab ijs qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo coticulae & collyria oculorum vitis apta. Vritur ut Phrygius, sine vino duntaxat. Modus uestitionis est, ut melle lenis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Summi qui haematiten ita adulterant: Densam glebam rotundamq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quae eius radices vocantur, in vrceum figlini operis, qui feruenti cinerem contineat, coquant, paucaq; interiecta morae eximunt, experiunturq; si trita ad cotem haematitis colorem reddat: quod si ita res se habet, reponunt: si minus, iterum obruunt, & subinde conspicientes, periculum faciunt: siquidem in cinere diu dimissus, colore mutato diffunditur. Coarguitur male confectus, primum scissilibus venis: quippe in rectos venarum discursus refringitur. At haematites longè secus si in colore habet: namq; hic floridum reddit: haematites verò saturatiorem, atq; cinnabarim imitatem. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è magneti lapide, vehementer ambusto. In Aegypto sponte nascitur & cum metallis enascitur.

Scl

Schistus lapis CAP. XCI.

Chistos lapis in Iberia Hispania gignitur. Probatur maximè qui croci colorem emulat, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & tereno cohaerentium venarum discursu, pectinum odore, Ammoniaco sali similis. Vim exhibet hæmorrhagica, sed ad omnia infirmiore. Quin & caua re et muliebri lacte perfusus: ad procidentia, rupta, & genarum crassitiem, & vnas oculorum, maxime opere efficax est.

Gagates. CAP. XCII.

Ngagatarum lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis redit: niger est plerunq; & squallidus, crustosus, peram levis. Vis ei molliendi, & discutiendi: deprendit fonticum morbum suffitus, recreatq; vulnæ angulationes: fugat serpentes nidore: podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qua influens amnis in mare effunditur, proxime oppidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autem & locus & amnis Gagas, in cuius fauibus ij lapides inueniuntur.

Alij plures lapides. CAP. XCIII.

Apis thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythia, cui Ponto nomen est. Vis ei gaga. Traditur aqua accendi, & oleo restingui: quod bitumine accidit. Magnes lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæruleum vergente, dens

densus, nec admodum grauis. Datur cū aqua mu-
 sa, trium obolorum pondere, vt crassos humores
 liciat. Sunt qui magnetem crematum pro hēma-
 te vendant. Arabicus lapis maculoso ebori simili.
 Is tritus illitu hēorrhoidas exiccat: eius cinis de
 trificio optimus. Galactites appellatur, quod lactis
 succum resudet: cinerei tamen est coloris, ac gustu
 dulcis. Ad oculorum fluxiones & vlcera conuenien-
 ter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pyxide
 plumbea recondere, propter vim glutini, quod
 obharet. Melitites omnia galactitē similis: hoc ta-
 tum interest, quod dulciorem succum remittit. Eiu-
 dem vt galactites effectus. Marochithus lapis, quem
 aliqui galaxiam, aut leucographida vocauerunt
 in Aegypto nascitur: quo, vtpote molli, & facile l-
 quescente, linteones dealbandis vestibus vtuntur. Si
 racula corporis obstruere videtur, conueniens i-
 qui sanguinem expuunt, coeliacis, & vesicæ dolo-
 ribus, cum aqua potus itidem fluxionibus vuluæ, &
 imposuiss velleri. Mollihus oculorū collyrijs misce-
 tur: explet enim caua, atq; delacrymationes sistit.
 Idem cerato exceptus, vlcera quæ sunt in teneris
 partibus corporis, ad cicatricē perducit. Alabastrites,
 vocatus onyx, crematus, refina aut pice assum-
 pta duritias discutit: stomachi dolores cum cerato l-
 uat, & gingiuas comprimit. Lapis nomine thyr-
 zes, in Aethiopia gignitur, subuiridi colore iaspide
 imitatus: cum diluitur tamen lacteum succum rec-

du

Vehementer mordet: tenebras, quæ pupillis ob-
 santur, expurgat. Iudaicus lapis in Iudæa na-
 ur, glandis effigie, candidus, scita admodum con-
 ratione, lincis equaliter inter se distatibus qua-
 ndustria detornatis solutus nullam qualitatem
 manifestam gustui representat. Potest ciceris ma-
 itudine tritus ad cotem, vt collyrium, cum cali-
 aquæ cyathis tribus, potu difficultati vrinæ au-
 liari, & calculos in vesica comminuere. Amian-
 lapis in Cypro nascitur, scisso alumini similis
 o, vt pote flexili, telas & vela tantum spectacu-
 laria texunt, quæ ignibus iniecta ardent quidē,
 flammis inuicta splendidiora exeunt. Sapphi-
 s lapis, percussis à scorpione, potu prodesse existi-
 atur. Contra intestinas exulcerationes bibitur.
 crescentia in oculis, vnasq; & pustulas inhibet,
 ruptas membranas cogit. Memphites in Aegy-
 o iuxta Memphin inuenitur, calculorum magni-
 dine pinguis, versicolor. Tradunt trito & illito,
 æ vrenda aut secanda sunt, sine periculo obstupe-
 re, ita vt non sentiant cruciatum. Selenites la-
 s, quæ aliqui aphroselenon appellant, quoniam
 etu inuenitur lunæ imaginem reddere, quæ cum
 quidem augetur & decrescit. Nascitur in Ara-
 a, candidus, translucēs, levis. Huius ramēta comi-
 alibus in potu dari iubent. Eo cen gestamine ad-
 nuleta mulieres vtuntur. Arbores adalligato eo-
 frugifera redduntur. Iaspidium quædā smarag-
 dum

dum imitatur, alia crystallum, colore similis
 tuita: alia non dissimilis aëri, ob id vocatur aë-
 zusa: alia veluti fumo infecta, quæ capnias ex a-
 gumento vocatur: quædam lineæ albis & resple-
 dentibus præcingitur, Assyrios appellata: alia ter-
 binthæ similis, quæ terebinthiæ usa dicitur: alia e-
 lore callaida gemmam æmulatur. Omnes amul-
 ta esse traduntur, & accelerare partum femoribus
 appensæ. Aëtites lapis est veluti prægnans, cū quæ-
 titur, alio in utero sonante. Gravidis continet par-
 tus, cum lubricæ sunt vulvæ & parum tenaces, |
 sinistro brachio adalligatus: sed parturiētibus è bi-
 chio amoveatur, & feminibus alligetur, ut sine e-
 loribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pa-
 conditum offerat: fur enim mansum deuorare non
 poterit. Quinetiā concoctus, furem coarguit: quip-
 pe decocta cum eo, deuorare non poterit. Tritus, &
 cerato exceptus, cyprino, aut gleucino, aut alio ex-
 calfaciente, comitiales magnificè iuuat. Ophitæ g-
 nera multa: quidam ponderosus & niger: alter ci-
 nereo colore spectatur, punctis distinctus: tertius
 lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omne
 alligati cōtra capitis dolores, & serpentium ictu
 prosunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo, &
 capitis doloribus auxiliari. Lapides in spongijis in-
 ueniuntur, qui vesicæ calculos rumpunt, in vinum
 poti. Lithocolla glutinum, quo lapides coniun-
 guntur: conflatur autem ex marmore, lapide Pa-
 rio.

LIBER QUINTVS. 489

lo, & taurino glutine. Potest cādente specillo ad-
notum, incōmodos oculus pilos replicare. Ostraci-
s testæ similitudinē habet, crustosus, & in lami-
as fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro
umice vtūtur. Menses drachmæ pondere potus ex
ino, sistit. Si quatuor diebus à purgatione bibatur
cilici pondere, feminis præstat ne cōcipiant. Cum
nelle autem impositus, māmaram inflammatio-
es lenit, & nomas cohibet. Smyris lapis est, quo
mularij sculptores lapides expurgant, ad ero-
endū & vrendū utilis: gingiuis, quas humor ve-
at, prodest: dentifricio cōmenlatur. Arena è littori
sole feruefacta, hydropicorum tumores exugit,
capite terus, in ea obruantur. Torreri solet ad ari-
os fatus, pro milio aut sale. E cote Naxia, quod
acuēdo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilū
ducit: virginum māmās cohibet, nec increfcere pa-
tur: potum ex aceto, lienem absumit, & comitia-
bus prodest. Geodes lapis, adstringit, siccāt, caligi-
es oculorum discutit. Illitus autem ex aqua, te-
um mammaramq; inflammationes sedat.

Terra.

CAP. XCIIII.

OMnis terra ad medendi vsum recepta, sum-
mam & primam vim habet refrigerandi,
eatusq; obducendi, occludendiq;: sed specie di-
t, cū alia adiunctis quibusdam ad alia sit vti-
li. Eretriades duæ sunt, vna vehementer alba est,
tera cinericia. Optima habetur ad cinereum co-

Hb

lorem vergens, perquam mollis, quæ si per crame-
 ta tractim ducatur, lineam violaceam refert. Lau-
 tur ut cerussa, aut hunc in modum: Teritur seor-
 sum, & cum aqua, & ubi pessum ierit, humor le-
 uiter exiolatur: siccata solibus, iterum teritur inter-
 diu, adiecta aqua, ut vespere consadat: antelucani-
 colo excernitur, & demum in sole trita si fieri po-
 test, digeritur in pastillos. Quod si tostata desidera-
 tur, pastilli magnitudine ciceris in fictile perforati
 coniciuntur, oreque vasis diligenter obturato, supra
 carbones candentes continenter follibus persentur:
 ubi verò cinis in fauillas se conuertit, aut aëreum
 colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim ha-
 bet adstringentem, & refrigeratoriā, leuiter mol-
 lientem: caua explet, & sanguinolenta cōglutinat.
 Samia præfertur candida, leuis, tāgenti lingua glu-
 tinis modo adhærescens, mollis, succosa, friabilis: cu-
 iusmodi est quā aliqui collyrion vocant. Duæ enim
 species eius: vnā, antè diximus: altera aster appel-
 latur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac
 lauatur ut eretria, vimque consimilem habet: san-
 guinis reiectiones sistit, & feminis fluxione vul-
 uæ laborantibus, cum flore syluestris punice da-
 tur. Testium & mammarum inflammationes, il-
 lita ex rosaceo & aqua, refrigerat: sudores arcet:
 contra serpētium morsus & venena, pota ex aqua
 auxiliatur. Samius lapis, in Samia terra inueni-
 tur, quo aurifices viuuntur poliendo auro, ut re-
 splen-

LIBER QUINTVS. 485

splendeat. Probatur candore, & durtia. Vis ei
adstrictoria, & refrigerans: prodest stomachicis
potius: sensus hebetat: verum ad fluxiones oculorum
& vlcera, cum lacte efficax est: partus, vt tradunt,
adligatus accelerat, & conceptus foeminarum cu-
stodit. Chia eligi debet candida, vergens ad cinereum,
Samiae similis: est autem crustosa, albaq; sed ficti-
tius formis differens. Vis eadem qua & Samiae:
extendit faciem, & erugat, atque splendidam red-
dit: colorem in facie et corpore toto commendat: in
balneis pro nitro deterget. Eadem praestat Selinu-
sia: maximè laudatur, quae vehementer resplendet,
candida, friabilis, & humore dilui celerrima. Ci-
moliae duo genera, candida & ad purpureum in-
clinans. Optima existimatur, quae innatam ha-
bet pinguitudinem, tactuq; frigida sentitur. Vtra-
que aceto diluta, parotidas, & alia tubercula di-
scutit: ambusta igni, si statim cimolia oblinan-
tur, pustulas non sentient: testium duritias, &
totius corporis collectiones cohibet: igni sacro impo-
nitur. In summa, vtraq; multum in medicina com-
mendatur, si incorruptae originis, nec spuria assu-
matur. Quae puigitis dicitur, colore ferè eretriae si-
milis est, grandioribus tantum glebis: manum si
quis admoueat, refrigerabit: tactu linguae, vsque
adeo glutinosa, vt pensilis hareat. Cui effectus idē
qui cimoliae, paulo tamen infirmior. Hanc aliqui
pro eretriae vendunt. Fornaceae teste vehementer

Hh 2

tosta, crustas ulceribus obducunt: quare prurigi-
 ni & papularum eruptionibus medentur. Podagri-
 cis prosunt: strumas discutiunt, cerato exceptæ. For-
 nacum terra quæ retorrída fuluescit, eiusdem cum
 testa effectus. Melia colore cinerea eretria imita-
 tur, aspera tactu: ea digitis friata, derasi pumicis
 modo crepitat. Vim habet aluminosam, sed remis-
 siusculam, id quod gustu deprehenditur: nam modicè
 linguam siccatur: purum corpus reddit, & colore
 commendat: pilos extenuat: vitiligines, & lepras
 abstergit. Pictoribus usum præbet ut colores diu-
 tius perennent: emplastris viridibus, quæ chloræ di-
 cuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra
 & omni alia in vniuersum, eligi debet recēs, mol-
 lis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attri-
 gerit, facile resoluatur. Ex ampelide terra, quæ
 pharmacitis nomine, in Seleucia Syria nascitur,
 laudatur in primis nigra, picea longos carbonēs re-
 ferens, modicè assulosa, æquabili splendore, quæ de-
 trita, accepto oleo, statim eliquefcit. Vitiosa censetur
 candida, & cinerea, quæ in liquorem non resolu-
 tur. Vim dissipandi & refrigerandi habet: ad calli
 blephara additur, tingendis capillis idonea. Vfus
 eius ad illinendas vites sub germinationis tempus,
 utpote cum innascentes vermiculos enecet.

Fuligo pictoria. CAP. XCV.

Fuligo qua pictores vtuntur, ex vitrarijs offi-
 cinis colligi solet: siquidem ei palma tribui-
 tur.

ur. Vis ei adstringendum & erodendum efficax:
 acta cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

Atramentum librarium. CAP. XCVI.

Atramentum quo scribimus, fuligine è tedis
 coacta colligitur. In singulas libras gūmis,
 erna fuliginis vnciae adijciuntur. Fit etiam è re-
 inarum & pictoria fuligine, de qua paulò antè
 liximus. Assumitur autem fuliginis mina, gum-
 ni, sesquilibra, glutinis taurini, atramenti suto-
 y, singulorum sescuncia. Additur conuenienter
 rodentibus medicamentis: Ambustis, ex aquae
 ommodè crassius illinitur, sed non antè solua-
 tur, quam cicatricem induxerit: sanatis si-
 quidem vlceribus, sua sponte decidit.

Caterùm habes, amicissime

Aree, ferè quae tradenda

duximus pro ope-

ris modo, quē

destina-

ueramus & materiae auxi-

liorumq; medicina-

lium copia.

Q V I N T I L I B R I
 F I N I S.

Hb 3

P E D A N E I I
D I O S C O R I D I S
A N A Z A R B E I, D E
venenis, quoq; modo arce-
antur, vitenturq;
Liber VI.

SUPERIORIBVS amicis-
sime Aree libris tradidimus de ar-
matibus, oleis, vnguentis, arboribus,
& earundem fructibus, lacrymisq;
item animalibus, melle, lacte, seuo, frumentis, ole-
ribus, herbis, radicibus, liquamentis, vinis, metal-
lisq;. In hoc verò totius operis ultimo, facultates
medicamentorum recensēbimus, quæ prodesse nobis,
aut officere possunt. Vitata igitur orationis proli-
xitate, opus institutum prosequamur. Huiuscemo-
di autem tractatus, cum bisariam distributus sit.
in partem venena precauentem, ita vt ne fallam
sumentes, aut si quando per imprudentiam den-
tur, vt tum quoq; innoxia fiant, irritaq;. & in ra-
tionem ijs succurrendi, qui iam noxiam sentiunt:
primū disseram de precauēdi modo, quem esse dif-
ficillimum plerique maiorum arbitrantur, quoa-
dantes clām venena, ita insidias temperāt, vt pe-
ru

ritissimum quenq; decipiant. Siquidē venena sua amaritudine, permistis dulcibus, spoliant, & graue odoris virus mīstura odoramentorum eximūt: aut medicamenta immiscent, quæ tuendæ sanitatis gratia dari putantur: et præsertim in valetudine, vt absinthium, tragoriganū, satureiam, aut hyssopum, quinetiam thymū, irim, origanū, alrotonū, castorū, aut si quid medicamentis purgatorijs cognatam habere qualitatem videatur. Aut potionibus inserunt: vt vinis asperis, iuribus, passo, mulsæ aquæ, musto: succis, vt in cremore lentis, polentis: aut medicaminibus, aut alijs quæ assumitur, edulij speciē referētibus. Quare qui in ea suspitione sunt, conditos cibos vitare debent, omniq; intenso sapore dulcium, aut salforum, aut acidorum, abstinere: nec sitibundi affatim bibere, aut esurientes voraciter comesse, semperq; ad saporem horum diligenter attēdere, præsertimq; potu frigidā aquam præsumere. Satiato enim appetitu, qualitates egerri-
mē postea cōcoquuntur. In ægris quidem facile canemus potiones auxiliij prætextu dari solitas, quas offerunt improbi veneficiorum artifices: itaq; ob id laborantes morbo non perinde audentium iniurijs patent. Et hæc quidem ne facile incauti seductiq; homines capiantur dolis veneficorum, ratio est, & facultas. Sed alia superest expeditior, vt suspiciosi aliqua præsumant, quæ venenorum vires hebetent, & inefficaces irritasq; reddant: cuiusmodi

caricae sunt cum inglandiam nucibus manducata
& quæ cedromela vocant, id est citria, seminisq
napi drachma cum vino. Item folia calamintha
aut creta quæ Lemnia sphragis appellatur, pon
dere pari cum vino: aut rutæ folia & nucis inglai
dis nucleum: aut caricas duas, & salis callum ieiu
ni sumant, & nullo veneni genere lædentur. Anti
dota ex vino sumpta eundem effectum præbent: in
ter quæ intelligitur magnū Mithridatium, et quo
scinco, & quod sanguine temperatur. Quin & sæ
pe venenis obsistunt peculiares quidam corporis affe
ctus certo quodam modo constitutores cum qua
dam cibi potusq; qualitate, tum vini copia ita tem
peratorum, ut cum venenis dissentiant: siquidem
ingesti veneni vires frangunt, atq; iam priore ali
mento farctis præclusisq; meatibus, obstant ne mē
bratim per digestionem insinuetur. Verumenimue
ro, quoniam fortuna necessitas interdum similia di
scrimina peregrè agentibus affert, absq; ullis insi
dijs hominum, nonnihil differendum mihi de hac
re necessarium duco. Iam primū igitur culinam
apparare loco subdiali convenit, cibosq; & potus
in huiusmodi loco struere. Si id fieri cōmodē ne
quit: secunda erit conditio hæc, apparandi appo
nendique sub tecto. Sed tum diligenter laquearia
animadvertenda: frequenter enim à superioribus
contabulamentis animalia decidunt, exigua qui
dem, sed quæ non modicam perniciem moliantur,
ut

et phalangia, stelliones, et alia quædam reptilia. Por-
tò vinaria vasa diligenter intueri oportet: nanque
reptilia odore vini illiciuntur, quæ interdum sorbē-
lo, noxium virus eructarunt, interdū verò delapsa
immersaq; expirarunt, & exitij causas haurien-
tibus attulerūt. Sed hæc hætenus dicta sint, ne cau-
i & providi insidijs pateāt. Quòd si qui sua spon-
te, aut ex quorundam insidijs sumpserūt, auxiliari
rimo quoq; tempore oportebit: siquidem dum co-
mites singulorum venenorū notæ expectantur, im-
meduabile fit venenum, & paulisper neglectū, me-
dicamentis agrè cedit. Quare si qui pro comperto
virosum sumpsisse intelligant, & fateantur, aut eo-
rum qui aderant testimonio constet, protinus ad
donea remedia transeuntes, facile peculiari nati-
væq; constitutioni restituemus. Neque enim ijs as-
sentimur, qui prorsus auxilia in huiusmodi fru-
stra adhiberi contendunt. Quo enim modo morbi,
quorum causæ cæcæ latentesq; corporibus insident,
medicinam admittunt, & quæ forinsecus incurrūt
venena, medendi rationem aspernantur? Aequè
verò omnes morbi pro causarum ingruentium
magnitudine, proq; antecedentibus affectionibus
qualitatibusq;, quibus sit opportunum corpus,
vel medicaliles sunt, vel nullæ cedunt medicamen-
tis. Quòd si qui forsitan obmutescentes, aut temu-
enti, aut nolentes alioqui venenum à se egeri, nul-
lam nobis eius cognitionem prabeant, tum pro-

tinus accedendū ad ea quæ cōmuniter epotis quibus
 cunq; venenis opitulari consueuerunt. Atqui nullū
 magis in omnia valens auxiliū dari potest, quā
 vt proximo loco virus foras exhauriatur, priusquā
 inuale scat. Quare sine mora, calidum oleum ex a-
 qua, aut seorsum, vt vomitare cogantur, dare con-
 uenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrum cū
 aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago,
 vrtica, fœnograco, aut halicæ decocto, vicem eius
 exhibebit. Hæc enim nō modō vomitionibus exigēt
 vi illa sua laxatrice, aut nauseam ciente, sed aliū
 quoq; subducent, & corporum inanitione ita ad-
 uersabuntur, vt acrimonias venenorū hebetent. Id
 quod euidenter huiusmodi argumento deprehen-
 dere licet: Estō, vt quisquam viua calce vel fece, aut
 cantharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulce-
 rare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulce-
 rationē nō accipiet. Atqui neq; vehementer adstrin-
 gi corpus, neq; refrigerari poterit, si antea perun-
 gatur. Quinetiam vomitus non ob id modō quod
 vacuet, & noxium humorem excernat, iuuamen-
 tum adfert, sed quod assumptum virus nunquam
 odore, coagulatis grumis aut colore, prodat: quip-
 pe cum odore & amaritudine, meconium: colo-
 re, cerussam, gypsūve: grumis lac aut sangui-
 nem animalis recens iugulati ostendat. Nam
 grauis odor regestorum, leporis marini, aut ru-
 betæ veneficia deprehendit, ita vt nonnulla ab ijs
 rem

remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transcurrentibus. Oleo etiam maluae decoctum admiscetur, aut glaucium, aut adeps anserinus, aut pinguium carnum iura, aut lixiuium lignorum cinere factum. Vbi vero vomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in ventre coierit, quae haeserunt intestinis reliquiae, clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum cum hydromelite sumptum & vina vetera liberalius epota, gallinacea iura, praepingues pisces, vetustae carnes pinguesq; , & quae adipe aut recenti butyro parantur. Alium nanque subducunt, vti diximus: & stomachum resoluentia, prouocant ipsam ad vomitionem reddunt & venenorum acrimonias hebetant, atq; meatus obstruentia, celerem virium penetrationem inhihent. Quinetiam medicamenta dantur, quae communi dote prosunt: vt Lemnia terra, agaricum, abrotonum, irio, radix eryngii, semen pastinacae, & calamintha, nardum gallicum, castorium, ferulae virentis medulla, flos rhododendri, succus marrubij, laser aut laserpitium, sagapenum, pencedani succum, aut panacis, & radix quam magudarim appellarunt, aristolochia longa, sylvestris rutae semine, et betonica, quam cestron nominant folia singula cum vino draclmae pondus sumi debent. Effectum praebet poly decoctum, & seseli, & liquida pix lincta. Magnifice ferunt opem antidota, quae in salce operis scripta reliquimus. Communis ratio pra

præstandi auxiliū ita se habet. Ceterū ab ijs quæ consueuerunt euenire, communia remedia sumptuari possunt. Ferè enim vires venenorum quàm plurimorum, in affectus consimiles corpus tandē redigunt. Quam ob causam plerisque communia cōducunt auxilia: varia etenim sunt venenorū genera, cōmunes tamē nec multi iḃdem affectus oriuntur. Neq; fieri potest, vt omnes cōcurrentesq; casus, quæ symptomata vocant, vnum venenum sequantur. Alioquin superuacanea fuisset venenorum singulorum traditio cum suis remedijs ab authoribus descripta. Neque verò in vno eodemq; promptum est inuenire, vt quis stomachi, alui, intestinorum, iecoris, renum, & vesicæ dolore vehementer crucietur, vt singultiat, erodatur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fiat, veterno prematur, vertigo obuersetur, caligent sensus, stranguletur, sitiat, sanguis erumpat, febre conflictetur, agrè lotium reddat, torminibus vexetur, crebrò vomitet, nausea prematur, rube scat, liuore sugilletur, palle scat, desipiat, sterat, viribus deficiatur, & pleraq; alia faciat, patiaturq;: singula enim in generales affectus deducta, pauca numero, & cōmunia ea demonstrant, quæ euenire consueuerunt. Quare in singulis quæ suprā diximus, non facili fuerit deuoratum virus cognoscere. Nam oris & linguae erosio, stomachi, ventris, vesicæ ac renum inflammatio, vehemens vri-

na

na difficultas, & interdum cruoris cum eo exitus
lancinatio, & in plurimis partibus quidā adustio
vis sensus, non in cātharidibus modo potis reperiun-
tur, sed in crucis quoque pinorum, & luprestē, &
salamandra. Porro non modo eos qui meconiū hau-
serunt, veterno aut sopore premi, stertere, liuore
sugillari, torpere, refrigerari, stupefcere, toto cor-
pore pruritum sentire, sensu priuari constat, sed
eos etiam qui mandragoram aut cicutam deuo-
rarunt. Delirium non hyoscyamus tantum in-
fert, verum etiam quæ toxica appellantur: iti-
dem aconitum, & mel quod in Heraclea Pontica
gignitur. Strangulatio non minus in fungis,
quā in sanguine taurino, lacte, aconito, cerussa,
gypso conspicitur. In summa, difficile vnum vni
veneno propriū inuenire signum, quod haustum, gu-
statumq; virus prodere possit: maximè, quod hæc
ceterorum etiam vitiorum, quæ in corpore exo-
riuntur, communia sequi solent. Cæterū in his quæ
celeriter enecant, noxā signis forsitan indicare pos-
sit, si ad ea respexeris quæ sumus dicturi. Sed in ijs
qui ad longas egritudines spectant, nihil ad me-
dendi rationem difficile, duntaxat quod pertineat
ad indicia noxæ, utpote cū venena statim atq; præ-
sentaneam vim illam perdiderunt, transmutata in
longos affectus, communia reliquorum vitiorū re-
media, cōpositionesq; flagitent, cū venēfica pro-
prietas non amplius insit. Si verò longa sit affectio,

in

in aliquod diuturnorū morborum genus recidet, d
 quibus facile fuerit medendi rationem assumere.
 Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hæc tenus.
 Consequenter quæ priuatim singulis prosunt, scri-
 ptis mādabimus, si prius sigillatim expoſuerimus,
 quæ ex singulis ordinibus exitialem aut maleficā
 vim ſortiuntur, ut medicinae ſtudioſi ea cautè ob-
 ſeruent, quæ ad rationem ſalutis ſcripta inueniun-
 tur quòd nonnulla eorum quibus vtuntur: venenis
 ſint commiſta. Incuria enim magnas adfert no-
 xas, & ſepe continuo vſu eorum, homo in perniciē
 agitur. Proinde animalia quæ exitioſam vim ha-
 bent, hæc ſunt: cantharides, bupreſtis, ſalamandra,
 pinorum eruca, lepus marinus, rubeta, & rana pa-
 luſtris muta, deuorata hirudines. Semina ſunt: hyo-
 ſcyamus, coriandrum, cicuta, gith, pſyllion. Ligua-
 menta meconium, opocarpason, thapſia ſuccus, ela-
 terium, mandragoras. Radices, quas mittit cha-
 maleo, aconitum, thapſia, veratrum, ixia, agaricū
 nigrum, ephemerum, quod aliqui Colchicū vocant,
 quod in Cholchide naſcitur. Herbae olera q; ſmilax,
 quam aliqui tithymalum appellant, Romani ta-
 xum, ſolanū manicum, quod et dorycnium dicitur:
 ſardinia herba, quæ ranunculi genus eſt, cornicula-
 tum papauer, pharicum, toxicum, ruta ſylueſtris,
 fungi. Ab animalibus: taurinus ſanguis recens,
 coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitum.
 Metalla: gypſum, ceruſſa, calx, auri pigmentum,
 duo

duo sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum viuum dicitur. E liquoribus domesticis: vinum abunde post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

Cantharides.

CAP. I.

Quibus datae sunt cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad vesicam usque cuncta erodi sentiuntur, picem aut simile quiddam cedriæ resipiunt, dextra præcordia inflammantur: urinam ægrè reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmenta non secus atq; dysentericis, aluo deferuntur: fastidia urgent: animo linquntur, obortaq; vertigine concidunt: postremò mente abalienantur. Ergo antea quàm tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, vomere cogantur: mox ubi vomitione plurima reiecerunt, halicæ aut oryzæ, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctum maluæ, aut seminis lini, aut fenigræci, aut radicum althææ, quam Latinus sermo ibiscum appellat, elystere infundatur. Præterea nitrum eisdem dandum, ex hydromelite, vt quæ stomacho adhuc aut intestinis adherent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluum ex nitro aqua mulsa, vacuari debent. Datur deinde vinum aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo lique

quefactus. Inflammatae autem partes, hordei farina cum mulsa decocta perungantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsum virus ita remoratur, ut in principes se parteis insinuet: ipsa tamen, interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur, utpote quae dolores & permulceant & leniant. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in solium descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summam, quae corpori noxia inhaerunt, etiam excernantur. Et deiectiones multifariam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capeat. Gallinaceis carnibus & hœdinis, aut suillis catulis, maxime pinguibus & tenerrimis, ac cum lini semine coctis, vesci debent: siquidem aluum cient, atque venenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius elibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quae aster appellatur, si quaternae singulorum drachmae cum passo sumantur. Item pulegium ex aqua tritum, irinum aut rosaceum, cum rutæ decocto, recentes vitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissimè, antidota auxiliantur, cum aqua mulsa, drachmis quatuor pota.

Pinorum erucæ.

CAP. II.

Is qui erucas pinorum hauserunt, illico dolor in ore & palato exoritur: vehemens alui, linguae ac stomachi inflammatio torquet: intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire videatur:

itur corpus totum exæstuat: fastidium vrget. Quibus est succurrendum remedijs, quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamē pro simpli- ei oleo & irino, melinum, quod ē cotoneis pomis et oleo temperatur, accipiemus.

Buprestis. CAP. III.

Qui buprestin biberunt, non dissimile nitro virus sapiunt, stomachi ventrisq; vehemens dolor insequitur: tam venter quàm stomachus mirum in modum, vt in aqua inter cutem, diffusus, inturgescit. Vniuersa corporis facies cōtenditur: vrina supprimitur. Quibus eadem quæ potis cantharidibus auxiliatur. Priuatim post vomitus & evacuationes, quas clysteribus molimur, arida ficus profunt: item earum decoctum, ex vino. Vbi verò iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmarum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuantur. Pyrorum etiānum omne genus esse, & lac humanum bibere, conuenit.

Salamandra. CAP. II II.

SI Salamandram hauserunt, lingua inflammatio consequitur, mens & sermo prapeditur, tremor cum corpore aut horrore quodam ac exolutione accedit: partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaque sugillantur: sæpeq; diutius immorante veneno putrescentes, defluunt. Quibus præstabimus cuncta quæ potis cantharidibus. Peculiariora verò remedia, resina pinus, aut galbanum

ex melle linctum, & aingæ decoctum, in quo nuc-
clei pinei conterantur: vrticæ quoq; folia, cum lilijs
& oleo decocta. Prosunt etiam oua testudinis ma-
rina aut terrestris, cocta: item ranarum ius, cum
quibus eryngij radix incocta sit.

Ephemerum.

CAP. V.

Sumpto ephemero, quod aliqui Colchicon, aut
syluestrem bulbum appellant, pruritus in toto
corpore excitatur, non secus atq; ijs qui vrtica aut
scilla lateffuntur: interna rosionem sentiunt: stoma-
chus cum ingenti grauitate exæstuat. Cæterum in
ualefcente morbo, cruor strigmentis admixtus, per
aluum exigitur. Quibus, vt ijs qui salamandram
hauserunt, vomitione aut clysteribus auxiliari con-
ueniet: sed antea quàm venenū inualefcat, claudium
est decoctum frondium quercus, aut glandium, aut
malicorij: lac bibere prodest, in quo serpillum sit de-
coctum: item succum sanguinalis herbæ, aut ramo-
rum vitis, aut rubi, aut medullæ recentis ferulæ,
aut myrti cum vino. Bacca autem myrti tuse tri-
taq; , & aqua macerata, vt liquor inde sumatur,
opem ferunt. Media castanearum tunica, simi-
lem effectum præbet, si cruda in aliquo supradi-
ctorum succo sumptitur: origanum quoque cum
lixiuio epotum: eximie iuuantur asimini lactis
aut bubuli calidi potu, etiam si in ore contineant:
ita vt quibus copia lactis huius adsit, non aliud
desideretur.

Dor

Dorycnium.

CAP. VI.

DOrycnion, quod aliqui manicon solanum appellarunt, epotum, lactis saporem in gustu refert: continentes singultus ciet, humor linguam vexat, sanguis confertim reijcitur: mucosa quadam perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaque antequam aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt antedicta, vomitus, clyster, & quaecunq; potum venenum expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur, aqua mulsa, lac caprillum, aut asininum, dulce vinum, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdalæ amaræ, gallinacea pectora decocta. Quinetiam conchyliæ omnia, tam cruda quàm tostæ esse salutare est. Conueniunt & locustæ marinæ, & gam mari, & pota eorundem iuscula.

Aconitum.

CAP. VII.

AConitū statim in lingua inter libendum, cū adstrictione quadam dulcescit: & subinde, potissimū cum exurgere conatur, vertigines offundit: lacrymas ciet: grauitatē pectori, & præcordijs adfert, simulq; crebri spiritus deflatur. Quare venenum vomitione abigi, aut clystere per aluū egeri opus est. Vtimur inter propinandum, origano, ruta, mar rubio, vel absinthij decocto, cū vino absinthite, vel semperuino, vel abrotono, vel chamælæa, aut aiuga. Prodest etiamnum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castorio, pipere, & ruta, æquis ponderibus ex vino. Coagulum hœdi, leporis, aut

lunuli cū aceto, ferri quoq; stercus, item vinum, in quo aurū, ferrū, argēumve candens restinguatur, potum: lixiuaq; cum gallina & vino decocta, aut carnum bubularum prapinguum iura, cum vino sumpta. Fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire.

Mel Heracliæ. CAP. VIII.

ME/ in Heraclia Ponti, vbi aconitum gigni solet, inuenitur: quod qui edunt bibuntve, non secus affliantur, quā qui aconitum ebiberunt. Iis eadem quæ poto aconito conueniunt: adiuvantur in primis continuo vini mulsi potu, cui rutæ folia sint adiecta.

Coriandrum. CAP. IX.

Coriandrū ob odorem latere nō potest: epotum autem vocem exasperat, insaniā adfert, à temulentis non abhorrentē. Qui sumpserunt, pudenda dictu blaterant, totiusq; corporis odore, veneniū fatentur. Quibus post vomitionē irino oleo concitata, vti retulimus, merum & per sese, & ex absinthio potum auxiliatur. Item oleum, nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta in muria sorbeantur: & epota muria, & ius salsum ex gallina & anserē: passum quoq; cum lixiua sumptum.

Psyllium. CAP. X.

Psyllion epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & mxtore quodam affert, ita vt animum despondeant. Cui omnia quæ exhausto coriano auxiliantur.

Cicci

Cicuta pota vertiginem excitat: oculisq; caliginem offundit, ita vt minimū cernatur: singultus ciet, mētem turbat, extremi artus gelantur: deniq; conuulsi, suppresso arteriæ spiritu strangulātur. Quare inter iutia, vt in reliquis, cicutam vomitu excutiemus: postmodū deiectionē moliemur, vt quod ad intestina prolapsū sit, excernamus: tūdemum in meracā potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus: repetendum per interualla, in quibus proderit lac asininum, aut bubulum potui dāum, aut absinthium cum pipere & vino, castorio, ruta, mentha cum vino, aut amomi, cardamomi, aut styracis vncia, aut piperis cum semine vrticæ & vino, aut lauri folia. Item laser, ex oleo & passō, & passum per se largius potum proficit.

Smilax, à quibusdam tithymalum, à Latinis Staxus appellatur: frigus vniuerso corpori strangulatus, & celerem interitum infert. Cui eadem quæ cicutæ conueniunt.

Epotus carpasi succus soporem, citamq; strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

Sardonía ranunculi herbæ generi assignatur, quæ rescentibus mentem adimit, & quadam

neruorum distentione labia in risum contrahit, ut risus speciem præbeant: à qua quidem affectione, de Sardonio risu adagium in vulgus infauſto omine manauit. Post vomitum peculiariter conuenit aqua mulſa & lac, liberalius epota: irrigatio, perunctioq; à pinguibus medicamentis, totum corpus excalfacientibus: in calidam aquam oleumque descendant, ſed tum multum perfricare & inungere expedit: & in ſumma, curam omnem, quæ conuulſioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Hyoscyamus. CAP. XV.

Hyoſcyamū potum aut comeſum, ſimile ebrijs ab alienatione mouet: ſed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulſa copioſe data, lacque, præſertim aſininum, ſi id deſideratur, caprillum, vel bubulum, vel aridarum ficuum decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis ſemē ex paſſo ſumptum, & vinum falſum cum adipe ſuilla recenti, paſſoq; itidem vrticæ ſemen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & ſinapis, & naſturtium, radix, cepa, & allium: & hæc ſingula cum vino ſumantur. Poſtea ſinendi quieſcere, quemadmodum qui vinum biberunt, ut excoquant.

Mandragora. CAP. XVI.

Mandragora ſi bibatur, conſeſtim ſopor inſequitur: exolutio, ac vehemens veterius, nihil temere diſtans à lethargo. Cui, antequam aliquid ex ijs accidat, vomitus & aqua mulſa proderit:

vit: postea nitrum & absinthium, ex vino dulci aut passo sumatur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio, & motus corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorii, & rutæ, tritorum in aceto: & liquidæ picis, & odor è liacernarum exustione & extinctu. Quod si agrè iu reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs uti conueniet.

Meconium. CAP. XVII.

EPoto papaueris succo, quem meconion vocant, cõsequitur veternus cum perfrictione & pruritu vehemente, ita ut sæpe inualecente veneno, tanta erumpat prurigo, ut hominem excitet. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo vomitione, acres clysteres auxiliantur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut mel cum rosacco calido: merum cū absinthio aut cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetū: nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua aut passo, & rutæ syluestris semen cum pipere, vino, & panace: piperq; cum castorio & aceto mulso, vel cum satureiæ aut origani decocto, cū vino. Hi olfactilibus excitandi, & ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foueantur. Post lauacrum prodest iurium pinguium vsus, cum vino aut passo: medulla etiam ex oleo pota.

Corniculatum papauer. CAP. XVIII.

Quod corniculatū papauer appellant, & potu & cibo eadem inferre cõsuevit, quæ pa-

pauers succus nec alijs expugnatur auxilijs.

Pharicum. CAP. XIX.

Quod pharicon vocant, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutione neruorum potius affert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post vacuationes vinum absinthiten potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod sermen aliqui vocauerunt: aut spica nardi duas drachmas, & myrrha totidem obolos, cum passo: aut irim cum croco ex vino: dera sumq; caput illini re hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

Toxicum. CAP. XX.

Toxicum ex eo nominari videtur, quod barbarorum sagittae eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & linguae inflammatione torquentur: incoercitus furor varias ijs imagines obuersat: quare vix medicinae locus est raroq; qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut vinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur: rapi semen bibendum cum vino. Priuatim ijs conuenit, quinq; folij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus: roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus: malaq; cotonea trita esse, aut cum pulegio & aqua bibere, conueniet, amomum & balsami semen ex vino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt, & ubi surrexere, stupidi reliquum vitae tempus degunt.

Ixia. CAP. XXI.

Ixia,

IXia, quæ vlophonon appellatur, inter potandum aliquid ocymo simile gustu & odore redolet: vehementem linguæ inflammationem excitat: mentem mouet: omnes excrementorum exitus supprimit: strepitum cum animi deliquio ciet, ijsq; intestina latrant,, nec egeritur quicquam. Post vomitionem aluumq; resolutam, auxilium præstat aqua, in qua absinthium maduerit, ex vino largiore, aut aceto mulso pota, rutaq; syluestris semen, aut laseris radix: item tragorigani decoctum, cum aliqua supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpitio, quorum singuli oboli conueniunt. Quin & nuces iuglandes ex vino, cum resina, castorio, & ruta trita, ita vt singula drachmæ pondus æquent. Itidem chamelææ aut thapsiæ aut absinthij succi silicus cū aqua mulsa, & acetum calidum potum.

Cerussa.

CAP. XXII.

Cerussa suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingiuæ, lingua, & commissuræ dentium, candore quodam inficiuntur: singultus, rufsim, ac linguæ ariditatem excitat: ijs extrema frigescent, mens labat, membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficuum aut malua decoctum, aut lac calidum, aut sesamam ex vino tritam, vel lixiuiam ex sarmentis factam, amaricinum oleum aut irinum, persicorum ossa cum hordei decocto: columbina oua cum thure, aut

hordei decocto, aut prunis, aut gummi quod vlmus
plorauit, aut humor quem vlmæ folia reddiderunt,
cum tepida aqua: sed tum quoq; vomant. Conuenit
etiam thapsiæ succus, aut scammonia, cum aqua
mulsa potus.

Fungi.

CAP. XXIII.

Fungorum alij genere, alij copia lædunt: omnes
tamen strangulatus suspendio similes conci-
tant. Quibus confestim succurrèdum: communiter
ex oleo vomere cogendi: mirificè iuuat lixiuia ex
sarmentis aut pyrastrî surculis, epota cum sale, po-
sca & nitro. Fructus, aut folia pyrastrî cum fun-
gis decocta, strangulantem illam vim auferunt,
esitataq; eisdem auxiliantur. Aduersus fungos gal-
linacea oua cum posca proficiunt, adiecta aristolo-
chiæ drachma: item absinthium cum vino melleq;
sumptum, & ex aqua potum: apiastrum ex ni-
tro, panacis radix & semen in vino, fex vini cre-
mata cum aqua, atramentum sutorium ex aceto:
radix, vel sinapis, aut nasturtium esu profunt.

Gypsum.

CAP. XXIII.

Lapidescens gypsum strangulationem creat:
quare eadem proferenda sunt, quæ mansis
fungis, auxilia, & ad hæc maluæ decoctum, quod
etiam olei vicem pensat: utpote cum pingue sit, euo-
mendo lubricas vias & faciles reddit, detradiq;
corpora non sinit. Quod ubi duratur in lapidem,
gypsum efficit. Quinetiam prodest oleum ex aqua:
mul

mulsa, aut ficorum decocto: & lixiuia è ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum vino copiosiore pota: & organum aut thymū cum lixiuia, aut aceto, aut passo: hīq; decocto malua proluendi.

Sanguis taurinus. CAP. XXV.

TAuri recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem strangulatumq; cōcitāt: faucium tonsillarumq; meatus cum neruorum distentione præcludit: lingua rubescit: dentes inficiuntur, & quedam concreti sanguinis vestigia, inter eorum commissuras restant. Quare vomitum vitabimus: sanguinis enim globi attractu illo in sublimē relati, magis gulæ inculcantur. Dari ergo opus est quæ concretū sanguinem discutiūt, & aliū subducunt. Grossi lacteo succo turgentes ex posca, & nitrum per sese auxiliantur: nec secus coagulum omne cū aceto & laserpitij radice, aut lasere itidem & brassicæ semen, & è cinere ficulneo lixiuia: conyzæ folia cum pipere, & rubi succus ex aceto. Alius resoluenda. Iis qui seruātur, stercorosa & fluida per sedē egeri cōsueuerunt. Stomachū aliūq; hordeacea farina ex aqua mulsa perungere oportet.

Lac coagulatum. CAP. XXVI.

EOs qui coagulatum lac hauserunt, frequens illico strangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus iuuandis pro antidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere sæpius cogimus. Damus & calaminthæ folia arida.

da, item succum : aut laserpitij radicem, aut laser-
cum posca : thymnumq; ex vino, & cum luto suo
luxuriam. Sed nulla falsilago obijciatur, quoniam
magis lac coiret, & in casum densaretur. Neque
illos vomere conuenit : siquidem concretum lac sese
in gula angustias insinuans, strangulat.

Argentī spuma. CAP. XXVII.

Spuma argenti pota, stomacho, ventri, & inte-
stineis grauitatē cum magnis torminibus ad-
fert, & nonnunquam pondere suo intestina vulne-
rat, vrinamq; supprimit: corpus intumet, plum-
beamq; deformitatem concipit. Quibus subuenit
secundum vomitionem, potum syluestris homini
semen, myrrha drachma octo, absinthium, hyssop-
pum, apij semen, aut piper, aut ligustri flos ex vi-
no: aridum palumbis finium, cum nardo & vino.

Argentum viuum. CAP. XXVIII.

Argentum viuum potum eadem quæ spuma
argenti infert, eisdemq; vtendum auxilijs.
Lac copiose potum auxiliari constat sed postea euo-
mant, qui hauserunt.

Calx, Sandaracha, Auripigmentum.

CAP. XXIX.

Calx, Sandaracha, & Auripigmentum, po-
ta aluum & intestina cum vehementi ero-
sione excruciant. Præbenda cuncta quæ suo admi-
stu illorum acrimoniam hebetāt, ac soluant, & fa-
cilem lubricamq; aluum reddunt, cuiusmodi ibisci
&

& maluæ succus est: natura enim vtrique perlubrica. Dandum decoctum seminis lini, vel seminis tragi herba, vel oryza, lacq; cum aqua mulsa copiosum, iura pingua, & boni succi.

Lepus marinus. CAP. XXX.

Qui leporem marinum hiberunt, piscium virus olent: procedente tempore, alius dolore afficitur & vrina sistitur: & si quando eam reddere contingat, purpureum colorem referet. Omne piscis genus auersantur, & odio habent: factido ac graui sudore manât: biliosus vomitus, interdum sanguini promiscuus, subsequitur. His dādum lac asininum, vel passum continuè, aut radicis maluæ foliorumq; decoctum, aut trita cyclamini radix cum vino, aut veratri nigri, aut scammoni succi drachma, cum aqua mulsa, puniciq; mali acinis. Cedria cum vino efficax est: anserinus sanguis, ut tepebit, potus. Sed cum pisces omnes respiciant, aspernenturq;, solis fluuiatilibus cancris vesci possunt, bibuntq; eos admisto vino, adiutiq; ab his percoquunt. Cumq; appetere & comesse pisces cœperint, suæ salutis indicium habent.

Rubeta & palustris rana.

CAP. XXXI.

Rubeta aut rana palustris assumpta tumores ciet, pallor corpus vehementer decolorat, ut planè buxeum spectetur, spirandi difficultas torquet, & grauis halitus oris, singultusq; & inuita
inter

interdum genitura profusio consequitur. Adiuuatur secundum vomitionem multo meri potu, & arundinis radicis binis drachmis, aut cyperi totidem. Breuiter, cogendi sunt ut vehementi ambulationi & cursui se credant, ob torporem quo corripuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

Hirudo. CAP. XXXII.

DEuorata cum aqua hirudines, si ori ventriculi adherent, tractione partium, nonnullam suctionis imaginem præbent: eo enim argumento hausta hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, & cyrenaicus succus, aut laserpitii folia, aut betæ, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum posca. Nitrū ex aqua gargarizatur, aut atramentū sutorium aceto dilutum. Si faucibus hæreant, iniecta lupinorū farina, aqua frigida ore contineatur, & ad eā hirudines exilient. Prouidendum etiā ijs, quæ etsi ferendi auxiliij gratia tradantur, non minora tamen cæteris venenis pericula sæpius adferunt. Qualia sunt album veratrum, thapsia, elaterium, agaricum: nigrum: siquidem ea strangulatus concitant, aut immodicas deiectiones mouēt. Quibus ea medetur quæ in fungorū mentione & similibus retulimus. Nimios autē deiectionū impetus, medicamentis quæ excrementa supprimunt coercemus. Neque negligenda quæ parū quidem nocere videtur: interim verò vitā in discrimina agūt. Quo in numero sunt syluestris ruta, gith, nouæ glacies,

pap

pappi recētes: flores autē sunt eius spinæ quæ cactos dicitur. Eos qui sumpserint, sola vomitio recreat.

Domestica nobis. CAP. XXXIII.

Aqua frigida abundē pota, aut meracum vinū liberalius epotū, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut vehementi exercitatione, strangulatus & dolores infert. In quibus sanguinis missio protinus, & vacuatio, imminetia soluunt pericula. Sed de notis veneficiorū, ac remedijs, & cauendi modo, hæc tenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria quæ præclare auxiliantur, quibus utimur, quale Mitridatium est præsertim, & quod sanguine, & quod scinco temperatur. Verū quoniam alijs in locis diligentissimè scripta sunt, hic ab eorum descriptione supersedemus.

Venenata. CAP. XXXIIII.

DE bestijs quæ virus eiaculantur, & exitiabilibus venenis, ideò scribere aggredimur, ut tota curationis remediorumq; ratio ad umbilicum perducatur: siquidem pars hæc nō minus quàm cætera aliæ, necessaria est ijs qui artem medicā exercent, utpote cum adminiculo eorum quæ inibi traduntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimisq; alijs malis homines liberari conueniat. Hæc autem in summa fastidia duo, sicuti ab initio relatū est, distribuitur. Nam qui de feris virus inspuentibus sermo differit, Theriacus dicitur solet: qui verò de amolendis veneficijs, Alexipharmacus: quo

quo prius tradito, simul quæ sequi signa consueverunt, præmonstrabimus: tū quæ nonnihil auxiliū ferunt. Omnia autē in præmptu, & ad manū habere artificē oportet, propter urgentē sæpenumero necessitatē: siquidem pauca ē venenis & virulentis animantibus, tarda & grassantia sensim pericula ciēt, ita ut dilationē admittant. pleraq; verò præsentaneā perniciē afferunt. Hominū autem partim malē alijs cogitantes, ingenta prauitate maleficiū ita temperant, ut spatiū curanti liberum nō relinquunt: partim scel. ris admissi cōscientia, aut trīsti aliquo euentu oppressi, haūsto sponte veneno, mortem sibi consciscere cōnātur. Qui postea deprehensi, aut recipientes, & vitæ cupidi, præsentaneā opem poscunt. Non desunt qui hostiles sagittas illinentes, aut fontes aquasq; puteanas hac labe polluentes, certam & inenitabilem aduersariū perniciē moluntur. In quibus ipsis eisi maleficiū non subito, sed aliquanto post grassari natura sua comparatum est, tamen nisi primo quoq; tempore coërceatur, & remedijs subinde excipiatur, frustra tandem succurritur, occupatis iam corporibus exitiali vi veneni. Proinde nō vulgari industria diligentiaq; in ea re utendum est, ut quod in alijs incommodis ars cōsuevit, in his quoq; salutem mortalibus præbeat. Quin & apud priscos genus hoc vnum existimabatur esse eius partis, quæ medicamentis pugnat: sed recentiores id ipsum discreuerunt, nominantes præc

et cautionem, & modum precauentem, salubris
sanantiq; medium statuentes, parua & leui supra
nodum persuasione decepti. Siquidem treis in hu-
manis corporibus constitutiones esse contendunt:
nam, qua sani degimus: alteram, qua sinistra va-
etudine corpora laborant: tertium, qua medium
inter vtraq; locum sibi vendicat. In qua positi, sa-
nitatem specie mentiuntur, facileq; in morbos &
pericula concidunt, ob vim corruptricem qua cor-
poribus nostris incumbit: quemadmodum in ijs vi-
dere licet, quos ex cande scens rabie canis momorde-
rit, necdum tamē aquā horrēt. In ijs quoq; qui can-
tharidas hanserunt, sed nondum vrinae tormento
truciantur. Tripartitō igitur artem digeri, tripli-
tiq; corporis constitutioni meritō respondere tra-
dunt. Salubrem partem esse volunt, qua sanitatem
tuetur: precauentem, eandemq; prohibentem, qua
obstat quo minus in morbos incidant: & sanantē,
qua vitia discutuntur. Quibus ita responderi po-
test, quod primum ex ista ratiocinatione non treis
corporis tantū, sed quatuor haberi constitutio-
nes fatendum esset: quippe vt aliqui sunt, qui nec-
dū morbo laborant, morbo tamen maximē ob im-
pendentem, causam sunt obnoxij: ita sunt, qui iam
priori morbo defuncti, nondum tamen secundae va-
letudini restituti sunt: id quod in ijs qui à mor-
bo proximē sese recolligunt, cernere licet, qui vi-
rium recreationē & robur desiderant. Sed quem-

admodum curandi ratio ad partem medicamentariam pertinet, ita præcautionē eidem subijci par est. Ad arcendas enim valetudines vehementibus vitimur auxilijs, altiore scarificatu, vñtionibus, amputatione, derodētibus epithematis, potionibus pernicipi occurrentibus, & plerisq; alijs. Verum enim vero sunt vsq; eò rudes nonnulli, vt ne remedia quidem appellent, quæ morbos arceāt. Cuius sententia inire rationem haud promptum est: etenim cū verbum ipsum, præcauere, tum agendi modus, omnino auxiliare remediariamq; vim præ se ferunt. Mirum verò nisi etiam sua illa distributione partium eos complectuntur qui in pestilentis cœli statu morbo nondum correpti sunt: pesti tamen, propter obuersantis aëris occasionem, opportuni, & in morbum proui redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quam arcendorum morborum rationem: quippe cum firma reddere corpora, & minus vitijs obnoxia nitamur, vt inoffensa valetudine degant, nec morbis confluentur. Neque id silentio prætereandū, quod maximè præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutionibus respondere: sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari ac explorare, vt suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare conuenit, affectus qui à virul

virulentis animalibus venenisq; cōtrahuntur, voca-
 ri cecos, id est, quorum ratio minimè iniri potest.
 Quin & ea quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter
 sunt addicta causæ: quapropter quæstionibus ob-
 seruatoriæ artis, & eius quæ ratione fulciatur, an-
 numerari solent. Neque prorsus verum deprehendi-
 tur, affectus huiusmodi cecos esse. Nam quod sem-
 per se protrahit, & nullum in quibusdam necessa-
 rijs vsum exhibet, laud facili coniectura colligi po-
 test: etsi naturæ proprietate prorsus cecos eos af-
 fectus concedimus, qui ab exitiis venenis, &
 animantibus quæ virulento morfu sæuiunt, cōtra-
 huntur. Nam quod ad opus nonnullum vsum præ-
 bet, datq; medendi occasionem, neque imperceptibi-
 le, neque cæcum, nulli re causæ obnoxium reputa-
 tur: sed magis ab ipso quis impulsus, demonstra-
 tionem se habere, & opinionem de abditorum co-
 gnitione cōfirmare poterit. Nam etsi sæpe minora
 sunt, quàm ut sensibus percipiãtur, euidenter tamẽ
 ex ipsis inter se collatis deprehenduntur. Diocles au-
 tem in eo cōmentario quem Plustarcho dicauit, satis
 modos perstrinxit, ad verbum ita scribens: Nossẽ
 quis hoc potest cum in alijs non paucis, tum in vi-
 peris, & scorpionibus, & reliquis id genus, secum
 animo reputans, ut quamuis exiguo sint corpo-
 re, vixq; conspectui subiciantur, magnorum tamẽ
 discriminum ac dolorum causas inferunt: quo-
 rum nihil præter quandam corporis exiguitatem,

vimq; præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim ea moles corporis est, quæ à scorpj ictu, & aliorum id genus venenatorum, quæ nos morſu conficiunt, attingitur? quorum aliqua vehemētes cruciatus excitant, alia erodunt, & putredines cient, nec deſunt quæ præſentaneam pernitiē moliantur. Aut quantulū est quod à phalangij morſu ingeritur, & vniuerſum corpus excruciat? neq; enim quis magnitudinē ipſorum deprehendere poſſet, cum prorsus exigua mole conſtēs. Ergo quod hæc ad affectus referantur, cōſtitit inter omnes. Verūm quod exactē deprehensum ſit, vim quandam ipſi ineſſe mortiferam, quæ inſinuata corporibus moleſtiarum, quæ exoriuntur nobis cauſa ſit, in conſeſſo eſt, & omnium conſenſu perſuaſum. Nec quiſquam inuenietur vſque adeo contentioniſ ſtudio flagrās, qui aliunde exoriri moleſtias aſſeueret, quàm à materia mortifera partem corporis attingente. Porro id erat quod inter vtilia artis opera in omni opere dicere oportuit, quanam res opus hoc efficiat, vt nihil prorsus nos laadat, incomprehenſa communis cauſæ quæ proprijs ineſt ratio: quandoquidem tum euidenter indicari poſſit cū deprehēſa eſt. Ideo Eraſiſ tratus empiricorū pertinaciam graui cauillatione inceſſens, cecis affectibus cauſas aſſignauit, inſiciatus hiſ cōmunem, & ſupremam morborum cauſam incomprehenſibilem eſſe: & hanc in eo quem de cauſis ſcrip

scripsit commentario aptissime prodidit, candido signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut in venenis, serpentium ictibus, & ceteris id genus trita medendi ratione contentos esse. Neque satisfacturam sibi observationem eam, quæ à causarum comprehensione separata est. Primum enim genere comprehendere facile possunt. Quod autem si letifera vis, corporaque permittans, ita ut perimat, ex iis quæ per genus, et non per speciem vagantur, curationem indicat, quæ hæc hebetare, & prorsus expugnare liceat. Cum verò subiungit: Ad aquam dulcem, & potui idoneam venit quis, & ante observationem ad vomitum, ad vulneris dilatationem, ad demorsæ partis suclum, cucurbitulas adfixit, partem incidit, vrentia medicamenta, aut ea quæ vim eandem adipiscuntur admoovit, postremo partem amputavit: secum reputavit medicamina, quæ per summam cutim ferre, & applicari solita, immissæ ad intima perniciem repugnant. Hæc itaque quæ disseruit Erasistratus, veritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam vim corporibus illapsam negotiorum, quæ ipsa facessit, esse causam diffiteantur, verum rudiusculè nomini attendunt. Nam apud ipsos palam immissa vis φθγορωδός, id est mortifera, nominatur: φθγορωδός autem nullius officij alius esse potest, quam causa. Aiunt hæc nomina, μαρτίσιππος, & ἀνα-

Kk ;

καλύπτει, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro virtute, sed nuda enuntiatione comprehenduntur. Enimvero quæ admodum in his vocibus μάστιγος & ἀνὰ καλύπτει, partes neque certos neque principes retinent significatus: sic in hoc verbo φθοροποιᾶ partes productionis gratia, non pro virtute coaluerunt. Hinc ad causarum differentias transeunt, affirmantque causarum aliquas evidentes esse, quæ dum aduersam valetudinem creant, separantur: cuiusmodi sunt frigus, labor, æstus, & similia. Quasdam continentes, quæ permanent postquam morbum excitarunt, hoc est, quibus præsentibus, & effectus eorum adsunt, incrementibus, effectus augentur: decrementibus, minuantur: & cum desinunt, ydem finiuntur: quibus solis ac per se manentibus, effectus quoque ipsi manent. Talia quidem receptissima sunt causarum discrimina, quorum nulli phthoropæon subijci potest. Evidens enim causa non est, quoniam morbus ipse permanet, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hic adsit: quemadmodum accidit ijs qui à rabioso cane sunt demorsi. Quod si neque evidens causa neque continens fuerit, neque per se, neque alterius consortio causa erit. Quod si à nulla causarum differentia phthoropæon deducere possumus, consequitur, ut neque causam esse fateamur. Quod

autem asserunt, vocabula quædam in se non habere
 parteis rerum significatrices, sed nuda, & simplici
 pronuntiatione ficta esse, fateri necesse est. Verum
 non omnia, sed per pauca talem nancisci conditio-
 nem existimandum est: neq; enim $\pi\omicron\iota\epsilon\pi$ in hoc no-
 mine $\phi\theta\omicron\pi\omicron\iota\epsilon\pi$ perinde atq; assumptitia pro-
 fertur, sed longè principem obtinet significationem.
 Quemadmodum enim $\phi\theta\omicron\pi$, id est corruptio-
 nis, nomen mutationem in peius significat, sic hoc
 verbum $\pi\omicron\iota\epsilon\pi$ sumi debet, vt nihil amplius ex eo
 quod hanc dictionem $\phi\theta\omicron\pi$ secum habeat, decla-
 ret: neq; prorsus id significat, quod omnes palàm
 audiunt, & huic simile redditur, $\pi\alpha\iota\delta\iota\ \epsilon\chi\epsilon\pi$
 $\delta\iota\ \phi$. Si dant à corruptione sanis fieri morbi,
 concedunt utiq; vim in huiusmodi verbo $\pi\omicron\iota\epsilon\pi$
 subesse, siquidem aliquid est quod corruptionem effi-
 ciat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur
 per singulas causas quæ corporibus subiiciuntur, idq;
 tam in letalibus venenis, quàm in iis quæ corpori-
 bus ingeruntur. Verum nonnihil subiacere causa-
 rum differentijs produnt. Quinetiam aberrarunt,
 non exactam diuisionem assumentes. Qui verò se
 dogmaticos profitentur, causam esse partim præpa-
 rantem, partim continentem asserunt: vt inguinum
 vlcus, & inguinariâ febrim, et quæ affectui tum
 assistat, tum etiam separetur, vt à fractis præci-
 pitatio. In summa, quoties quidpiam suapte natu-
 ra causa fuerit, nec vlla diuisione cõprehenditur,

vitiosum est, neq; causæ adscribitur, eorū quæ idē genus sortiuntur. Sed quod phthoropœon causa sit, nomen ipsum argumento est, & in iis quæ contingunt apertius ostenditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse post impressum à serpentibus ictum, quàm ex animante vim, & illapsum in corpora virus? Neque enim frigus, neq; æstus, neq; sectionem corporis, neq; cruditatem, neq; aliud quicquam simile causari possunt. Verum quoniam causarum differentiis gaudet, & aliquas continentes, alias euidentes appellant, ipsis dicendum, utroque istorum modorum euidentem quidem causam esse, quod affectum præcedit, & quod corporis substantiam præoccupat: continentem verò, quod morbis presentibus adest, quæ separata recedunt, quæ cum ipsa euenerant. Sed de ijs hæcenus. Statuendū itaq; mortiferam vim intrinsecus manifestissimam esse causam, ipsamq; principem facere scopum oportet. Et antequam ad ima decumbant morbi, varijs modis est certandū, donec vis tota corporibus excutiat. Modò enim renocari debet ea parte, quæ pestis intrauerit: modò aliqua alia, præsertim principatum non obtinente, antè coërceatur, quàm altius irrepens viscera tangat: aut eius pernicies eluatur, retundaturq; cum iam membratim peruagatura est. Itaque venena si hausta sunt, crebris vomitionibus: si morfu impressa, scarificatione, affixis cucurbitulis, exuctu carnis circumscriptione,

ne, nonnunquam amputatione extremæ parti, euo-
cantur. Retinentur verò infusione, & imposito me-
dicamentorū acrium cohibentur. Hæc simul utiq;
arcere virus, & eluere possunt. Restinguuntur, &
euicuntur meraciore potu, aut passo nulla aqua di-
luto, vel contrariorum esu, quæ acrimonia sint præ-
dita. Postremò deiectio alui, euocatus sudor, et alia
quædam in commune, quæ membratim demon-
strabimus, auxiliantur. Verumenimvero non le-
tiferam modò materiam, sed & magnitudinem,
& tempus, pro scopo considerare oportet. Etenim
ab ijs remedia quàm plurimum discrimen cape-
sunt. A magnitudine quidem, cum nonnulla ex
venenis, & virosis animalibus pericula minan-
tur: alia putredines altas aut exteriores excitant:
alia vehementissimos dolores aut cecos cient: alia
vix medicamenti cedunt, & magis minús ve mo-
lestias excitant. Oportet autem ea, quæ peritula fe-
runt, peruicacioribus auxilijs expugnari: & minus
infesta, mitioribus. Quippe absurdum fuerit in
gravioribus, segnioribus medicamenti homines in
discrimē adducere: in minoribus verò, vehemētium
auxiliorū iniuria corpus lacescere. Finito à tempō-
ribus in promptu est: hoc enim subito in pericula, et
præsentēs molestias adducit, illud verò sensim, et di-
latas in diem longam aut breuiorē producit. Itaq;
in acutis quidem confestim multa simul auxilia re-
presentari oportet: reliquis, paulatim. Hæc quæ-

dam artis formula breuiter definita sint. Iam me-
bratim rem prosequamur.

Signa rabiosi canis, & demorforū
ab eo. CAP. XXXV.

DE rabiosi canis morsu sermonem alijs prapo-
sumus, quod id animal domesticum ac fre-
quens esse consuevit, & in rabiem sepius agitur,
ac perit, ab eoq; cauere difficile: inde periculū in-
euitabile hominem manet, nisi multis utatur au-
xilijs. Canis plerunq; flagrantissimis aestibus in
rabiem efferatur: interdū quoties frigora incesse-
runt. Rabiosus autem potum, & escam auersatur:
largam spumantemq; pituitam naribus, & ore
proicit: toruē & solito tristius intuetur: in omnes
passim sine latratu irruit, & aequē feras homi-
nesq; tā familiares, quā ignotos mordet: nec pro-
tinus infestū quicquā infligit, nisi ut vulnus, dolo-
rem: exinde morbus ille, qui ab aquae metu hydro-
phobicus Graia est voce appellatus, contrahitur.
Euenit autem cum distentione nervorum, totiusq;
corporis rubore, praesertim faciei, cum sudore, &
languore quodam. Aliqui aurae splendore fugiunt:
alijs sine vlla doloris intercapedine vexantur. Sunt
etiā qui canū more latratus edant, & obuiā fa-
ctos morsu adoriuntur, ac mordendo similivicio la-
befactant. Proinde ex ijs qui hoc vitium senserint,
neminem seruatum vidimus, nisi forsitan ex hi-
storia vnum aut alterum euasisse audiamus: siqui-
dem

dem Eudemus superasse quendam affirmat. Themisonem aliqui demorsum in hunc furorē incidisse, et euasisse fatentur. Alij ipsum cum amico aquam expauescenti morem gereret, & officium exhibere, quadā naturarum cōcordia similem cōtraxisse affectum: sed post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Molestissimum itaq; genus morbi, à quo multos, antequā ipsam experiretur, vindicauimus: & complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

Remedia demorsorum à cane rabioso.

CAP. XXXVI.

Ratio medendi duplex: vna communis, qua vtendum in omnes morsus, quos virulente animantes impresserunt: alia peculiaris priuataq; eorum duntaxat quos rabiosi canes momorderint: quæ nonnullis quidem summam opem ferre cōsueuit: alijs verò inutilis, maximè qui ex multo iam tempore ictum acceperunt. Quæ ad hanc pertinent, primū exponemus, deinde cursim perstringemus, quæ ad communem medendi rationem pertinent. Cancros itaque fluuiatiles in sarmentis albæ vitis cremare oportet, & cinerem eorū quā minutissimè tritum habere reconditum, itidem gentianæ radicem tusam cribratamq; reponere. Quoties autem canis rabiosus morsum intulerit, in quatuor cyathos meraci vini, bina cineris cancro- rum coquearia, vnumq; gentianæ coniiciantur: hæc in polente dilutioris modum subacta, quatri-
duo

duo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo detur. Atqui si ab illato morsu bini ternive dies fluxerint, curationē auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium quod & plerisq; vnum satisfecit, eoq; cum fiducia vti licet. Sed vt alijs etiamnum auxilijs contra in-
evitabile periculum muniamur, nihil ceteris vti prohibet. Satius autem multo fuerit etiamsi in vanum recidat, medicamentorū inhumanos tolerare cruciatu, quàm per inertiam ac desidiā in discrimen adduci. Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora vulnera vereri oportet, vt iuin ora, & vicusculis cutis similia: quippe maiori vulnere cōfertim copiosus sanguis emanans, potest nōnihil virulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit: quin à maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpelli circumscribere, et prehensam hamulo aut vulsella carnem amputare oportet. In vtrisq; circumstantia loca altioribus vlcusculis scarificanda, vt copiosior sanguinis vacuatio arceat, ne venenum membratim insinuetur. Cucurbitula cū multa flamma agglutinata vel iuuamenti pręstat, vt veneni vis extrahatur. Contra virulentos ictus, vstio expeditissimum est auxilium, vtpote cū ignis cetera viribus pręstet, simul quod virus domet, & ferri penitus non patiat, simul quod pars ignem experta, postea non vulgare fundamentum

mentum curationi futurae praebeat, manente diutius exulceratione. Animaduertendum ex eo tempore cum crustae decident, ne ulceris ora coalescant, & cicatrice induantur, sed si fieri potest ad multum, adque praestitutum tempus, ulcerationes & sordidas adhuc & inflammationem minantes, prorogari convenit. Quod inditum ijs salsamentum optimè praestabit, & sylvestre allium detritum: item cepae, succusque, praesertim Cyrenaicus, aut qui Medicus, aut Parithicus appellatur. Tritici grana tam mansa quam non mansa imponantur: siquidem subacta pistare à perfusione vulnera dilatant. Sunt qui à mandentium ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat: verum id certum non est. Ceterum tempestivus eorum usus minimè est contemnendus. Si verò, quod persaepe accidit, ante dies praefinitos cicatrices coeant, committerenturque, manum postulabunt: nanque eas diducere, carnemque scalpello circinare, aut iterum inurere, expedit. Vbi verò propositum tempus praeterit, locus ad cicatricem ducendum, & emplastro, quod è salibus conficitur, locus comprehendendus: nec multo post sinapismo utendum.

Ratio victus in morfu rabiosi canis.

CAP. XXXVII.

Quae ad partem istam pertinent praesidia, ita se habent. Ceterum victus rationem ex ijs quae veneno aduersantur, coniecturae

Etura quadam colligere oportet, simul ut veneni
 vires hebetet restinguatq; simul ut arceat, quomi-
 nus ad intima pernicies illabatur. Etenim assum-
 pta perniciosarum virium penetrationi resistunt.
 Quorū utrūq; præstare potest vini meracioris, pas-
 si, & lactis potus: quippe qui hæc omnia capiunt
 ad curam, nonnihil veneno obijciunt, quod omnem
 eius acrimoniam obtundat. Simili modo alliorum,
 porrorum, ceparumq; cibis: quod ea difficulter con-
 ficiantur, vixq; aboleantur. Nam multos dies hu-
 ius cibi qualitates remanēt, quo tēpore nec euincun-
 tur, nec permutātur à mortifera vi, sed contrarijs
 illa vis expugnat. Cui rei antidotorū vsus accom-
 modatur, & theriaces, Mithridatij, & etus quod
 eupatorio temperatur. Deniq; omnium quæ magnā
 aromatiū partē sibi vendicant: quippe aromata o-
 mnia viribus & substantijs agrè permutantur:
 quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc mo-
 do se habet: Nosse conuenit, pauorem aquæ non sta-
 to definitoq; tempore exoriri plurimum tamen ad
 quadragessimū vsq; diem neglectis differri consue-
 uit. Post semestrem etiā nonnullos inuadit: quendam
 post annū aquam horruisse constat. Quæ nobis vi-
 su cōperta fuere. Narrāt et aliquos post septenniū
 aquæ metu fuisse tentatos. Inter principia dēmer-
 sorum à cane rabiosa curandi ratio talis est. Ve-
 rumenimvero si ea quæ retulimus auxilia, primis
 diebus prætermissa fuerint, nec scalpro carnem

cir

circinare, nec vñtionem experiri operapretium est.
Non enim quod iam pertransit, satis euocare pos-
sent. Nulla vtique istius rei occasio aut vtilitas, sed
in cassum corpora doloribus sternentur. Alter verò
curationis modus accedat. Deiectio magnum pra-
bet iuuamentum, vt pote cum mouēdo, corporis ha-
bitum transmutet: & quæ colocynthidem recipit
hiera. Item lac schistum, quod simul deiectionem
moueat, & venenum domare possit. Cibi acres, &
meraculi potus, quibus vis veneni vehementer re-
tunditur, quotidie sumi debent. Cæterum sudores
ante cibos, & post etiam ciendi. Dropacismi si-
napismiq; alternatim per corpus totum adycien-
di. Sed longè omnium efficacissimum auxilium
helleborismus cognoscitur, quo cum fiducia non se-
mel atque iterum, sed frequentius ante quadrage-
simum diem, vel post hoc tempus vti licet. Tan-
tam enim vehementiam hoc auxilium habere fer-
tur, vt quidam qui iam aquæ metum sentirent,
sumpto helleboro, simul ac primum morbi impe-
tum experirētur, fuerint seruati. Nam et iam vitio
tentato nemo vnquam seruare potest. Itaq; primū
curā contra rabiosi canis morsus breui sermone ex-
posuimus: iam ad alia, quæ venenatis morsibus sa-
uire cōsueuerūt, transcendū. Notas vno cōtextu, de-
inde communē medendi modum, qui omnibus con-
uenire possit, explicabimus. Cursim deinceps sub-
iungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxi-
lium

lium præstare possunt. Postremò subnectentur etiam venenata, quæ nulli cedunt remedijs.

Notæ eorum, qui à venenatis demorfi sunt. CAP. XXXVIII.

DEmorsis à phalangys locus quidē ipse, quasi ab impacto aculeo rubet, non intumescens, nec per ambitum calidus est, sed mediocriter humescit: vbi verò contrariorum occursum refrigit, consequitur corpore toto tremor, distentiones poplitum & inguinum, conuulsionibus non dissimiles. In lumbis collectio exoritur, & perpetua vrinae libido lacescit, multaq; reddendis excrementis colluctatio. Vniuersa cute frigidus sudor emanat, collacrymant oculi, offusisq; nebulis caligant. Si scolopendra aut dicta ophioclene, morsum intulit, locus per ambitum liuore sugillatur, & computrescit: interdumq; licet rarò, sæculentus atque ruber cernitur. A morsu ipso exulcerari locus incipit, vlcusq; id negotium exhibet, ferè remedijs inuictum: præterea toto corpore prurigo sentitur. Scorpionis morsu inflammari statim incipit locus, & indurascit, ac intentus rubet, vicissimq; dolore premittitur. Modò siquidem exæstuat, modò frigore occupatur. Labor repentè fatigat, & aliquando meliuscule habet, aliquando vero recrudescit. Cōsequitur sudor, horrore sensus, & tremor. Extremæ corporis partes refrigescunt, inguina extolluntur, per sedem flatus exeunt, capilli eriguntur, pallor membra

bra decolorat & dolor, tanquam ex pungente acu, per vniuersam cutem sentitur. Si marina pastina ca percussit, protinus accidunt molesti dolores, as- sidua conuulsiones, lassitudo, & imbecillitas. Mens percussis labat, postea obmutescunt: oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum vicinis par- vibus denigratur, & ita obstupefcit, vt tangentem non sentiat. Hunc si quis premat, atra sanies, cras- sa & male olens excernitur. A mure araneo per- cussis, circa morsum in orbem inflammatio exori- tur, nigraq; pustula, diluta sanie turgens, exurgit: proximæ partes liuent. Rupta pustula, depascens vl- cus, non ei dissimile quod serpit, occupat. Intesti- norum quoq; tormina, difficultas vrinae, & frigi- da asperginis offusio consequuntur. Si vipera mo- mordit, corpus intumet, vehementer arefcit, subal- bidumq; colorem concipit. Sanies à vulnere profun- ditur, primum suppinguis, mox cruenta: pustulae adustis similes erumpunt: & antea depascens vl- cus, quod in proxima repens, non summa modo corporis, sed intima quoque corripit: gingivæ ijs cruore suffunduntur: inflammatio circa iecur erum- pit: tormina & biliosi vomitus sequuntur. Sopor, tremor, & vrinae difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur. Consimilia eueniunt ijs qui à cæcilia nomine, aut amphibæna demorsi sunt, ea- demq; ferè auxiliantur: quare hoc venenum prima- tam descriptionem sortitum non est, neq; visum est

dignum quod alio genere comprehendatur. Adryli-
 no morsis pustula molestiq; dolores inuadunt, pra-
 sertim qua diluta sanies emissarium subest: quin-
 etiam erosio, torminaq; consequuntur. Ab haemor-
 rhois ictis vehementes cruciatus accidunt, qui an-
 gustia contractaq; corpora ex continuo dolore red-
 dunt. Ex plaga copiosus cruor effluit, & quacunq;
 parte corporis cicatrix ulla fuerit, ea sanguine ma-
 nat. Excrementa per anum cruenta exiuntur,
 profluensq; sanguis in globos coit. A pulmone san-
 guinem extussunt, & in vomitiones effusi sine re-
 medio commoriuntur. Quos dipsas percussit, so-
 lutus ac non constrictus tumor premit, sitisq; usq;
 eo pertinax, ut satiari non possit, ac sine ulla inter-
 capedine excruciet, etsi potum pleno ore assatim
 trahant, illico in eandem sitim relabuntur: proinde
 toto habitu similes sunt ijs qui antea potus nihil
 hauserint. Quare propter continuam sitim, & pre-
 ster, & causon, aut dipsas appellatur. Ab natri-
 ce demorsis vlcus dilatatatur, & liuidum ac ingens
 auadit. Sanies ex eo multa, & atra, & male oles,
 non secus atq; ijs quae serpunt vlcibus, expuitur.
 Cenchri morsum, qui viperino ictui similis est, pu-
 tridum vlcus sequitur. Carnes antea, ut in aqua
 inter cutem, praetumida, desolunt. Lethargo corri-
 piuntur, & veterno pressi somnos captant. Eras-
 stratus eos iocinere, intestino ieiuno, coloq; confli-
 Etari auctor est. Quippe dissectis ipsis, omnes fere
 pars

partes corruptæ reperiuntur. A crasse percussis
 locus attollitur, cum duritia pustulosus. E plaga sa-
 nies profluit, modo atra, modo pallidior: sed toto
 concretu varicosus intumescit: genitale intenditur:
 mens labat, & oculorum caligo exoritur: denique
 rigore neruorum distenti commoriuntur. Ab aspi-
 de ictis vulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta
 acu citra tumorem conspicitur: sanguis exiguus ille
 quidem, sed ater distillat: caligo velox oculos obnu-
 bit: labor in totum corpus multiplex, omnino leuis,
 & non sine voluptate consequitur. Ideo Nicander
 perpulchrè cecinit: At vir perit absq; labore, virens
 atq; discolor: mediocris stomachi dolor afficit: frons
 perpetuò reuellit: genæ contremiscunt, quasi sine
 sensu in somno vacillent. Hos mors tollit, ad' diei
 trientem non dilata. Erasistratus in libro quem
 de medicaminibus & venenis condidit, de vocato
 basilisco scitè ita refert, Cùm basiliscus momorde-
 rit, vulnus ad auri colorem efflauescit. Itaq; in plu-
 rimis quæ virus eiaculatur, comites notæ ita se ha-
 bent. Transientes utiq; ad medendi rationem, pri-
 mum, vt fieri poterit, de communibus differemus.

Communis curatio in omnes ictus
 virulentos.

CAP XXXIX.

ADuersus quidem omnem animalis ictum,
 quod venenum vibrat, oris suctio conuenit.
 Sugentem verò oportet ieiunum nō esse, sed & ci-

bum sumpſiſſe, & vino os abluſſe: poſtea exigu-
uum olei in ore continens plagam exugat. Locu-
ipſe ſpongia fouendus, deinde ſcarificandus: ſed vl-
cuſcula altius imprimere expedit, quo viroſa ma-
teries, profundo euocetur. Circinatio autem carnis
& ſectio, ſcarificatione longè potentius opitulā-
tur: nanq; ab iſ duo peculiaria præſidia ſunt. V-
num, quod virus è loco tollitur. Alterum, quod
eius veneni pars, quæ ad interiora graſſatur, cum
multo copioſoq; ſanguine excernitur. Quod ſi lo-
cus ſectionem non admittat, cucurbitæ cum largio-
ri flamma adſigendæ ſunt. Sed iam de vſtione ſu-
prà in rabioſorum morſu diſſeruimus. Si verò iſtæ
pars, vtpote extrema, eam ſectionem commodè non
reſpuat, præſertim in omnibus ſerpentium iſtibus,
vt aſpidis, ceraſtæ, ſimiliumq; proculdubio am-
panda eſt. Cōuenientiora ſuprà dictis auxilia ſunt
quæ epithemata vocant. Imponatur ſarmentitiu-
cinis, aut ſiculæ, cū lixiuo ſtillatio ſubactus, ga-
ro, & acri ſaſamento: porri, cepæ, & allia modo
minutiſſimè cōtrita illinuntur, modo cremata vulne-
ribus inſciuntur. Quinetiam diſſecti gallinarum
pulli, cum maximè tepent, percuiſſo loco applicentur.
Nec deſunt qui hiſce tanquā diſcordia quadam na-
turali pugnatibus vtantur: verū huius rationem
inire faciliſſimū fuerit. Gallinæ enim calida natura
prædite ſunt, argumento, quod deuoratum inſigne
virus conſciunt, & aridiſſima quæq; ſemina con-
ſumunt.

mant: item nonnunquam arenas lapillosq; inglu-
 e sua deuoratos, dissoluunt. Itaq; animantis ad-
 poti calore adutus spiritus, ab icta parte impetū
 pessus exiliensq; secum venenum exigit. Nec me-
 git quid in Aegypto fieri soleat. Cum spicas Aegy-
 ti metunt, ollam picis paratam habent, & appen-
 im fasciam: tūc enim maximè serpētium iniurias
 epauescunt, tum propter spicilegiū tempus, tum
 uod opacis simul abditæ speluncis & cauernis, de-
 oq; aruorum cespite delitefcūt. Molesissima enim
 imalia & virus eructantia, Aegyptus in cam-
 is ferre consuevit. Vbi ergo aut in pedem, aut par-
 em aliam, morsum intulerunt, qui adsunt, fasciam
 n ollam picis coniiciunt, & semel aut iterum bra-
 hium aut crus paulum supra vulnus obligant, &
 arctissimè duo è presentibus dstringunt, locumq;
 secantes qua circumactus est laqueus, picem instil-
 lant. Cumq; satis vulnus excepsisse videtur, laqueū
 resolvunt, & cepis alijsq; supra memoratis illi-
 nunt. Præterea pix liquida cum sale trito & fer-
 uente illita, præsentaneo est auxilio, si iugiter inno-
 uetur. Conuenit & cedria, & finum caprarum
 ex vino decoctum. Locum aceto calido, calamintha
 in lotio maris aqua, aut acida muria decocta, fo-
 ueri salutare est. Quinetiam non desunt emplastra
 vehementissima, & calidissima, qua venenum eli-
 cere, expugnare, & discutere possunt. Cuiusmodi
 sunt quæ ex sale, aut nitro, sinapi, & cachrye com-

ponuntur: de quibus consequenter erit tractandum.
 Erasistratus autem non iniusta reprehensione eos
 incesit, qui incognitas ad hunc usum facultates
 conscripserunt, ut elephanti fel crocodilive sangui-
 nem ouaq; testudinis, & consimilia. Nam cum iu-
 uantia quædam literis tradidisse videntur, planè
 in hac sola incidentibus imposuerunt. Quare talia
 deuotanda sunt, cum difficile, nisi regia facultate,
 peruestigari possint: neq; quò nostra fides ijs obstrin-
 gatur, frequenti obseruatione, sufficiens experimen-
 tum præstiterint. Quæ autem ad communem o-
 mnium usum pertinent, quæq; facile suppeditari, et
 omnibus à serpente percussis auxilium ferre queunt,
 subiungenda videntur. Intulus itaq; & erica, &
 astragalus, cum aceto pota, contra omnes serpen-
 tium morsus auxiliantur. Item bitumen, & viren-
 tes platani pilule in vino diluto coctæ, & paliuri
 decoctum: radix aristolochiæ, & eryngij: decoctæ
 etiam lauri bacca & deuorata, piperq; largius esi-
 tatum, ruta, anethum, & cyclaminus: coma porro-
 rum priuatim ex pane, aut allium, aut cepæ, sal-
 samenta q; quàm acerrima: origani decoctum cum
 vino potum, feniculi, pulegij, calaminthæ, porro-
 rumq; succus cum melle desorptus. Hæc quidem à
 plantis conquiruntur. Ab animantibus verò quæ-
 dam utiliter peti solent, gallinaceorum cerebella in
 cibo, leporinum coagulum cum vino, itidem casto-
 rij sextans: testes marinæ testudinis sumpti mul-

sum

um prodesse traduntur: mustella sale inueterata
 inter auxiliaria medicamenta est. Commendatur
 in primis exenterata, quæ sale siccescens inuetera-
 tur, ex qua binas drachmas cum vino bibisse satis
 est. Sed de simplicibus, quæ dari solent hætenus. Per
 ussus à serpente prodest alui deiection, diffluens su-
 lor, vrina copiosè reddita. Sunt et composita quæ-
 lam potiones, quæ mira remedia polliceri tradun-
 tur, vt & opij & myrrhæ singuli oboli, piperis si-
 ilicum: ea melle excipiuntur, & instar Aegyptiæ
 tabæ dantur cum vino. Itidem syluestris rutæ se-
 minis, gith, cumini Aethiopici, aristolochiæ, galba-
 ni, singulorum pares portiones trita, & cum eru-
 cæ succo subacta, digeruntur in pastillos, qui drach-
 ma pondus æquent: dantur ex ijs terni cyathi cum
 vino. Hæc habui de communibus auxilijs quæ dice-
 rem. De peculiaribus remedijs contra bestias quæ
 venena vibrant, consequenter est dicendum.

Peculiaria remedia virulen-
 torum ictuum.

C A P. X L.

INter ferientium venenatorum notas nihil de ve-
 spis & apibus articulatim digestimus, quod
 conspicuæ omnibus forent, & nihil excellens
 aut notatu dignum in his obseruaretur: inter re-
 media tamen, earum meminisse non fuit alienum.
 Igitur aduersus vtrarumque ictus prodest illita
 malua, & hordeacea farina cum aceto, ficul-

neum lac in vulnus instillatum, à muria, aut maris aqua fottus. Phalangiorum ictibus ficulneum cinerē, adiecto sale trito & vino, imponere oportet, aut radicē sylvestris punice quā tenuissimē tritam, aut aristolochiā cum hordei farina & aceto subactam. Ulcera aqua maris proluenda, aut apiastri decocto, foliaq; eiusdem illinēda. Lauacris perpetim vtendum, & propinandum abrotoni semen, anisum, aristolochiam, cicer sylvestre, cuminum Aethiopicum, cedrides tritas, platani corticem, & trifoliae herbae semen: priuatim autem, singulorum ex ijs binas drachmas dare cum vini hemina conuenit. Item myrica fructus, & camæpityos, & viri diū cupressi pilularū decoctum, admisto vino. Sunt qui fluminalis cācri expressi succū, cum lacte, assumpto apij semine, confestim molestijs liberare prodant. Si scolopendra morsum infixit, sal quā lenissimē tritus ex aceto vulnere inspargendus, aut ruta sylvestris superponenda. Locus acida muria fouendus, & danda in potu aristolochia cum vino, aut ferpillum, aut calamintha, aut ruta sylvestris. Percussis à scorpione, praesenti est auxilio ficulneum lac in vulnus instillatum. Scorpium ipse qui ictum vibrauit, tritus, & percussio loco impositus, suae plagae remedium est, ob cecam quandam naturarum (vt constat) discordiam, quae antipathia appellatur. Praeterea tritus & impositus cum sale, huius semine, & aithaea, scorpium conuenit. Sulphur igne

ignem non expertum, resina terebinthina exceptū,
& emplāstri modo adiectum auxiliatur. Itidem
galbanum ad spleniū formam ductum, & calamin-
tha, quæ trita illinatur, & farina hordei in vino
parata, in decocto rutæ. Semē trifoliæ herbæ tritū,
& vulnere iniectū opitulatur. Hæc ad affectum lo-
cum pertinent. Post hæc quam efficacissimis potio-
nibus vtendū, cuiusmodi sunt aristolochiæ, præser-
tim corticis binæ drachmæ cū vino, tusa gentiana,
& pulegium decoctū, & bacca lauri paucō nume-
ro trita, & calamintha cum posca, in qua magno-
pere discoqui debet: cupressus cum vino & rutæ,
nec secus ficulneum lac, la serpitiū, si adfuit: sin de-
sideretur, peucedani succo vtendum. Efficax est po-
tus trifoliy, & ocymi semen. Horum autem omniū
vicem pensat iugis lauacri vsus, euocatus sudor, &
diluta vini potiones. Et qui marina pastinaca icti-
tur, omnia quæ de viperarum morso paulō post re-
feremus, simili modo conueniunt. Peculiariter au-
tem ictus à marino scorpione, & dracone inferun-
tur, qui molestos cruciatus ciunt: interdum autem,
sed rarō, nomas excitant. Quibus absinthij, saluiæ,
aut sulphuris ex aceto triti potio subuenit. Pastina-
ca diuulsa & vulnere imposita, sui ictus medela
est. Si mus araneus momorderit, auxiliatur ex gal-
bano spleniū per se vulnere exterius impositum, vt
medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea fa-
rina cum aceto mulso illita. Quinetiam mus ipse

qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus
sui beneficia luit: resistunt quoque acini dulcis puni-
ci decocti, & illiti. Item porri, & allia contrita,
necnon aqua calida fatus: sed hæc ad locum perti-
nent. Prodest potum abrotoni decoctum, maxime
si in vino detur. Præterea serpillum, et galbanum,
et erucavino madefacta, recētes cupressi pilulae cū
aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethri
cū vino, & chamelaonis herbae radix. Nec desunt
qui literarum monumentis tradiderunt, tritū mu-
rem araneum cōtra suos ictus commodē bibi. Quā
hīstoriam apud alios inuentam, dignam duntaxat
censuimus, quæ annotaretur. Alij asseuerant demor-
sum non aliās exulcerari, nisi prægnans mus ara-
neus fuerit: tum sanē auxiliari ferunt. Si vipera
morsum impressit, simum caprinum cum vino,
studiosè impositum opitulatur. Item laurus, &
abrotonum, & galbanum splenij loco superiectū,
& origanum viride inditum. Pulli gallinarum
eliscerpti, & confestim admoti: erui farina vino
subacta: radicis cortex vsque eò tusus, vt in pulue-
rem solutus abeat, & scilla tostā: detritum chama-
melum hordeaceæ farinae cataplasma in aceto mul-
so preparatum: sed locus antè eo calido foueatur.
Hæc loco imponuntur. Contra viperinos ictus ru-
bus cum vino prodest. Aliqui anchusam tenui fo-
lio constantem auxiliari produnt. Leporini coagu-
li in vino terni oboli bibuntur, & porracei succē
hem

hemina in mero, & foliorum apiastri succus, &
syluestris ruta: hæc in vino potari debent. Vinum
frequenter bibendum, allia mādenda, & cepæ, &
porri recentes, salsamenta acerrima, & opipara.
Simplicia hæc sunt. Percussis à vipera præclare au-
xiliatur medicamentū, quod myrrhæ, piperis, casto-
rij, floris portulacæ seminisq; , dimidio acetabulo
constat: hæc omnia in Cretico passō teruntur, aut
in alio probato. Erasistratus in eo libro qui περὶ
διωκτικῶν, id est de viribus, inscribitur, pleraque
alia tradidit, quæ ictis ab vipera auxilium ferre
possunt: inter quæ talia maximè laudantur. Galli-
nacea cerebella cum vino pota, semen sativæ brassi-
cæ tritum, & acetabuli mensura cum vino potum.
Quinetiam bonū est digitum in liquidam picē in-
tingere, deinde vinum, quo digitus fuerit elutus, bi-
bere. Hæc sunt quæ contra viperæ ictus auxilian-
tur. De amphibana mentionem hoc loco fecimus,
quoniam ferè remedijs ad viperas scriptis, percussī
ab ea adiuuari soleant. Adryino ictis conuenit ari-
stolochia cū vino pota, trifoliū herba, radix hastu-
læ regiæ similiter assumpta, & fructus ex omni
quercus genere, & tusa ilicis radices, & illita par-
ti ictæ auxiliantur. Hemorrhoi dipsadisq; morsus
velut immedicabiles à plerisq; maiorum deplorati
relinquebantur: quare si peculiaribus contra dip-
sadem remedijs egeamus, communia experiri operæ
pretium erit. Protinus autem scarificatione uti,

vsition

ustionem facere, & si locus patiatur, extremorum amputatione opus erit: consequenter quàm acerrima cataplasmata admouere, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit, acres cibos, maximè à salsamentis, utiles esse. Meracæ potiones & lauacra prosunt, quæ subinde interiecto breui spatio assumenda sunt, priusquam morbi genus emerferit, quo semel erumpente, opem ferre nō potest vlla medici opera. In ictu hæmorrhoi eadem prosunt. Insuper quæ in commune opitulatur, ut scarificationes, ustiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc indipsade definiuimus. Quinetiam decocta vitis folia, & cum melle trita. Si morsum natrix adegit, prodest origanum tritum & aqua subactum, lixiua cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut querna radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua & melle colliquata. Bibuntur etiam hinc aristolochiæ drachmæ in potione poscæ cyathis duobus, deinceps marrubij succus, vel decoctum alterius cum vino. Fauus recens datur in aceto. Morsus à cenchridio auxiliatur lactucæ fructus cum lini semine illitus, & satireia trita, & syluestris ruta, & serpillū cum duabus hastulæ regiæ drachmis, & tribus vini cyathis, aut aristolochiæ radix. Itē cardamomum & gētiana. Si ceras tes percusserit, cita partis amputatio suffragatur: quare sine mora ictam partem amputare, aut scalpro confestim circuncidere, & ijs similia prosequi oportet. Vren-

na

LIBER SEXTVS. 543

ita in super reliquijs admouenda: siquidem virus
hoc veneno basilisci simile est. Iis qui ab aspidē fe-
riuntur, quæ de cerasæ scripta sunt auxilia dari de-
bent. Nam venenum hoc, quemadmodum basilisci,
aut sanguis bubulus, celeberrimè in arterijs sangui-

nem cogit. Ad basilisci morsum, vt Erasmi tra-

us author est, auxiliatur castorij

drachma in vino pota: item

papaueris succus,

Ictuum re-

media

ita se habent.

SEXTI ET VLTIMI
LIBRI FINIS.

NOTHA ET DIO- CSORIDI FALSO

adscripta, quæ ut facile, si quis ita uelit,
suis singula locis applicentur, numeris
notantur: quorum primus Dioscoridis
paginam, secundus uersum signat.

6.12. Iris ab aliquibus Illyrica, ab alijs thelpi-
de, ab alijs vrania, à nonnullis catharon aut thau-
mastos, à Romanis marica radix, à quibusdā gla-
diola, ab alijs opertritos, ab alijs consecratrix, ab
Aegyptijs nar appellatur.

8.2. Aliqui choron aphrodisias, Romani vene-
reā, aut radicē nauticā, Galli piper apium vocant.

9.6. Romani iunci radicem aut iuncum.

13.23. Magi sanguinem Martis, Latini perpen-
sam, alijs bacchar, Osthanes thesam, Aegyptij ce-
rea, alijs nardū rusticū, Galli bacchar, Hetrusci suc-
cinū: odorata herba est, qua in coronamētis vtunt.

15.8. Quibus odor inest cinnamomo proximus:
asperum siccumq; solum amat. Eius radix, ruptis,
conuulsis, in tussi vetere, & spirandi difficultate,
& si vrina agrè redditur, opifera est: menses ciet:
contra serpentium ictus, eam in vino bibere saluta-
re est. Folia, vt quæ adstringant, illita capitis dolo-
ribus, oculorum inflammationibus, incipientibus
egilopijs, mammis tumentibus à partu ignibus sa-
cris.

NOTHA.

eris auxiliantur. Odor somnum gignit. Crateus herbarius de eo ita scriptum reliquit. Asarum.

24.17. Alij spagnon, alij phasganon, Syri diaxylon vocant.

27.5. Ab aliquibus caſtor, ab alijs cynomorphos, à magis Herculis sanguis appellatur.

28.23. Symphyton aliqui vocant, alijs persicā, alijs medicā, alijs oreſtū, alijs neclariō, alijs cleoniā, alijs ideābaton, aut phlomis idæum, Latini terminalium, aut enulam Campanam, Aegyptij lenen.

68.29. Iuniperum parvam Græci arceuthicla, aliqui mnesitheum, alijs acatalidem, Aphri xnorinsipet, Aegyptij libyum, Galli iupicellum, Romani iuniperum vocant.

69.15. Iuniperus magna. Cap. Iuniperus magna, quam aliqui syluestrem cupressum appellant, alijs mnesitheū, alijs acateram, Romani iuniperum, vulgò cognita est, cupressus asinus: asperis maritimisq; locis plerunq; nascitur, easdem quas suprà. Et vires habens.

59.17. Brathy, alijs baryton, alijs baron, Romanis herba Sabina appellatur.

76.7. Rhamnum alijs persephonion vocant, alijs leucacantham, Romani spinam albam, aut ceruleam spinam, Aphri atadim.

67.21. Halimum alijs damasonium vocant, alijs erymon, alijs britanicā, alijs rhabdion, alijs basilion, magi Mercurij basim, aut Oseridis diadema. alijs elys

DIOSCORIDIS

elystephanon, aut sacrū caulē, Pythagoras anthe-
noros, Aegyptij asontiri, alij asphen, alij ascaluri,
alij asariphen. Latini albucium aut ampeluciam.

85.6. Agnon aliqui agynon, alij lygon vocant,
alij amictomienon, alij tridactylon, magi semnō,
alij hēm-aideos. Aegyptij sum, Romani salicem ma-
rinam, alij piper agreste, alij lecristicum.

122.20. Eorū vter sale conditus, & in umbra
siccatus, tōtra eximias vacuationes medicamentorū,
trium drachmarum pondere, presenti est auxilio:
quandoquidē protinus deiectiones cohibet. Teri au-
tem debet in farinam, & aqua subactus dari.

158.18. Telin, alij carpon, alij buceron, alij ego-
ceron, alij ceratidem, Latini fenumgracum appel-
lant, Aegyptij itasin.

159.5. Aliqui linocalamin vocant, alij annon,
alij linō agrion, Romani linum, Pœni Zēraphoēs.

164.15. Thermon, Romani lupinum, Aegyptij
brechon vocant.

165.10. Gongylen satiuam, alij gongylida, alij
golgosium, Romani rapum vocant.

166.10. Alū polyides eryngiū, Aphri thorphat.

167.5. Sylvestris raphanus, quam Romani ar-
moraciam vocant, alij montanum raphanum,
alij apium, alij iscada, alij chamēbalanum. Roma-
ni etiam radicem sylvestrem: ramulos tenues, iun-
ceos, duos siue tres spargit, rubentes: folijs rutæ syl-
vestris, oblongioribus, & angustioribus: semine
par

paruo: radice albuci, rotundiore, turbinatiore, pyrâ
figura, cādido cortice. Ea lacteo succo madet. Pars
radicis superior vomitiōe bilē pituitamq; extrahit,
inferior per alui, tota susq; deq; purgatiōes mouet.
Quod si tibi in animo est succū extrahere, radix tu-
sa in fictili mergitur, & qui supernatat succus pin-
na eximit. Is sesquiobolo potus, vtraq; pie purgat.

168.12. Romani napium dicunt.

168.14. Aegyptij echlotoripam appellant, alij
riplam, Romani blitum, Daci bles.

168.21. Pythagoras anthema vocauit, Zoroa-
stres diadema, Aegyptij chocortem, magi lienem
caprae, aut muris vrinam.

169.12. Atraphaxin, Romani atriplicem, Ae-
gyptij ochi vocant.

169.19. Cramben Romani brassicam vocant.

170.22. Romani rusticam appellant.

172.13. Portulaca syluestris. Cap. Syluestris
portulaca, quam aliqui aizoos syluestre vocant,
alij telephon, Romani illecebram, aliqui portula-
cam. Aphri mæmoen, Daci lax, Aegyptij mochmu-
zim, folijs pusillis, ad satiuam accedentibus, hirsu-
tis, latioribus: nascitur in petrosis, nonnunquam in
hortis, folia oleæ habet, minora multo, plura & te-
nera, rubentes cauliculos, ex vna radice multos, in
terra sessiles, qui māducati bonum succum pariūt,
viscosi, et aliquātū, salsi. Visi excalfactoria, acris,
exulcerans: discutit strumas, cū axungia illita.

M m

DIOSCORIDIS

173.3. Aliqui petræon, alij myacantham, alij myon vocant,

173.27. Arnoglosson, alij arnion vocant, alij probatiō, alij cynoglosson, alij heptapleurō, alij polyneurō, Magi eurechnemona, Aegyptij asonth, Romani plantaginem, Hispani thesaricam. Pœni alijrecon.

175.10. Syrius plantaginis, & calaminthæ, cum melle produnt ijs mederi, quos vires desecerunt, datum die secunda, & quarta, & parasceue, id est, Veneris die. Hoc autem velut arcanum accipito, quod veraci experientia compertum est.

175.12. Aliqui aquatilem anagallida, alij dare-nion, alij lauer, alij schinon aromaticum vocant.

175.21. Alij Veneris coronam, Romani veneræ, aut eusteralem.

176.24. Aliquibus ammonos, alijs astrion, Pœnis atirsite, Romanis catiatrix, alijs stilago, alijs sanguinaria dicitur.

177.2. Sonchon asperū alij cichoriū vocant. Romani cicerbitam asperam, Aphri gathuonem.

177.26. Alij picrida appellant, Aegyptij agon, Romani intubum.

180.9. Thrilaca hemeron, Romani lactucam satiuam, Aegyptij embrosi dicunt.

180.21. Magi sanguinem Titani, Zoroastres pherumbrum, Romani lactucam syluestrem appellant.

181.8.

NOTHA.

181.8. Romani bisacutū, Aegyptij dorisatrum,
Syri adorium, Aphri tiriēta appellant.

181.16. Romani herbam scanariam, aut acu-
lam nominant.

181.21. Alij caucum, alij myitin, Democritus
brion. Romani pedem gallinaceum, aut pedem pul-
li, Aegyptij seselin vocant.

181.28. EuZomon Romani Erucam vocant,
Aegyptij ethrericem, Pæni asuric.

182.27 Alij cynomorion appellant, à similitu-
dine, canini genitalis, alij leonē, Cyprij thyrfinem,
communiter lycon.

185.27. Crommyon aliqui polyidos vocāt, ma-
gi calabotim, Romani cepam.

186.26. Græci scorodon, alij gebofcon, alij ela-
phobefcon vocant.

188.9. Romani sinape vocant.

189.9. Cardamon alijs cynocardamon, alijs
iberis, alijs cardaminaca, Aegyptijs semeth, Romæ
nis nasturtium dicitur.

189.25. Aliqui thlaspidion, alij sinapi persicū,
alij myiten, alij syluestre sinapi, alij dasmophon,
alij myopteron, alij hitron, Aegyptij suitepsum,
Romani scandulatum, alij capsellam, aut pedem
gallinaceum vocant.

190.20. Aliqui chamæplion, magi Hercules
alphita, Aegyptij erethmon.

194.4. Ab aliquibus cerdon, ab alijs cathar-

DIOSCORIDIS

ss, ab alijs struthocamelus, à quibusdam chamarrhyton, à magis callirrhylon, ab Aegyptijs æno, à Pœnis syris, à Latinis lanaria herba aut radícula appellatur.

124.18. A quibusdā cissanthemon, ab alijs cissaphylon, ab alijs chelonion, ab alijs ichthyotheron, ab alijs silene, à Zoroastre triumphalites, ab Osthane aspho, à magis miaspho, Aegyptijs thesce, à Romanis rapum terræ, aut terræ umbilicus, ab alijs arcar vocatur.

160.14. Dracunculus. Cap. Draguntium magnū aliqui aron, alij isaron, alij iaron, alij hieraciū, alij biarō, alij arniagrion, alij ciperitla vocāt: in umbrosis sepibus gignit. Caulē habet rectū, lævē, duūm cubitorū, baculi crassitudine, versicoloribus draconū maculis, purpureis tamē evincētibus: folia rumicis, inflexa: fructū summo caule facit, racemosum, coloris primū cineracei, mox per maturitatē in crocum. & purpurā vergētis: radicē pręgrandē, rotundam, candidā, cortice tenui vestitā. Colligit, & dū maturescit, succus exprimit. siccaturq; in umbra. Radix quoq; messibus effoditur, elotaq; particulatim cōciditur, & funiculo transfixa siccatur in umbra. Cū diluta potiōe, crudā, coctā mve, cū melle delingi prodest, cōtra orthopneas, rupta, cōnulsā, iussim, et destillationes: pota cū vino venerē stimulat: vlcera quę cacoethe vocātur atq; phagedenica, expurgat, pręserim cū vite alba: ex ea et melle collyria.

NOTHA.

ria ad fistulas & partus euocandos cōponuntur:
ad vitilignes cū melle, efficaciter illinitur: polypos
& carcinomata absumit. Succus ad oculorū medi-
camēta, itē cōtra nubeculas, caliginem, albuginesq;
effectū; prabet: herbæ radicisq; odor, teneros conce-
ptus abortu vitiat: itē si triginta grana eius in po-
sca bibātur. Sunt qui eius succū cū oleo auriū dolorē
bus infudere: quinetiā folia, vtpote quæ adstringāt,
vulneribus recentibus imposuere, & cocta in vino
pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut ra-
dicem exemerit, posse à vipera feriri insciantur.

197.23. Aliqui alimon, alij thymon, alij dracō-
tiam, Cyprii colocasion dicunt.

198.13. Græci asphodelon, alij narthecion, Ro-
mani albucum vocant.

199.11. Floret mēsisibus albucum. Quare æqui-
noctio verno, antequām semen adoleuerit, deme-
tendum. Radicem aiunt potam, Veneris cupidita-
tem inhibere, quod herbarius Cratenas assēuerat:
addiditq; sanare podagra dolores, si drachmæ pō-
dere bibatur.

200.7. Cocti cum polenta, & ex suillo adipe
impositi, tumores ac tubercula velocissimè ad sup-
purationem perducunt, & rumpunt.

202.4. Aliqui cynosbaton, alij capriam, alij cor-
ui malū, alij ophioscorodon, alij phyllostaphylon,
quidam thalliā, aut petræam, alij olophyton, alij
ioniten, nonnulli oligochloron, aut acuntion, aut

DIOSCORIDIS

hippomanes, alij trichomanes, magi potera, alij per-
theron, aut cor lupi, alij alochorodon, alij crinon,
alij thlaspin, Romani persicu sinapi, aut inturim,
Aphri herbiacathon.

203.16. Ranunculū aliqui syluestre apium vocāt.

204.8. Anemonem, alij agriam, aut nigrā vo-
cant, alij anemonem phœnicam, alij enemion, non-
nulli meconion, alij tragoceros, alij terræ parinem
aut barbylam, Osthane berilion, item ornios cera-
nion, Pythagoras atractilida, magi cnicum agriā,
Aphri chuffit, Romani orci tunicam.

205.16. Aliquibus ænone vocatur, alijs anthe-
mis, alijs homonoca, aliquibus flos campestris, Ro-
manis concordialis, aut pergalia, alijs liburnia,
Gallis corona.

205.22. Ea, vt herbarius Crateuas author est,
cōtusa cū axungia, strumas discutit. Cribrata eius
farina cū nitro, & sulphure ignem nō experto con-
tra vitilignes efficax est: eaq; sicco linteo antea con-
frictas in balneis sanat: facit & ad scabiem.

Altera argemone. Cap. Altera est Argemone,
quam artemonen aliqui, alij arselam, aut sarco-
collam vocant, Romani argemoniam. Ea folijs syl-
uestri papaueri similis est. Recens trita intercisiones
impositu sanat: oculorum inflammationes mitigat:
pota cum aqua dysentericis auxiliatur: vulnera cō-
glutinat: conuulsis, & vellicatibus imposita mede-
tur, inflammationibus utilis, contra serpentium

mor

NOTHA.

morsus cum vino bibitur.

205.24. Anagallis purpurea, quibusdam ær-
tis aut ægitis vocatur, alijs sauritis, magis oculi san-
guis, aut chelidoniō: Romanis macia, Hetruscis ma-
sytipos, Gallis sapana, Dacis cerceraphrō. Anagal-
lis communis, quibusdam corchoron, alijs halicaca-
bon, alijs Zeliaurus, magis nycteritis, Aegyptijs me-
cū, Romanis aneciaton, Aphris asirrisse.

206.12. Aliquibus citharon, alijs cissaron, alijs
chrysocarpos, alijs poëtica, alijs corymbethra, alijs
cysion, alijs dionysia, alijs ithytherion, alijs per-
sis, alijs cemos, alijs asplenos, Romanis sylua ma-
ter, alijs hedera, Gallis suibites.

207.17. Chelidonium magnam nonnulli pœo-
niam vocāt, alijs cratcam, alijs aybiū, alijs glauciā,
alijs pandios radix, quidam philomedion, alijs otho-
nion, Romani fabium, Galli thonan, Aegyptij mo-
both, Daci crustana.

290.13. Auricula muris. Cap. Myosota alijs
myoton, alijs anthyllion, alijs alsinen, nonnulli
myorthochon, alijs myrtosplenon, Latini muris au-
riculam vocant, Aphri labatholabat. nomen ideò
accepit, quòd muscutorum aures folijs imitetur.
Lucus & sabulosa loca amat, ideò alsine dicta
est. Ea helxine similis, sed humilior, ac folijs mi-
nor. Vim refrigeratorem habet, oculorum inflam-
mationibus cōuenienter ex polenta illinitur. Suc-
cus eius aurium doloribus instillatur: in totū ea-

DIOSCORIDIS

dem potest, quæ helxine.

209.24. *Isatis satiua* aliquibus *augion*, alijs *egne*, *Magis arusion*, *Romanis gluta* aut *glastum* dicitur.

210.8. Sed sciendum est, ne tradita errorem *pariant*, *satiuum glastū*, *luteū florem*, *tenuiores*, *multifidosq;* *ramulos proferre*, in *cacumine* autē *folliculos linguae speciem representantes*, in quibus *semen continetur melanthio simile*, *caulemq;* *supra binū cubitorum altitudinem attolli*: *sylvestre* verò *nigriora ferre folia*, *caulem minorem*, sed *crassiorē*: *florem purpureum*, aut *cœrulcum*, *fructum cruciformem*, *asperū*, in quo *semen*, *folijs exilibus quinquepartito diuisum*.

210.10. Aliqui *sylvestre semperuiuum*, alijs *portulacam sylvestrem* appellant, *Romani illecebram*, *Aegyptij anoth*, *Aphri atirtopurin*.

213.3. Aliqui *Rhiam* vocant.

213.19. Aliqui *centauriam radicem*, alijs *aloēz Gallicam*, alijs *narcē*, alijs *chironion*, *Dardani aloitin*, *Romani genus* aut *cicendiam*, alijs *ciminalē* vocant.

214.29. Alijs *melocarpos*, alijs *teuxinon*, Latine *aristolochia*.

216.4. Appellatur à quibusdam *ararisa*, *melecaprum*, *ephestios*, *lestitis*, *pyxionyx*, *Dardanion*, *iontitis*, *Gallis theximion*, *Aegyptijs sophocph*, *Siculis chamamelon*, *Italīs mālum terre*. Da-

cis absinthium rusticum: nascitur in montibus, & calidis locis, aut campestribus, & petrosis. Ad grauem febrim efficax est, si nidore subditis carbonibus febricitans suffiatur, febris leuabitur: vulnera impo-
sita sanat: carcinomatis narium, cum cypero, & dracunculi semine, & melle prodest: rigoribus medetur, cocta in oleo aut adipe suillo, illitaq;. Cratenas herbarius, & Gallus, eadem de hac tradiderunt, et præterea podagricis eam auxiliari.

216.6. Glycyrrhizam aliqui pōticam, alij glyceraton, quidam symphyton, alij leonticā, alij glycyphyton, aliqui scythion, alij adipson, alij sylithram, alij libyestason, alij homœnomæon, alij peenthæomæon, Latini dulcem radicem appellauere.

216.24. Aliqui narcem vocant, alij limnesion, alij maronē, alij plectroniam, alij chironiam, alij limnestim, magi Herculis sanguinē, Romani phierri, & vneferam, & fel terre.

217.17. Panacia appellata est, quoniam omnia mitigat vitia, quæ inflammationem minantur, plurimisq; scateat remedijs: pulsationes vulnorum, vrinæ stillicidia, calculosorum cruciatus, clystere immissa sedat. Legitur matutinis, sole ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia lumine complentur.

217.19. aliqui limnesion, alij helleboriten, alij amaranton, magi Herculis sanguinem, Latini febrifugiam, alij auram, multi radicem, Daci tul-

DIOSCORIDIS

ni saluam vocant.

235.4. Hedyosmon satium alij mintham, alij calamintham, Latini mentham vocant, alij nepetam, Aegyptij tis, alij pherthumerthumonthu, alij perxo, alij maceto.

235.24. quidam cephaloton, alij epithymide, alij thyrsion, Latini thymum, Aegyptij stephanen, Daci mosulam.

237.23. aliqui 7ygin syluestrem, alij polion vocant, Aegyptij meruopyum, Latini serpyllum.

238.14. aliqui nominat amaracū, alij triphyl-
lon, alij agathides, alij enecion, alij acapnon, Pytha-
goras thrambē, Aegyptij sopho, Armenij myuron,
magi ichrei asinum, aut hecigonon Isidis, Latini
maioranam.

239.20. aliqui origanida, aut hysobriū vocāt.

239.28. alijs syluestre basilicum, Latinis oci-
mastrum.

240.25. ruta montana, quā aliqui rhyten mon-
tanam vocant: & hortensis, quā Aegyptij epnubū,
Syri harmala, alij besa sa, Aphri churma.

242.25. Syluestris ruta Cap. rutā sylustre ali-
qui appellāt hypericō, alij androsamon, alij coron,
alij chamapityn, Romani hederalē, aut centonalē,
Aphri churma semmaced. odor seminis resinofus
est, ideo chamapitys aliquibus nominat. Frutex est
surculosus, rubescens, folia rutae figura: flores lutei,
qui digitis triti sanguineo succo manant, vnde an-
dros

NOTHA.

drofemon vocitarunt. Ramuli subhirsuti, siliquæ teretes, hordei effigie, in quibus semen nigrum resinam olens, gignitur incultis et asperis. Urinâ ciet, menses appositu trahit, pota cum vino quartana liberat. Folia cum semine ambustis illitu medentur, & diebus quadraginta epota ischiadicos sanant.

243.13. aliqui sylvestre leuconion appellant.

247.2. aliqui cerascomen vocant. Latini rusticam pastinacam, aliqui carotam, Aegyptij babylon, Aphri sicham.

247.19. nonnulli sphagnon vocant.

248.3. Aegyptij cyonum phricem vocant.

249.23. Anethum quod estur, aliqui polgida vocant, alij anicetum, magi cynocephali geniturâ, aut capillos, alij Mercurij semen, Latini anethum, Aphri sicciriam, Aegyptij arachu, Daci pulpum.

252.18. siue cuminum sylvaticum.

251.11. Animi, Latini amminum Alexandrinum, quidam regium cuminum appellant.

251.24. Aegyptij ochion vocant, Aphri gæd.

252.9. alijs sonchites, Romanis lampuca, Pœni sithileas.

252.17. aliqui sonchiten, alij entimon agrion, Romani intybum sylvestrem vocant.

253.18. à quibusdam pedinon, ab alijs hydrofelinon agrion, Romanis apium rusticum appellatur.

253.19. aliqui petroselinon sylvestre appellant, Aegyptij anonim.

254.6.

DIOSCORIDIS

ni saluiam vocant.

235.4. Hedyosmon sativum alij mintham, alij calamintham, Latini mentham vocant, alij nepetam, Aegyptij tis, alij pherthumerthumonthu, alij perxo, alij maceto.

235.24. quidam cephaloton, alij epithymide, alij thyrson, Latini thymum, Aegyptij stephanen, Daci mosulam.

237.23. aliqui 7ygin sylvestrem, alij polion vocant, Aegyptij meruopyum, Latini serpyllum.

238.14. aliqui nominat amaracu, alij triphyl-
lon, alij agathides, alij cnecon, alij acapnon, Pytha-
goras thrambe, Aegyptij sopho, Armenij myuron,
magi ichrei asinum, aut hecigonon Isidis, Latini
maioranam.

239.20. aliqui origanida, aut hysobriū vocāt.

239.28. alijs sylvestre basilicum, Latinis oci-
mastrum.

240.25. ruta montana, quā aliqui rhyten mon-
tanam vocant: & hortensis, quā Aegyptij epnubū,
Syri harmala, alij besafa, Aphri churma.

242.25. Sylvestris ruta Cap. ruta sylvestre ali-
qui appellāt hyperico, alij androsomon, alij coron,
alij chamapityn, Romani hederalē, aut centonalē,
Aphri churma semmaced. odor seminis resinofus
est, ideo chamapitys aliquibus nominat. Frutex est
surculosus, rubescens, folia ruta figura: flores lutei,
qui digitis triti sanguineo succo manant, vnde an-
dros

drosemon vocitarunt. Ramuli subhirsuti, siliquæ teretes, hordei effigie, in quibus semen nigrum resinam olens, gignitur incultis et asperis. Urinâ ciet, menses appositu trahit, pota cum vino quartana liberat. Folia cum semine ambustis illitis medentur, & diebus quadraginta epota ischiadicos sanant.

243.13. aliqui sylvestre leuconion appellant.

247.2. aliqui cerascomen vocant. Latini rusticam pastinacam, aliqui carotam, Aegyptij babylon, Aphri sicham.

247.19. nonnulli sphagnon vocant.

248.3. Aegyptij cyonum phricem vocant.

249.23. Anethum quod estur, aliqui polgida vocant, alij anicetum, magi cynocephali genitura, aut capillos, alij Mercurij semen, Latini anethum, Aphri siciriam, Aegyptij arachu, Daci pulpum.

251.18. siue cuminum sylvaticum.

251.11. Ammi, Latini ammiu Alexandrinu, quidam regium cuminum appellant.

251.24. Aegyptij ochion vocant, Aphri goed.

252.9. alij sonchites, Romanis lampuca, Pœni sithileas.

252.17. aliqui sonchiten, alij entimon agrion, Romani intybum sylvestrem vocant.

253.18. à quibusdam pedinon, ab alijs hydroselinon agrion, Romanis apium rusticum appellatur.

253.19. aliqui petroselinon sylvestre appellant, Aegyptij anonim.

254.6.

DIOSCORIDIS

234. 8. aliqui grielon, alij agrioselinum.

255. 22. aliqui elaphicon, alij nephricon, alij ophi-
genion, nonnulli ophioctonon, aliqui herpyxon, alij
lymen vocant, Romani cervi ocellis, Aegyptij che-
min, Aphri ascaucan.

256. 25. hippomarathrum, aliqui marathin,
alij marathrum agrion, Aegyptij sampsoth, magi
thymarnolion, Latini fœniculum erraticum, ali-
qui mion, Galli sistrameor.

257. 29. alijs diachysis, alijs diachytos, alijs pa-
ralysis, alijs camarus, alijs hyacinthus, alijs del-
phinias, alijs nerion, alijs neriadion, aut sosandron,
aut cronion, Romanis bucinus minor vocitatur.

258. 14. aliqui doryenion, alij pyrinon, alij py-
roton, aut pyrothron, alij arnon pyriten, magi py-
riten, Romani salinarem vocant.

238. 25. aliquibus Zea aut cœpsanema appellat.

260. 19. aliqui arangē vocant, alij phalāgion,
alij asterion, nonnulli nesyrin aut sphondylin, qui-
dam choroclanon, aut cœnanthen, Romani herbā ru-
tinalem, Aegyptij apsapher, magi osirin.

261. 21. aliqui agrion vocant, alij agriophyl-
lon, magi bonum: demonem, Romani satariam.

263. 8. aliqui melanthium, alij mecona agrion
melana, Romani papaver nigrum appellant.

269. 2. herba est ex qua ammoniacū fit suffi-
men, quod thymiama vocant, aliqui agaZylon,
alij criotheum, alij heliustrum, Romani guttam.

271. 18. aliqui ampelocarpon, alij omphalo-

NOTHA.

tarpon, nonnulli philanthropon vocant.

271.29. aliqui aspidion, alij haplophyllon, alij accyseton, alij adyseton nuncupant.

272.12. aliqui cission, alij cissophyllon.

272.20. aliqui armyrō vocant, alij enicon sylvestre, alij aspidion, magi aphedron, Aegyptij che-
non, Romani praesepium, aliqui fusum agrestem,
alij colum rusticam.

273.2. quidam clinopedion, alij polygonaton,
alij Iouis colum, alij echeonymon vocant.

273.8. Edocuit experientia contritos in vino
albo ramulos, ijs qui affectibus laborant, quae vio-
lentiae vocantur, magno esse praesidio.

273.10. aliqui cleonicon, alij ocimoides, alij Zo-
pyron vocant.

273.21. aliquibus leontopodion, alijs leuceoron,
alijs leontiō, alijs doris, aut doriēteris, alijs lychnis
agria, alijs pardale, alijs thorybethron, alijs rha-
peion, alijs cornutum papauer, alijs anemone, Ro-
mani patabelclon, aut semen leoninum dicitur.

275.4. aliqui athanaton vocant, alij acyloniō,
alij ballarion, alij geranopodion, quidā corymbiō,
aliqui taurion, alij sceptron, aut maloton, Aegy-
ptij semeon, magi sanguinem apocathemenes, Ro-
mani genicularem aut ballariam.

275.7. aliās tragonaton, aliās atocion, aliās hie-
racopodion, aut lampas vocatur, Aegyptijs se-
mura, magis apocathemenes taurus, Romanis
agre

DIOSCORIDIS

agreste intubum.

275.13. Crinon basilicon alij crinanthemon vocant, alij gallirion, Magi Martis sanguinē, Osthānes aurem crocodili, Aegyptij symphæphon, quidā tialon, Latini lilium, aliqui rosam iconis, Syri sasa, Aphri abiblabon.

276.6. Alij magnū vocāt, aliqui nophitan, alij notiano scemin, alij nosprasson, alij nothera, alij no chelin aut noſtelin, alij nophryn, alij gnotorim, alij gnotera, Romani apnium, aut medatam, aut vlce rariam, aut marrubium nigrum, alij canthurinū. Aegyptij asphon, magi Iſionis sanguinem.

276.18. Alij melitaon, alij meliphyllon, alij ery thran, alij temeſe, Latini apiaſtrum aut citragi nem, Galli meriſimorion vocant.

277.5. Praſion, alij eupatorion, alij phyllopha res, alij tripedilon, alij camelopodion, Aegyptij aſte ropen, magi tauri sanguinem, aliqui aphedron, alij Hori genituram, Latini marrubium, aliqui la beoniam, Aphri atierberziam.

278.6. Aliqui phyllin, alij acaulon, alij ſylue ſtre lapathum vocitant.

278.16. Alijs leucacantha dicitur.

278.26. Alij cnicion vocant, Romani trifolium acutum, aut odoratum.

279.14. Polium montanum, aliqui teuthrion, alij pheux aſpidion, alij achamenin, alij ebenitin, alij meloſmon, nonnulli belion, quidam leonthocha

ron

non vocant.

282.25. Aliqui scorbion, alij pleuritin, alij dy-
sofmon, alij syluestre calaminthen, quidam chamae-
dryn, alij mithridaniō, magi Podotis sanguinē, Ae-
gyptij apho, Romani trisaginē palustre appellant.

281.13. Beclion quidam rhichion, alij petrinā
vocant, alij peganon, alij pithion, alij pagonaton,
alij chamaleucen, alij procheton, alij arcophyton,
alij chamægeron, Aegyptij saarhan, Latini tusila-
ginem, quidam pharphariam aut pustulaginem,
Bessi asa.

281.28. Quibusdam polyclonos, alijs monoclo-
nos, alijs toxitesia, alijs ephesia, alijs anactorios,
alijs soxusa, alijs leia, alijs licophryx, magis homi-
nis sanguis, alijs chrysanthemon, Romanis valen-
tia, aut serpyllum, aut herba regia, aut artemisia,
alijs rapium, aut tertana, Gallis pona. Dacis Luo-
ste dicitur.

282.16. Artemisia tenuior. Cap. Altera tenuio-
ribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarū du-
ctus, nascitur: cuius flores & folia contrita, sam-
psuchi odorem reddunt. Si quis stomacho laborans,
herbam cum amygdalino oleo bene contundat in
malagmati lentorem, & stomacho imponat, sa-
nitati restituetur: qui neruorum dolore crucian-
tur, si sucum ex rosaceo illinant, sanantur.

282.18. Romani caprum syluaticum vocant,
quidam botryn, alij apium rusticum, Aegyptij

N n

DIOSCORIDIS

merseon.

283. 6. Aliqui Pelonitin, alij tricā, alij geranog-
ronta, Romani vchinastrū, Aphri iescen appellant.

283. 9. Aliqui mertryga, alij myrrhin, alij oxy-
phyllon, alij cardamomon, alij origanum vocant,
magi hierobryncas, Latini gruina, aut pulmo-
niam, aut cicotriam.

282. 15. Gnaphalion, alij hires, alij ampetocon,
alij anaxiton, alij anaphalim. Aegyptij semeon,
Galli gelafonen, Latini centumculum vocant, qui-
dam tucularem, alij albinum.

284. 8. Aliqui cerascomion, alij leucanthon vo-
cant.

284. 15. Conyza magna. Cap. Conyza magna
aliquibus cynozematitis, alijs danais, alijs tana-
chio, aliquibus phycos, alijs ischys, alijs dynosmos,
magis brephoclonos, quibusdam anubias, nonnullis
hedemias, Aegyptijs ceti. Romanis intybi, aut mi-
litaris, aut deliarium, aut febrifuga, alijs phragmo-
sa, alijs musteros, alijs pissa nuncupatur.

285. 2. Aliqui conyzam parvam, alij panion,
alij libanotidem, magi cronon vocant.

285. 10. Alij hemerocatalacton, alij crinon a-
grion, alij crinanthemon, alij porphyraetes, alij bul-
bum hematicon, alij anticantharon, Aegyptij io-
cri, Romani bulbum, aut libium sylvestre, aut ma-
cinum, Aphri abiblabon vocant.

285. 28. Aliqui Basilicon vocāt, Latini violam
albā.

NOTHA.

lbam, aliqui angustiam, nonnulli violam matro-
nalem, aut passarinam, aut polyphuram.

288.11. Alij melion aqueum, alij entaticon, alij
riapicon, aut satyriscon, aliqui satyri testiculum
appellant, Latini molorticulum Veneris.

288.21. à Latinis geminalis, à Dacis hormia di-
citur.

289.14. Aliqui osnada, alij ononin, alij phloni-
tin appellant.

290.13. Hanc nymphona alij vocant.

290.20. Sunt qui picrada appellēt, alij leucen,
alij thalassiam.

290.28. Alij pteryx, alij lonchitim, alij atu-
rion, alij phrygiam, aut phrygitim, aliqui philtro-
doten, magi mustela sanguinem.

281.25. Quidam anthyllon, alij anthemida vo-
cant, alij eranthemin, alij leucanthemō, alij soran-
thin, alij campestrē florem, Romani solastrum.

292.11. Anthemida aliqui leucanthemon, alij
eranthemon, quoniam vere floreat: alij chamæme-
lon, quoniam mali odorem habeat: nonnulli melan-
themon, alij chrysocomam, alij calliā, Romani ma-
lium, Aphri astertiphen appellant.

293.11. Alij antemida, alij leucanthemon, alij
chamæmelon, alij chrysocalin, alij melabathron,
nonnulli campestrē florem, Romani solis seculis, ali-
qui millefoliū, Hetrusci cautam, Aphri thamath.

294.5. Alij balsamenā, magi hemorrhā, alij

DIOSCORIDIS

Mercurij geniturā, alij aphthitis semen, aut mine-
sitheum, Romani cappacoraniā, Aphri narat.

294.14. Alijs orobelion, quibusdam orobax,
alijs hemagogon, alijs pæfaden, alijs monogenion,
alijs meonion, alijs pæonion, alijs panthiceratos, a-
lijs idei dactyli, alijs aglasphotis, alijs theodonion,
alijs selenion, magis selenogonon, alijs phthipsis. Ro-
mani casta.

295.12. Alij agonychon vocant, alij leontion,
alij leoninum lapidem, alij gorgonion, alij tantali-
zin, alij diosporon, Romani columbam, Daci gono-
letam, alij heracliam.

296.3. Aliqui tenthrion, alij dracanon, alij cin-
nabarim, Latini rubiam, Hetrusci lappam mino-
rem, Aegyptij sophobi vocant.

296.25. Alias cestron aut medusa dicitur, La-
tinè veneren aut lanceola.

297.5. Latini longinā, aut calabrinam dicunt.

297.12. Alij althiocon vocant.

298.21. Aliqui cannabion, alij schinoſtrophon,
alij asterion appellarunt.

298.26. Aliqui hydraſtinam, Romani termi-
nalem dicunt.

299.6. Aliqui acopon, alij anagyron, alij agna-
copon vocant.

299.27. Alij alceam, alij acyron, alij lyron.

300.13. Aliqui onobrochilon, alij escaſmenem,
alij hypericon, alij corion, alij chamæpytin. Ro-
mani

NOTHA.

nani opacem, alij brichilatam, alij loptam, alij iocalem, Daci in iassexe appellant.

301.24. Alij ascyron, aut dionysiadem.

302.21. Alijs pitysorysis, alijs orizelon, ijs qui Pontum incolunt olocyron, alijs bryonia sylvestris, Athenis ionia, Eboicis sideritis, magis Minerua sanguis, Latinis aiuga aut cypripum, Dacis dochela appellatur.

306.6. Vettonica. Cap. Vettonica nascitur in pratis & montibus, locis mundis, & opacis, circa frutices: animas hominum & corpora custodit, nocturnas ambulationes, & loca sancta: grauibis somnis resistit: ad omnem medendi usum commendata. Radicem habet rubram, odoratam, porracea folia, medio eorum puniceo, in recto calamo triangulari, floribus in cacumine purpureis. Farina recentis vulneribus capitis indita, dolorē finit: vulnera glutinat: fracta ossa extrahit: sed quotidie imponi debet, dum persanescant: dolori capitis medetur, si iure decocti perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix suffiatur.

306.21. Aliqui polygonatum appellant, alij cynochalam, alij heracliam, alij asphalton, alij chiliophyllon, alij clema, alij polycarpon, alij carcinethrō, alij tenthelida, alij myrtopetalon, alij cnopodion, alij Zarithream, alij pedalion, Aegyptij thephin, aliqui stemphin, magi genituram herois, aliqui vnguem muris, Latini sanguinariam aut semē

DIOSCORIDIS

nalem, Aphrichulum.

307.27. Alijs philetæron, alijs daphnoides, alijs smyrnoides aut polygonoides appellatur.

308.7. Aliqui epigeton, Aegyptij philacæon, Romani ambuxum vocitant.

309.23. Romani soldaginem vocant.

310.1. Rutaceis similes.

310.20. Alij tobion, Romani stipam vocant.

310.26. Alij calycanthemon, alij periclymenon, alij heliophyes, nonnulli hepatitin, alij milacem, alij anatolicon, alij diticon, alij merginem, Latini volucrū, aliqui volucrū maius, Aegyptij oxyui, alij clymenō, alij clymenion, quod et agonon nuncupāt.

311.8. Aliqui Aeginam, alij clymenon, alij carpathon, alij splenion, alij epetitin, alij axinam maiore, nonnulli clematitin, alij myrsinen, alij calycanthemon, magi polion Veneris, Aegyptij turcon, Romani volucrum maius, Aphrichanath appellant.

311.26. Tribulus aliquibus bucephalus, alijs tauroceros, Romanis tribulus aquaticus dicitur.

312.18. Sarxiphagon. Cap. Sarxiphagon, aliqui sarxiphragon, alijs empetron, Romani saxiphragiam vocant: frutex est surculosus, in petris & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur: stranguriæ prodest: singultum sedat: calculos vesicæ frangit, & urinam ciet.

312.19. Aliquibus potamogiton appellatur, alijs

neur

NOTHA.

neuroides, alijs lonchitis, alijs rapionion, Mysijs mēdruta, Syris neuda, alijs lycosemphyllon: alijs belleborosemata, alijs scyllion, magis lupicor, Romanis viartum nigrum, quibusdam tintinabulum terræ, Gallis iumbarum, Dacis dacina.

312.27. Aliqui leporis cuminum appellant.

313.2. Aliqui medicam appellant, alijs triphyl-
lon, alijs clemation, nonnulli osmon, quidam trigo-
non, alijs cypellion, alijs polyphyllon, Romani trifo-
lium odoratum, Agyptij epaphon.

313.11. Ab alijs erineos, ab alijs thryas, à nonnul-
lis polyrrhizon, à Romanis vindicta nominatur.

313.21. Aliqui anaclorion, alijs phasganon, alijs
machæronion, alijs arion vocant, Romani gladio-
lam, quidam genitalem.

314.10. Alij bolon vocant.

314.16. Ab aliquibus iris agria, ab alijs cacos,
à Romanis gladiolus, aut iris agrestis, à Dacis a-
prus dicitur.

315.2. Anchusam aliqui catanchusam vocant,
alijs libycam, alijs archibellion, alijs alcibiadion, alijs
onophyllon, alijs porphyrida, alijs mydusam, alijs sa-
lyca, alijs noneam, Aphri huic sath.

316.12. Aliqui aridam, alijs alcibiadion, Romæ
ni alcibiicum nominant.

316.25. Aliqui & hæc echio vocat, alijs scorpiu-
ron, alijs sparganō, alijs altheam, alijs amarantida,
alijs probateam, alijs elaphion, alijs antiminon, alijs

D I O S C O R I D I S

porphyrida, alij angion, alij nemeston, alij phileterion, alij hyenopsolon, alij thyrstitim, alij thermusin, alij misopathos.

317.5. Aliqui hydreron, aliqui ocymoides.

317.14. Agrostin aliqui egicon, alij amaxitin, Aegyptij amphivocant, Latini gramen, aliqui asphyllion, alij sanguinalem, alij violam, Hispani apariam, Daci cotiatam, Aphri iebal.

318.9. Magi genituram, aut sanguinē Titani, alij scorpionis urinam, Pythagoras parmiron, Andreas xanthophanea, Osthane boëphthalmō, Aegyptij sendianor, Romani vertemnis, alij soleastrū, Aphri vdedonin.

319.5. Aliqui myriomorphon nominant, alij chiliophyllon, alij stratioticon, alij heracleon, Latini supercilium Veneris, alij acron syluaticon, alij militarem, alij millefolium.

319.19. Batos, ab alijs cynobatos, ab alijs selinorition, ab alijs asyntrophos, à magis Titani sanguis, ab alijs ibidis sanguis, à Romanis rubus, ab alijs sentes, à quibusdā mora baticana, à Dacis mātia, Aegyptijs hæmoos, alijs ametros appellatur.

321.2. Alij hepatorium, aut hepatitis, Romani volucrum maius.

321.17. Pentaphyllon aliqui pentapetes, alij pentatonion, alij pentadactylon, alij pseudoselinum, alij callipetalon, alij xyloloton, nonnulli xylopetalon, alij asphalton, alij pentacemon, alij thymiastin,

NOTHA.

tin, Aegyptij orphitebeocen, alij enotrö, magi ibidis
vnguem, alij ibidis pennam, alij hermodactylon,
Romani quinquefolium, Galli pempedulam, Da-
ci propedulam appellant.

322.27. Aliqui rhon, alij anchinopa, alij phæ-
nicopteron, alij rhon stachyos, alij osthaleu, Aegy-
ptij athnon nominant.

323.14. Alij rhodida nominant.

323.20. Hippurin, alij trimachion, alij anaba-
sin, alij cheredranon, alij Phædran, alij itianden-
dron, alij gis, alij schæniostrophon vocat, Aegyptij
pherphram, magi Saturni cibum, Romani equina-
lem, alij equi salicem, aut anabasion, alij ephyrö.

324.4. Aliqui equition, & alij chedran, alij gy-
non, Romani salicem equinam appellant.

325.1. alij scorpion, alij garganon, Romani cor-
nulacam, alij bituensa, Daci saliam, Aegyptij so-
ber, Aphri achæosin.

325.20. Oxyshænos aliquibus schænos lewis,
alijs oxypternos, alijs Solis superciliu, Romanis iu-
cus marinus, aut manualis, Aphris chudua dicit.

326.13. Alijs adocetos, alijs neuras, alijs phry-
nion, Romani bouinalis.

326.17. Alijs chrysitis, alijs chrysanthemö, nō-
nullis amaranton, alijs diospogon, Aphris dubath,
vel burchumail, Romanis Iouis barba appellatur.

326.26. Aliqui chrysoespermon vocant, alij da-
spin, alij origanü, alij arcophthalmon, Romani

D I O S C O R I D I S

aridariam.

327. 9. Aliqui calchitin vocant, alij chalcantion, alij calcantemon, Romani acantham, Herusci garuleum, Aphri churseten.

328. 8. Alij trigonion, alij bunion, alij hierobotanen, alij philtrodoten, Aegyptij pemsente, magi Iunonis lachrymam, nonnulli mustela sanguinem, alij sanguinem Mercurij, Romani cristam gallinaceam, alij pheriam, alij trixalidem, alij exuperam, aliqui herbam sanguinalem.

328. 20. Alij erigenion, alij chamalycon, alij sideritin, quidam curitin, alij persephonion, alij Iouis colum, alij dichromon, alij callesin, alij hipparison, nonnulli demetriada, Aegyptij pemplithen phtham, Pythagoras, erysi sceptron, Romani cinnamum.

329. 11. Aliqui chamaesycen, alij gatalen, alij onycha vocat, Romani pinum truiam, aut ficum terra, aliqui glandulam, alij tium, alij nonariam.

329. 22. Aliqui heloniam, alij porphyranthes, Romani vaccinium, alij vlcinum vocant.

330. 4. Nonnulli oxytonon, Romani papaueralem, Aegyptij nanti.

330. 23. Papauer satium aliqui chamaesycen, alij papauer rixada, alij oxytonon appellant, Romani papauer, Aegyptij nanti.

333. 11. Aliqui paralion, alij sylvestre papauer, alij thalassion, Romani fabulum marinum, Aphrodisium

sisimacam vocant.

334.2. Qui hoc papauer hauserit, non alia accidit, quàm qui opium ebiberit. Cui eisdem succurritur auxilijs. Semen æstate dum siccum est, colligitur. Decoctum radicis bibitur cum vino, sanatq; dysenteriam.

334.17. Alij *pythonion*, aliqui *dioscyamon* vocant, alij *adamata*, alij *adamenon*, alij *hypnotico*, alij *emmanes*, alij *atomon*, nonnulli *dithiambrion*, magi, *Pythagoras*, & *Osthanes*, *xeleo*, *Zoroastres* *tiphonion*, magi *rhapontica*, Romani *mananoentariam* aut *apollinare*, *Aegyptij* *saphitho*, *Hetrusci* *fabulum*, *Galli* *bilinuntiam*, *Daci* *dieliam*.

336.5. Aliqui *cataphrysin*, alij *cynocephalon*, alij *chrystaton*, alij *cynomyam*, alij *psyllerin*, alij *sicelioticon*, *Siculi* *comidijn*, Romani *herbam pulicarem* aut *silbacium*, *Aphri* *vargugum* appellant.

336.27. Romani *strumum* vocant, alij *cacubulum*, *Aegyptij* *allelo*, *Galli* *scubulum*, *Aphri* *astrimunim* vocant.

338.2. Aliqui *dircion* appellant, alij *strychnon manicon*, alij *dorycmio*, alij *calliada*, Romani *apolinare* *minore*, alij *ulticanam* *herbam*, aut *opsaginem*, *Daci* *cycolidem*, *Pæni* *cacabum*.

338.19. *Strychnon manicon*, alij *anydron*, alij *pentadryon*, alij *enoron*, quidam *orthogyion* vocat.

339.22. Alij *exeranthès*, aliqui *antimnion* aut *antimion*, alij *hombochylon*, nonnulli *minon*, *Aegy*

ptij

DIOSCORIDIS

ptij apemum, Pythagoras anthropomorphon, alij
alæten, alij thridaciam, alij cammaron, Zoroastres
diamonon, aut archinen, magi hemionos, aliqui go
nogeonas, Rom. caninū mālū, alij terrestre mālū.

342.18. Alij cyamon leucon, Rom. colomestrū.

343. 4. Gonion, aliquibus eginos, alijs ethusa,
alijs apolegusa, alijs dolia, alijs amaurosis, alijs pa
ralysis, nonnullis aphron, quibusdam creidion, alijs
æten, alij catechomenion, alijs abioton, alijs apsen
des, alijs ageomoron, alijs timoron, alijs polyanody
nos, alijs dardanis, alijs catapsyxis, Osthani baba
thy, Aegyptijs apēphi, Romanis cicuta appellatur.

344.8. Aliqui cynanchon appellant, alij parda
lianches, alij cynomoron, alij cynoctonon, alij pha
leon, alij cynanchen, alij oligoron, alij hippomanes,
alij onistū, alij ophioscorodon, alij cynaricam, alij
elaphoscorodon, magi paralysin, Romani brassicā
rusticam aut caninam.

344.20. Alij spongon, alij hamostarin, Roma
ni rhododendron. Lucani icmanem, Aegyptij schim
phen, Poeni rhododaphnen dicunt.

345.23. Aliqui elitim vocant, alij canocerseam,
alij amelxinen, alij eusinen, alij amorginen, alij su
cotachos, alij psychuacos, alij melampelon, alij cit
tampelon, alij cissamethon, alij anaretamenon, Ro
mani volutum laparon, Aegyptij apap, alij par
thenion, alij sideritin, alij heracleam, nonnulli agriā,
quidam elibodion, alij polyonymon.

347. 9. Alij myortochon dicunt, alij myorto-
splenon. Romani muris auriculam, Panni labatho-
labat.

347. 20. Agriam phacon aliqui, alij epipteron,
Romani viperalem, alij iceo smiridonon vocant.

347. 27. AiZoon maius, aliqui aithales, alij am-
brosion, alij chryssipermion, alij Zoophthalmon, alij
bubophthalmon, alij stergethron, alij æonion, alij
aichryson, alij holochryson, nonnulli chrysanthem-
mon, alij protogonon, alij boron, alij notion: magi
paronychiam, alij chrysitin, Romani ceriam cu-
spiam, aut Iouis caulem nomināt, alij leapedes, alij
sedum maius. Aegyptij pamphanes.

348. 17. AiZoon paruum, alij petrophyes appel-
lant, alij brotion, alij theobroton, crobysson, alij chi-
merinen, alij ceraunian, Romani vitalem, alij sem-
peruium, Aegyptij etyceltam.

348. 24. Semperuium quod tenui cōstat folio,
aliqui aizoon paruum, alij petrophyes, alij aizoon
syluestre, Romani semperuium minus appellant.

349. 2. Aliquibus cymbalion, alij scytalion, alijs
hortus Veneris, alijs terræ umbilicus, alijs stæchis,
alijs stergethrō, Latinis umbilicus Veneris dicitur.

349. 19. Acalyphen aliqui cnidem, alij adicen,
Latini vrticam, Aegyptij selepsion, Dacidyne appel-
lant. Acalyphen etiam alteram aliqui cniphen, Ro-
mani vrticam mollem vocant.

350. 12. Alijs galeobdolon, vel galephos, Aegy-
ptijs

DIOSCORIDIS

ptijs etopi, Latinis vrtica labeo dicitur.

350.23. Alijs galatron, aut gallerion.

351.4. Erigeron à Latinis herbulum, aut senecio vocatur, aliàs erechthites.

351.25. Marinum bryon, aliqui ballarin, alijs iranen, Latini gnomesilon vocant.

352.14. Aliàs stachyites, apud Aegyptios ethen-
chis, Latine fatalis dicitur.

352.20. Aliquibus fluuiatilis stratiotes nuncu-
patur, Aegyptijs tibius, magis eluri sanguis.

353.11. Phlomon, alijs phlonon, Latini verba-
scum, alijs pheminalem vocant.

355.8. Arcion alijs prosopida, alijs prosopion, alijs
aparinen, Latinis personatā, aut lappā appellant.

355.24. Alijs borion appellatur.

355.28. Capnon, aliqui corydalion, aut corion
vocant, alijs syluestre corydalion, alijs capnon in hor-
deis, alijs capniten, alijs marmariten, alijs capnogor-
gion, alijs chelidonion micron, alijs peristerion, alijs
cantharida, alijs chaleocri, Romani apium aut fu-
mariam, Aegyptijs cnyx, alijs tucin.

356.7. Alijs tripodion, alijs tribolion.

356.12. Aliqui libyon, alijs triphyllon.

356.22. Aliqui telinen, alijs lotum magnum, alijs
triphyllon, Romani trifolium maius appellant.

357.18. Alijs melophyllon, alijs stratioticen, alijs
achillion, Latini millesolium vocant, aliqui super-
cibum veneris, Galli beliocandas.

NOTHA.

358.27. Alij myrrham, alij conilen vocant.

358.23. Aliqui buglossum magnum vocant, Romanam spinam mollem.

359.6. Ab aliquibus bubonion appellatur, ab alijs asteriscos, alijs asterion, quibusdam hyophthalmion, Romanis inguinalis, Dacis rathibis.

359.19. Stellares huius radij noctu splendent, quapropter qui ignari antea non viderunt, esse inane simulacrum arbitrantur. Medijs saxis & asperis exit: inuenitur autem ab opilionibus. Crateuas rhizomus hæc de ea refert: Si viridis cum axungia vtere tundatur, contra rabiosorum morsus, turgentia guttura, proderit. suffium quoq; serpentes fugat.

359.27. Aliqui dasypodion, alij priapeion, alij ion syluestre, alij cybelion, Romani fetialin, aut mirariam, aut violam purpuream vocant.

360.5. Aiunt quoddam purpureum est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

360.16. Aliqui aton, alij actinen, alij anemosphoron vocant, magi paradacry, Aegyptij erxoën, Rom. scopā regiam, Aphri Zigar, nonnulli thepso.

361.2. Alio nomine chameleuce, alio cissos acarpos, aut terra corona, aut selinitis, Latine hedera pluuiatica dicitur.

361.17. Magi eluri gonon, Osthanes tzaunchi, Aegyptij antuenrinbesor, Romani linguam bubulam, alij libanium, Pæni asanaph vocant.

362.

DIOSCORIDIS

362.2. Alij phyton, alij caballation, alij splineio,
alij scolymon, Romani linguam canis, aut caninā
appellant.

362.14. Aliqui Zoonychon vocant, alij ætony-
chon, alij cemos, alij damnamenē, alij idiophyton,
nonnulli phytobasilam, aliqui crossion, alij crosso-
phthoon, magi sanguinem crocodili, alij crocome-
rion, Aegyptij daphnænen, Romani minercium,
alij palladium, alij neumatium, alij flammulam.

362.23. Aliqui & id antirrhinō, alijs anarrhi-
non, nonnulli lychnida agriam vocant.

362.29. Nonnulli lychnida agriam appellant.

363.8. Catanance aliquibus damnamete, alijs
dionysias, alijs thyrsio, alijs demos, alijs cemos, alijs
crotion, magis archaras, alijs arcopus, Romanis
herba filicula, alijs datisca, Dacis caropitha dici-
tur.

363.21. Aliqui psychen, alij merida, alij pota-
mogitona, alij stachyiten, Romani calunmarem
nominant.

364.11. Alij callitrichon, alij trichomanes, alij
ebenotrichon, alij argion, alij corion enygron, Ae-
gyptij epier, Romani cinnamalem, alij terra capil-
lum, alij supercilium terra, Daci phithophthethela
vocant.

365.4. Aliqui pterion, alij opteron, Romani ca-
pillarem, alij pinulam, alij fidiculam, nonnulli &
eam adianton appellant.

NOTHA.

365.11. aliqui phasganon, alij antithesion, alij
hascanō, alij choeradolethron, alij & hanc apari-
am nominant, Latini lappam.

365.24. aliquibus sitospelos, alijs siphon, alijs
romos, Romanis auena dicitur.

365.29. aliqui siphonion, alij atrospelon vocāt.

366.28. alijs epapitis, alijs lycanthemon, alijs
cynosbatō, alijs aniceton, alijs heliophiton, alijs ana-
tolicon, alijs dyticon, alijs helide, Aegyptijs lyisthe,
Romanis mergina, Hetruscis radia appellatur.

367.23. alijs hieromyrton, alijs myacātha, alijs
agonon, alijs scincos, alijs mintha, alijs catangelos,
alijs anāgelos, alijs acaron, alijs ocnerō, alijs cinen,
alijs lichene, alijs chamæpitys, alijs chamæmyrte,
Bæotis gyrenia, magis Herculis genitura appellat.

368.10. aliqui idean, alij danaën, alij hippoglo-
ton, alij Zaliā, alij stephanen, alij daphnon, alij
samoithracicen, alij methrion, alij hypoglossion
vocant.

368.19. Daphnoides alipo simile flos vt nym-
phæa, cuius medium nuci cypressi non dissimile, in
quo semen: aliqui chamædaphnen, alij peplion, alij
eupetalon vocant.

369.2. aliqui & hanc alexandrinam appella-
runt, alij daphniten, alij hydragogon, Romanis lau-
reolam, alij laclaginem, Galli vsu bim.

369.11. aliqui ascida vocāt, alij atomon, alij pi-
gatoxarin, magi sanguinem Herculis, alij poly-

DIOSCORIDIS

dos, alij anaphyston, Aegyptij somphia, alij vnre.
Galli laginum, aliqui anepfa.

370.22. aliqui melampodion vocant, alij ecstemon, alij polyrrhizon, alij protion, alij melanorrhizon, alij cyiranion, magi Zomarition, Aegyptij iscam, alij elaphine, alij cemeleg, Latini veratrum nigrum, alij saraca, Daci prodiorna.

372.10. aliqui sesamiten, alij sesamin, alij lycocytalion, alij helleborum album appellant.

372.17. aliqui coronion, alij sesamon syluestre.

372.27. aliqui elaterion vocat, alij grynon, alij balta, alij syncrisin, alij bubalion, alij scopion, alij pherombron, alij peucedanon, alij notion, Romani ancetum, alij agrestem, Pæni cufimezar.

375.15. Satiuus cucumer. Cap. Satiui cucumeris trita radix, & drachmae vnius pondere pota in hydromelite, vomitus ciet. Si quis facile secundum naturam vomere velit, binis obolis sit contentus.

375.16. alij triphyllon, alij stefion, alij astaphida, alij phthiroctonon, alij phthirion, alij apanthropon, alij polyides, alij pseudopathes, alij arsenoten, Aegyptij ibesacden, Romani herbam pediculariam vocat.

376.4. aliqui hypopyon vocat, alij pancranon, alij scammonion, alij thelyterim, Romani ferulaginem, alij ferulam syluestrem, Pæni boeden.

378.17. aliqui lygon, alij lobon appellant.

379.26. aliqui narcisso anydro, alij autogenes, alij bullon emeticon, alij lirion, Romani bulbum morbis

morbatarium dicunt.

380.16. alij hippophyes, alij hippophanes, alij hippion, alij echinion, alij pelecion, Romanilaps paginem vocant.

381.17. aliqui sesamō syluestre vocāt, alij seseli cypriō, alij crotona, Aegyptij systhanna, aliqui trixin, magi sanguine febris, Latini ricinū, alij lupā.

382.5. aliquibus cometes, alijs gobios.

385.8. aliqui clema, alij crambion, alij paralion, alij canopicon vocant.

386.13. aliqui sycen, alij mecona aphroden.

387.5. alij spumosum papauer vocitan.

387.20. aliquibus scamonia radix, alijs colophonia, alijs dactylion, Romanis colophonium, magis appoleumonos, Aegyptijs sanilum dicitur.

389.5. alij chamælea nigra, alij pyros achmen, alij heraction, alij bdelyram, alij coccon gnidion, Romani citocacium, nonnulli oleaginem, quidam olea stellum vocant.

389.16. alij chamæleam, alij pyros achmen, alij cestron, aut cneoron vocant.

390.15. Acten aliqui dendron arctu, alij heme-ron, Latini sambucum, Galli scobiem, Daci sebam vocant.

390.23. alijs heliosacte, alijs agria acte, alijs Euboica, Gallis ducone, Dacis olma.

392. 2. nonnulli ischiada, alij chamabalanum agriam, alij linozostin, Latini radicē syluestrem.

D I O S C O R I D I S

Pœni thorphathsadæ appellant.

392.16. aliquibus colocyntha ægos, alijs sicyapi-
era, alijs alexandrina colocyntha, 7 oroastri thym-
bra, Qsthani autogenes, Romanis cucurbita sylua-
tica, Dacis tutrastra dicitur.

393.8. alijs cedas, Romani inuolucrum vocant.

394.15. alijs ophioſtaphylon, alijs chelidonium,
aut melothrō, aut pſilothron, aut archexōstin, aut
agroſtin, aut cedroſtin appellant.

395.22. alijs chironion ampelon, alijs bucranion
Romani oblameniam, alijs batanutam, alijs betisal-
cam, Daci priadelā, alijs pegrinā, Aphri lauothē.

396.8. Pterin, alijs pteriō, alijs pterineō, alijs dasy-
clonon, alijs anaspchoron, alijs blechnō, alijs polyrrhi-
xon vocāt, magi hermulain. Romani filicem, alijs
laculā, alijs filisfanariā, Aegyptij aſini ſanguinem.

395.23. Thelypterin aliqui nymphæam pterin
nominant, Romani linguam ceruinam.

397.9. Polypodion aliqui scolopendrion, alijs pte-
rin, alijs polyrrhizon, Latini filiculam vocant.

398.2. aliqui pterion, alijs nymphæam pterin no-
minant.

398.21. alijs argyron, alijs aritrilin, alijs chryſi-
tin, Aegyptij aphlopho, Latini mercurialem ma-
ſculam, alijs teſſeculatam, Aphri aſumes.

399.6. aliquibus linoxōſtis, Aphris armas, alijs
aſumes labon dicitur.

399.14. aliqui ſcorpiuron vocāt, alijs heliotro-
pon,

NOTHA.

on, alij dialion, alij heliopon, alij scorpioctonō, alij
samon agrion, alij scorpij vram.

400.4. aliqui scorpiuron vocant.

405.3. Idē adstringit: prodest stomacho qui ci-
lis tenax non est, aut, tardius cibum cōcoquit. Item
ijs qui ilei dolore conflantur: cōuenit in gruida-
rum malacia: sorptum auxiliari constat, cum po-
pulatim grassatur pestifera lues. Huiusmodi om-
phacium non nisi post annos multos bibi potest.

429.17. quam alij Medicinam, alij symphyton,
alij idæum phlomon, alij orestion, alij nectarion
vocant.

448.6. alij larbason, alij gynæcion, alij Chal-
cedonion.

458.20. alij pecton, hephton, aracton, lonchotō.

505.7. Athenis ionia, in Eubœa sideritis dicitur.

De Rhamno.

Rhamnum si quis eruat silente luna, & secum
ferat, contra venena & improbos homines prode-
rit: pecoribus inuandis appenditur: nauigijs circum-
poni solet: valet contra capitis dolores & laruas.

De Artemisia.

Artemisiam herbam si quis teneat, dum iter fa-
cit, lassitudinem discutiet: & si in pedibus ferat, be-
stias & lemures abiget: si sanguis circa artus coa-
luerit, ramulos ex rosaceo in olla feruefacito, &
locum totum oblinito, cum somno indulgendum est:
strangulatus vulua mirum in modum auxiliatur:

DIOSCORIDIS

vrina stillicidia & opisthotonum leuat.

De Pentadactylo.

Pentadactylis si quis circum corpus portet, nullo dolore afficietur: oculos, strumas, callosos tōsillarum tumores, viam, articulos sub lingua, neruorum dolores & dentes, pforam perniciali fame cōtraclam iuuat: remoratos à partu menses eicit: infusa manibus ex aqua tepida contra terrores, fascinum, & laruas, mirum in modum commendatur. Vellito herbam cum luna crescit, oriente sole.

De Verbenaca.

Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appensa doloribus oculorum auxilium tur: contra hebetudines eorundem, & capitis dolorem efficax est, trita ex aceto lassitudinem reficit. Strumas, callosos faucium tumores, statim discutit: febrium horrores sanat, si quis solum ex aduerso stans ramulos tenuerit.

De Dictamno.

Dictamnium siccatum manibus terito, & redigens in farinā adiecta vini stilla, corpus tãgito: siquidē contra omnes serpentium iniurias auxiliatur: vlcera & putrescentes nomas prapurgans explet: adaclis corpori aculeis oblinitur, vt præsenti sit auxilio: ad lienem & in abditis locis vitia inflammatione turgentia, redactum in farinā illinito. Herbam vere, magnis aestibus, autumnusq; eruito.

De Salvia,

Sal

Salua singultum tuſimq; diſcutit: omnibus malis vlceribus cum cera & roſaceo ſumpta auxiliatur: lienis dolorum dyſenteriamq; , pota cum vino albo pari modo ſanat: ſanguinem excreantibus, potu medetur: ad extrahenda vuluæ onera efficax eſt: peſſimæ mulieres peſſum ex ea ſubiiciunt, vt partus excutiant.

De Cupreſſo.

Cupreſſus herba contra raucedines auriculasq; prodeſt: induratos tonſillarum tumores, aquam inter cutem, & coxendicum cruciatus perſanat.

De Centaurio.

Centaurium contra inflammata vitia & pulſantes ietus valet: feminis vuluæ malo laborantibus auxiliatur: ſtillicidiÿ vrinæ, calculorumq; tormenta leuat. Herbam vere oriente ſole legito.

De Buphthalmo.

Buphthalmum creſcente luna legere oportet. Facit autem contra pauores, laruas, & mala medicamenta, ſcinationes. vtpote cum eas auertat. Radicem ſi quis mādāt, dentem expuet, fluxionemq; conſeſtim ſiſtens auxiliatur: qui & ventrem reſoluit.

De Pæonia.

Pæonia herba per æſtus Caniculæ ante Solis ortum vellitur: appenſaque contra venena, faſcinum, pauores & laruas prodeſt: item contra febrē cum horrore venientē, diurnam nocturnamue, & aduerſus tertianā. Proditur lemures à mō-

D I O S C. N O T H A.

te, in quo nascebatur, fugasse.

De Moly herba.

Moly herba si secta radice feratur, veneficiorum
& fascinationis amuletum est.

De Marina quercu.

Marinam quercum cum rosaceo & oleo misce-
to, & faciem illinito cum ad negotia te conferes:
vegetiores reddit pueros, imo ventri appensa & ad
arcendos pauores nocturnos manu teneto. Contra
fascinum, & omnia maleficia prodest: corpus tue-
tur: cum enim fascinantes recedunt, arescentem ra-
mulum occludit, & cum propius accedunt, aperit.

De Chrysanthemo.

Chrysanthemon si terra ante solis ortum erua-
tur, & collo appedatur, veneficas mulieres, omnef-
que fascinantes amolitur.

De Eryfimo.

Erysimon cum vino tritum, aduersus ventris
dolorem hibitur: si quis grana septem domum inie-
cerit, rixæ & iurgia concitabuntur.

De Helleborine.

Helleborine, aliquibus epipactis, alijs boion di-
citur. Frutex est exiguus, minimis folijs constans.
Bibitur contra omne venenum, & iecinoris vitia.

F I N I S.

CVRATIONVM
MORBORVM IN
DIOSCORIDE
contentarum
index.

Abscessuum re-
media,

Mel
Cucurbitæ

Thlaspi

Mentha

Viscum

Bechion, siue tussilago

Pentaphyllon

Buglosson.

Abortum fas-
cientia,

Asparagus

Arifaron

Ampeloleuce

Hedysaron

Populus alba

Oxyacanthos

Coagulum

Brassica sativa

Cyclaminos

Dracunculus duplex

Onosma

Elaterium

Scammonium

Thelypteris

Vinum phthorion, siue
abortivum

Vinum helleborites

Conyza.

Abortus re-
media,

Sabina

Galbanum

Aconito con-
traria,

Balsamum

Morus

Lac schiston

Coagulum

Chamaepitys

Vinum in communi

Scoria, siue recremen-
tum ferri.

Diosc. lib. 6. cap. 7.

Aculeos extra-
hentia.

Vide, spicula corpori
infixa extrahentia.

005

INDEX

- Aculeatorum** Strychmon fatinū siue
ictus remedia. Solanum hortense
Laurus Aegilops
Malua Vua œnanthe
Symbrium Alica.
Anisum **Alarum virus**
Althæa extinguentia.
Oxalme Myrrha
Vinum thymite Myrtus
Adipm medelæ Scolymos, siue Car
Diosc. lib. 2. cap. 68 duus.
Adurentes me- Alamen.
dicinæ. **Algoris reme-**
Buprestis dia.
Cantharides Laurinum oleum
Pityocampæ Ocimum vnguētum
Salamandra. Cinamomum
Aduſtionum Aristolochia tertia
remedia. Abrotonum
Vide, ambuſtorum re- Vinum ſcilliticum
media. Oleomel, vel elgomeli.
Aegilopiæ re- Alij acrimo-
media. niā extinguentia,
Afarum Ruta.
Myrtus **Alopeciæ morbi**
Iuglans remedia.
Oriza Harundo
Malua Iuglans
Plantago Auellane
Myofota, vel myoso- Erinaceus terreſtris
tis altera Hippocampus
Baccharis Ranæ
Anthemis Locuſtæ

C V R A T I V V S.

Adeps	Asarum
Fimum	Crocus
Rhaphanus	Crocomagma
B eta	Cepe
M ilium	Oleum amygdalinum
Sinapi	Oleum cicinum
Cyclaminus	Oleum balaninum
Asphodelus	Oleum cnidium
Batrachion	Olea Aethiopica
Myosotis	Fagus
Nymphæa	Galla
Cynoglosson	Faba Thebaica
Adianton	Siliquæ
Thapsia	Mespilus
Aerugo ferri	Corutis
Sandaracha	Ficus Aegyptia
Halcyonium	Caprificus
Cotes	Cerasia
Cinis vngularum ca/ prinarum	Melimela
Aluū cōturbātia.	Citrea mala
Eruum	Pruna
Orobis	Amygdalæ amaræ
Brassica sativa	Morus
Allium	Ficus
Capparis	Tellinæ
Peplus	Chamæ
Vuæ recentes	Iuncus odoratus
Vinum dulce	Cochleæ terrestres
Aqua maris	Sepiæ
Flos salis.	Silurus
Aluum soluentia	Pisces saxatiles
atq; purgantia.	Lac
	Lac schistum
	Butyrum
	Medulla

INDEX.

Fel	Cestron
Finum	Scordion
Tragus	Chamaepitys
Linum	Androsæmon
Lens	Papauer ceratitis
Phaselus	Vrtica
Rhaphanus	Cynoglosson
Lapathum	Spartum
Nasturtium	Balanus myreplica, fl.
Bruum	ue glans vnguentaria
Bruca	Hippophaës
Scandix	Characias
Lactuca	Linozotis
Cucumis	Lathyrus
Cucurbita	Quercus
Atriplex	Chamaesyce
Brassica sativa	Cici
Brassica marina	Scammonium
Malua	Ampeloleuce
Blitum	Thelypteris
Asparagos	Passum
Porrum	Mellicratum
Cepe	Vinum albanum
Struthion	Vinum lesbium
Zinziber	Coccimela
Cyclaminos	Vinum melitite
Scilla	Thalassomeli
Bulbus esculentus	Vinum absinthite
Agaricum	Vinum helleborite
Aloë	Vinum scammonite
Absinthium seriphium	Rubrica sinopis.
Hyssopum	Aluū sistentia.
Ammoniacum.	Aspalathus
Phyllitis	Mastichinum

C V R A T I V V S.

Laurinum	Seris
Populus nigra	Bromos
Populus pieca	Chondryllæ
Paliurus	Oriza
Oxyacantha	Alica
Cynosbatos	Milium
Cistos	Faba
Rosa	Lens
Acacia	Anethum
Palma	Apium
Palma elate	Aphace
Malum punicum	Smyrnion
Malus	Hippomarathrum
Siliquæ	Acantha
Cotonæ	Aloë
Mala epirotica	Hæma
Pira	Ruta
Mespillus	Anisum
Lotus	Orchis serapias
Cornus	Pæonia
Sorbus	Althæa
Prunæ syriaca	Polygonon mas
Lepus terrestris	Lagopus
Lac	Clematis daphnoides
Caseus	Xyris
Fuligo butyri	Anchusa
Sanguis	Gramen Parnasium
Fimmi	Rubus
Lyncurion	Pentaphyllon
Triticum	Phoenix herba
Brassica sativa	Idæa radix
Hordeum	Oxyschoentis
Plantago	Rubrica sinopis
Crinon	Aizoon

I N D E X

Papauer fatium	Aizoon maiua
Adianton	Arction
Phlomidēs	Alumen
Vuræ	Atramentū scriptoriū
Vinum phalernum	Buccinum
Vinum œnanthe	Beta
Vinum passum	Cypros
Vinum rhoite	Cistos
Vinum myrtite	Coriū vstū, siue veterū
Vinum cedri	calceamentorum
Vinum lauri.	Cynoglossum
Aluinis vtilia.	Cinnabaris
Coagulum	Ebulus
Nymphæa	Fimum
Clymenon	Philomus, siue verba-
Papauer fatium	scum
Omphacomeli.	Gallion
Amatorijs ve-	Hedera
neficijs attribut.	Hypericon
Cyclaminos	Helxine
Catanance.	Lactuca sylvestris
Dorycnion	Lilium
Cotyledon	Myrtus
Mandragoras	Morus
Leontopodion	Malua
Phyteuma.	Narcissus
Ambustorum	Oliuæ colymbades
remedia.	Ouum
Acacia	Picea
Asphodelos	Platanus
Aristolochia	Plantago
Althæa	Sesamum
Ascyron	Stimmi
	Sal
	Thus

CURATIVVS.

Vnguentum felinum

Amphisbænæ
morsus curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 64.

Anginæ reme-
dia.

Acetum

Absinthium

Cyprinum vnguentum

Cedria

Cepe

Crocodilium

Elaterium

Fel animalium

Fimum

Hirundo

Hyssopus

Irinum

Laserpitium

Mel

Oxymel

Spartum siue genista

Sal

Violæ

Piper

Pix

Rhaphanus.

Anhelitus dif-
ficultatis re-
media.

Acarum

Balsamum

Naphtha

Centaurium maius

Baccharis

Peucedanum

Galbannm

Parthenion

Adianton

Ampeloleuce

Et infra in verbo, Or-
thopnoicis.

Animalium fes-
ritas mitigatur.

Oenagra.

Ani remedia.

Vide, Sedis remedia.

Animalia ven-
tris expellen-
tia.

Vi de, Tineas latas pel-
lentia.

Animalia quæ
perimunt.

Diosc. lib. 6. in præ-
fationis fine.

Animaliū ictus
remedia.

Bdellium

Panaces heracleon

Terra lemnia

Diosc. lib. 6. cap. 55.

Animi defectus
remedia.

Cucumis

INDEX

Pulegium

Coris

Animi volupta

tes auget,

Buglosson.

Animi deliquia

generantia.

Diosc. lib. 6. in prefat.

Anodyna.

Hyoscyamus

Aconitū pardaliāches.

Antidotum in-

gredientia.

Acorus

Phu

Amomum

Costum

Iuncus odoratus

Cyphi

Scincus, siue singus

Sanguis

Rapæ fatiuræ

Napum, siue bunias

Brassica fatiua

Piper

Abrotonum

Stichas

Ruta

Caros

Anethum

Petroselinon

Hedysaron

Mandragoras

Rubrica, siue terra le-

mnia.

Apium ictus

remedia.

Laurus

Malua

Sisymbrium

Althæa

Diosc. lib. cap. 57.

Apostematum

remedia.

Vide, Suppurationum

remedia.

Appetitum ge-

nerantia.

Cerasia.

Appetitum in-

citantia.

Vinum in communi

Vinum Selenite.

Aquæ inter cutē

remedia.

Vide, Hydropicorum

Araneis con-

traria.

Morus

Grossi

Melanthion.

Aranei ictus

remedia.

Mullus

C V R A T I V V S.

Mullus piscis Diosc. lib. 6. cap. 19.

Allium **Articulorum**

Melissophyllon morbis vtilia.

Coris Amurca.

Oxychoenus Anethinum

Hyacinthus Agaricum

Aizoon maius. Arction

Argenti viui Bulbus esculentus

curatio. Centaurium minus

Diosc. lib. 6. cap. 18. Cinis vitium

Argematō morbi Helleborus niger

remedia. Scammonium

Fel animalium Mandragoras

Vrina Meon

Lactuca sylvestris Naphtha

Cera Nardus

Argemone Narcissus

Anagallis Ouum

Ocimum Oxymel

Papauer seratitis Palma elate

Lotus sativa. Pentaphyllon

Aquatorum Psyllium

remedia. Ruta

Onos, siue millepeda Thapsia

Asparagus Thymoxalme

Cyclaminos Vua passa

Spondylion Vinum melitite.

Oenanthe **Arterię remedia.**

Buphthalmos Irinum

Chrysanthemon Myrrha

Vinum absinthite. Thus

Arsenici, siue au- Caryotæ, siue caryo-

ripigmenti curatio. tides.

P p

INDEX

Ficus	Lentiscus
Sinapi	Terebinthus
Prason, id est porrum	Fuligo picis
Glycyrrhiza	Cypressus
Triticum	Iuniperus
Rhaphanus	Vlmus.
Laserpitium	Palmarum
Pentaphyllon	Cyprus
Vua passa	Lilia
Rhodomeli	Cistos
Tragacantha.	Hypocistis
Aspidum mor-	Cidonia
sus remedia.	Rosa
Cimices lecti	Acacia
Butyron	Salix
Clematis	Vitex
Daphnoides	Olea sylvestris
Aqua maris	Quercus
Diosc. lib. 6. cap. 70.	Castanea
Astrictoriae me-	Gallia
dicinae.	Thus
Aspalathus	Palma
Bryon	Palma elate
Crocus	Malicorium
Oleum omphacinum	Myrtus
Oleum ex oleastro	Myrtidanum
Myrrha	Malus
Vnguentum melinum	Cotonea
Vnguentum cœnanthi-	Persica
num	Pira
Cortex thuris	Pira sylvestria
Picea ac pinus	Mespilus
Pityides	Mespilus alia
	Cornus

C V R A T I V V S.

Morus	Vitis syluestris
Lixiua ex ficu	Nuclei acinorum
Ionia sine Cionia	Vua oenanthæ
Adeps	Omphacium
Adipum medicinæ	Passum
Faba Aegyptia	Vinum omphacites
Lens	Vinum nigrum è la-
Portulaca	brusca
Seris	Vinum cydonites
Porrum	Omphacomeli
Hedera	Vinum apijtes
Miosotis	Vinum myrtites
Agaricum	Vinum palmeum
Rhaponticum	Vinum è cedro
Gentiana	Vinum pilsite
Abfinthium	Vinum abfinthite
Abfinthium seriphium	Vinum tragoriganite
Mentha	Vinum prasite
Melilotus	Vinum calaminthe
Maron	Vinum aromatite
Ruta	Spuma argenti
Cyminum satium	Chysocolla
Hieracium maius	Cinnabaris
Conyze tertiū genus	Calcanthon
Lyfimachium	Diphryges
Clymenos	Arsenicum
Anchusa	Sal
Idæa radix	Fex vini
Granum tinctorum	Spongiæ
Chrysocome	Lapis phrygius
Aizoon maius	Apis Asius
Phlomides	Lapis scissilis
Lotus syluestris	Terra eretria
Ebulus	Lapis samius

Pp 2

INDEX

Fuligo pictoria.	Cornix
Assulas fixas	Cucurbita.
corporibus extra-	Cepe
hentes.	Capparis.
Cochleæ terrestres.	Cucumis anguinus.
Attonitis vtilia.	Daphnides
Ampeloleuce.	Dracunculus maior.
Auruginem tol-	Ficus.
lentia.	Fel animalium.
Lycium.	Faba Aegyptia.
Agaricum.	Flos æris.
Libanotis coronaria.	Flos salis.
Auricularum	Hedera.
remedia.	Helxine.
Bulbus esculentus.	Irinum vnguentum.
Auriū medicine.	Hyssopus.
Cannabis sativa.	Laurinum.
Araneus.	Lycium.
Adipum medicine.	Lapation.
Asphodelus.	Malum punicum.
Abſinthium.	Myrtus.
Anisum.	Mel.
Aparine.	Myosotis.
Aqua maris.	Mentha.
Acetum.	Melilotus.
Acetum ſcilliticum.	Myrrha.
Alumen.	Oleum amygdalinum.
Aphronitrum.	Oleum balaninum.
Blattæ.	Oleum hyoscyaminū.
Beta.	Olea ſylueſtris.
Crocus.	Onos.
Ciſtos.	Origanum.
	Omphacium.
	Pix.

CVRATIVVS.

Populus alba
Plantago
Porrum
Peucedanus
Prasion
Polygonon mas
Papauer satium
Psyllium
Rhus obsoniorum
Rosa
Salix
Senecta serpentis
Sesamum
Sinapi
Spondylium
Stoebe
Strychnum satium
Sulphur
Thus cum pice
Terebinthina
Vermes
Vrina
Vinum myrteum, siue
myrsinite
Vinum cedrites.

BDELLARVM,
siue hirudinum
curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 32.

Bestias fugantia.

A cantha leuce, siue spi
na alba.

Bestiarum ve
nenatarū remedia.

Balsamum

Bestiarum mor
sus remedia.

Helenium Aegyptium

Sanguis

Porrum

Allium

Argemone

Eryngium

Pulegium

Apium

Vinum cedrite

Sal

Terra Samia.

Bilem adgene
rantia.

Iuglans.

Bilem purgātia.

Agrioraphanus

Androsæmos

Anchusa

Apios

Brassica canina

Calamintha

Clematis

Cici

Cucumis anguinus

Characias

Chamaelea

Helleborum nigrum

Pp 3

INDEX

Blaterium	Vide, gutturis reme- dia.
Ebulus	Buprestis veneni remedia.
Epithymum	Lac schiston.
Empetron	Dioscorides libro 6. cap. 23.
Helenium	CACHEXIAE, id est maciei re- media.
Hippophaës	Aqua maris.
Heliotropium	Cacoetæ reme- dia.
Iris illyrica	Vnguentum rosaceum
Lychnis sylvestris	Crocinum
Lathyris	Thus
Linozostis	Glandes
Malus	Ficus
Melanthion	Cicer
Mentha	Plantago
Mandragoras	Dracunculus maior
Ocimum	Dracunculus minor
Parthenion	Hedera
Peplos	Viscum
Scammonia	Asclepias
Thlaspi	Psyllium
Thapsia	Vrtica
Thymelæa	Petalites
Vitis sativa	Cadmia
Vnguentum susinum id est, lilij.	Diphryges
Blattas in se con- trahentia.	Flos salis.
Phlomides.	Calcis curatio.
Boum scabiem emendantia.	Diosc. 6, cap. 29.
Cedria	
Bronchocelas discutientia.	

C V R A T I V V S.

Calculi reme- dia.

Cyperus
Cardamomum
Oleum amygdalinum
Cerasia
Amygdalus amara
Osisifragus
Vrina
Sium
Struthion
Centaurium maius
Bdellium
Daphnides
Paliurus
Pruna
Fimum
Lapathon
Sisymbrium
Ononis
Cuminum sylvestre
Artemisia
Hippomarathon
Asplenon
vnthemis
Parthenion
Paeonia
Lithosperma
Athæa
Tribulum
Saxifragum
Gramen
Traion

Acanthus
Cotyledon prima
Vitis sativa
Myrtus sylvestris
Oxalme
Lapis Iudaicus
Ochra
Lapides spongiarum

Calefactoriæ medicinæ.

Adipum medicinæ
Medullæ animalium
Fel
Cera
Propolis
Triticum
Raphanus
Raphanus agria
Sisymbrium
Sisymbrium aquaticum
Sinapi
Nasturtium
Thlaspi
Erysimum
Piper
Zingiber
Dracunculus maior
Dracunculus minor
Asphodelus
Aulbus esculentus
Agaricum
Gentiana
Anonis, sive Ononis

I N D E X

Eryngion	Myrrha Boeotica
Abſinthium	Styrax
Abſinthium ſeriphiū	Edellium
Hyſſopum	Thus
Origanum	Terebinthus
Tragoriganum	Reſina
Pulegium	Palimpiffa
Mentha	Iuniperus
Serpyllum	Sabina Cedria
Sampſuchum	Cedrides
Maron	Laurus
Aſpalathus	Daphnides
Crocomagma	Cyprus
Helenium	Ciſtos alia
Oleum vulgare	Vitex
Oleum ſicyonium	Amygdalæ amaræ
Strigmēta gymnasto-	Ficus
rum & palæſtrarum	Lixiuiā ex ficu
Elæomeli	Ciſſeris
Laurinum	Cochleæ terreſtres
Sampſuchinum	Fiber
Ociminum	Bupreſtis pityocampa
Anethinum	Salamandra
Suſinum	Oeſypus
Cyprinum, ſiue ligu-	Panaces heraclion, ſi-
ſtrinum	ue Herculeum
Irinum	Liguttiſicum
Gleucinum	Sefeli Maſſilienſe
Amaracinum	Sifon
Metopium	Aniſum
Staſte	Caros
Nardinum	Anethum
Malabathrinum	Cyminum ſatiuum
Myrrha	Ainmi

C V R A T I V V S.

Oreoselinum	Lana succida.
Smyrnion	Caliginis oculorum remedia.
Hippomarathrum	
Daucus.	Fel animalium
Libanotis.	Lactuca sylvestris
Laserpitium	Ocimum Cepe
Galbanum	Dracunculus maior
Ammoniacum	Sinapi
Stachys	Nasturtium
Scordion	Erysimon Piper
Artemisia	Zinziber
Anthemis	Dracunculus minor
Chrysocome	Anagallis
Portulaca agrestis	Chelidonium maius
Lotus sylvestris	Sagapenon
Vinum picatum	Chamaedrys
Vinum in communi	Chamaesyce
Aqua maris	Flos æris
Vinum è cedreo, arboribusq; alijs	Pumex
Vinum è cypresso	Fæx vini
Vinum cedrite	Lapis thyites.
Vinum chamaedryite	Callorum remedia.
Aerugo aurificum	Triticum
Chrysocolla	Laserpitium
Calcanthon	Chalcitis lapis.
Alumen	Cancrescentibus ulceribus medetur.
Sulphur	Vrtica.
Flos salis	Canes occidentia.
Pyrites	
Lapis hæmatites.	
Calefactorum remedia.	

I N D E X

Asparagus	Canis non rabidi
Apocynon.	morsus remedia.
Canis rabiem	Amygdalæ amaræ
fanat.	Iuglans
Alyssum.	Ficus
Canis rabiosi	Mituli
morsus remed ^a .	Gobius
Lycium	Cucumis
Caucri	Bulbus esculentus
Cinis vitium	Mentha
Garum	Ebulus.
Omotorichos	Canis impetum
Smaris	cohibentia.
Iecur ardens canis	Iecur & dens canis.
Triticum	Canis necantia.
Sanguis	Chamaeleon albus.
Mel	Canum scabiem
Grossi	emendantia.
Panaces heracleon	Oleum lentiscinum
Cepe	Cedria.
Laserpitium	Cantharides
Vripa	fugantia.
Aster atticus	Vnguentum melinum.
Melissophyllon	Cantharidum
Vrtica	veneni reme-
Cynoglosson	dia.
Foeniculum	Lac schiston
Ballote	Adipum medicinæ
Oxalme	Diosc. lib. 6. cap. 1.
Aphronitrum, siue spu	Capillorū deflu-
ma nitri.	uium reprimentia.
Diosc. lib. 6. cap. 37.	
Herm. Corol. cap. 212	

C V R A T I V V S.

Oleum ex oleastro

Myrrha

Cistos alia, siue ladanū

Myrtus

Brassica satiua

Nasturtium

Aloë

Adiantum.

Capillum deni-
grantia.

Cupressus

Fagus

Ilex

Palma elate

Myrtus

Hedera

Eleisphacos

Rubus

Vinum myrtite.

Capillum ruf-
fania.

Cyprus

Lycium

Lotus

Fæx vini.

Capillū flauū
reddentia.

Aqua maris.

Capillum pur-
gantia.

Fœnumgræcum

Linum.

Capillos tin-
gentia.

Acacia

Myrtus

Morus

Stratiotes terrestris

Ebulus

Terra ampelites.

Capillos nus-
trientia.

Iuglans.

Capitis vlcerū
remedia.

Balsamum

Oleum ex oleastro

Oleum amygdalinum

Vnguentum rosaceum

Telinum

Narcissinum

Myrrha

Thus

Vrina

Fœnogræcum

Cicer

Linum

Malua

Allium

Cyclaminos

Bulbus esculentus

Melilotus

Lilium

Bettonica, siue Britan-
nica.

INDEX

Xyris
 Rubus
 Rubus Idæus
 Oxalme
 Vinum myrsinite
 Sal.

Capitis doloris remedia.

Iris Illyrica
 Asarum
 Meon, siue meu
 Oleum oleastri
 Oleum amygdalinum
 Vnguentum rosaceum
 Narcissinum
 Cyprus
 Rosæ
 Vitex
 Amygdalæ amaræ
 Torpedo
 Lac humanum
 Lana succida
 Curmi
 Sisymbrium
 Sefamum
 Hedera
 Portulaca
 Aloë
 Mentha
 Serpyllum
 Baccharis
 Ruta
 Anisum

Spondylion
 Peucedanum
 Melanthion
 Coniza maior
 Anagyris
 Bettonica
 Radix hederæ
 Oxychoenos
 Psyllium
 Papauer rhoëa, siue er-
 raticum
 Strychnon, siue solanū
 satium
 Aizoon maius
 Hippoglosson
 Chamædaphne
 Myrtus sylvestris
 Elaterium
 Scammonium
 Vitis sativa
 Vinum
 Vua oenanthe
 Aqua maris
 Acetum scillite
 Lapis ophites.

Capitis dolorem facientia.

Styrax
 Oliuæ
 Glandes
 Palma
 Arbutus
 Iuglans

C V R A T I V V S.

Eruium	Lasertpitium
Abfintium	Olea fylueftris.
Ferula	Pix
Meu fiue meon	Plantago
Peucedanus	Panaces heracleon.
Mandragora	Sabina
Vinum gypfatum	Vua paffa.
Vinum phoenicite.	Cardiacorum
Vinum rhetini te	remedia.
Vinum mefagite.	Bupreffis.
Caput purgan-	Seris.
tia.	Rubus.
Anemone	Carnem tene-
Brassica fatiua	riorē reddentia.
Beta	Vrtica fiue acalyphe.
Cepe	Carnem coale-
Chelidonium minus	fcere facien-
Calcanthum	tia.
Cyclaminos	Lixiuiā ficus
Origanum.	Symphyton.
Carbunculorum	Carnes super
medicinæ.	uacuas compe-
Brassica fatiua.	fcientia.
Cupreffus	Characias
Cinnamomum	Cadmia
Cyprus	Aes vftum.
Coriandrum	Flos æris
Characias	Lasertpitium.
Eruium	Lana vfta
Finum	Lapis Afius
Iuglans	Spuma argenti
Lupinum fatium	Smaris.
Nafturtium	

INDEX

<p>Carcinomatū remedia.</p> <p>Fuligo thuris Buprestis Cicer Erysimon Dracunculus maior Dracunculus minor Aristolochia tertia Vrtica Galiopsis.</p> <p>Caseus ne cariē sentiat.</p> <p>Dracunculus minor. Caua implentia. Cadma Promphilyx Cerussa Lapis schistos Lapis morochthus Terra samia Fuligo thuris Aristolochia tertia.</p> <p>Cepæ arimonīā retundit.</p> <p>Ruta.</p> <p>Cerastræ ictus remedia.</p> <p>Cedria, siue cedrinus liquor</p> <p>Harundo Rosa</p>	<p>Sal Dioscor. lib. 6. cap. 55. & 69.</p> <p>Cerussæ curatio. Diosc. lib. 6. cap. 22.</p> <p>Cerionum vlce- rum remedia.</p> <p>Grossi Pepo Quere, Fauos rumpent, tia.</p> <p>Ceruicis rigoris medicinæ.</p> <p>Vide, Opisthotonico, rum remedia.</p> <p>Chironiorū vl- cerum reme- dia.</p> <p>Plantago Ampelocoece.</p> <p>Cholericis vti- lia.</p> <p>Cotonea mala. Calamintha Ferrum Mentha Polygonon mas.</p> <p>Cicatricum re- remedia.</p> <p>Anemone Aloë Adeps Bulbus esculentus</p>
---	--

CV R A T I V V S.

Balanus myrepfica

Cistos

Centaurium

Chamaesyce

Calx viua

Corallium

Aes vstum

Aeris flos

Aerugo aurificum

Fuligo butyri

Faba Fex vini

Oleum myrtinum

Oleum balaninum

Oleum cicinum

Olea æthiopica

Peucedanum

Plumbum elotum

Pumex

Scoria argenti.

Cicutæ cōtraria.

Passum & vinum

Vinum in communi

Acorum

Hermo. Cor. cap. 17.

Cimices fugan-
tia & necantia.

Hermo. Cor. cap. 366.
& 306.

Clauorum re-
media.

Smaris

Fimum

Laserpitium

Coeliacorum

remedia.

Myrrha

Hypocistis

Licium

Olea syluestris

Quercus aut robur

Galla Thus

Myrtus

Cotonea Morus

Lixiua ex ficu

Ceruinum cornu

Faba Aegyptia

Lapathon

Plantago

Coronopus

Rhaponticum

Acantha leuce, siue spi-
na alba

Ferula

Laserpitium

Tragos herba

Papauer satium

Vinacei

Nuclei vinaceorum

Elæomeli

Vinumphœnicite

Vinum rheniite

Ferrum

Lapis morochthus.

Colli remedia.

Colocynthis

Fimum

INDEX

Galerita
Mel
Petroselinum
Ruta
Sesamum
Talus suis.

Colorem com- mendantia.

Acetum scillite
Bupthalmos
Cerussa
Cuminum satium
Laserpitium
Mastichinum
Vnguentum rosaceum
Vinum
Vinum aromatite.

Collectionum remedia.

Amomum
Vnguentum telinum
Zopissa
Naphtha
Myrica
Paliurus
Cyprus
Olea sylvestris
Glandes
Morus
Grossi
Ouum
Triticum
Hordeum

Foenogracum
Linum
Cicer
Agrioraphanus
Plantago
Sonchos
Nasturtium
Bulbus esculentus
Argemone altera
Rhaponticum
Acantha leuce
Thymus
Coriandrum
Smyrnum
Libanotis
Viscum
Parthenion
Cannabis syluatica
Anagyris syluatica
Helxine
Pentaphyllon
Peristerion supinus
Papauer satium
Stratiotes aquaticus
Cytisus
Ampelos leuce
Vinum in communi
Vinum adynamon
Vinum cydonite.

Comitalis mor- bi remedia.

Cardamomum
Balsamum

Naphtha

C V R A T I V V S.

Naphtha		Helleborum nigrum
Populus nigra		Hippophœston
Ficus		Ampelos leuce
Iuncus odoratus		Ampelos melæna
Lepus terrestris		Oxymel
Mustella	Iecur	Acetum scillite
Vnguis asini		Lapis selenites
Lichen equi		Lapis aëtites
Iecur hirci		Cotes.
Hirundines		Conceptioni
Serum		contraria.
Lac humanum		Epimedium
Coagulum	Fel	Heliotropium maius
Sanguis		Aerugo ferri
Fimum		Alumen
Plantago		Lapis ostracites
Bryngion		Herm. Cor. cap. 277.
Ruta		Conceptionem
Seseli Mafsiliense		facilitantia.
Libanotis		Coagulum
Spondylion		Lolium
Peucedanum		Staphylinos agrios
Laserpitium		Lapis famius.
Galbanum		Concoctioni
Sagapenum		vtilia.
Ammoniacum		Anethum
Trifolium		Althæa
Conyza		Acetum scillite
Anthyllis		Balsamum
Symphyton		Crocus
Cestron		Crocomagma
Pentaphyllon		Caros
Papauer aphrodeles		Cestron
Viola purpurea		

INDEX

Calx viua	Lixiua à fici
Bruca	Fimum
Ligusticum	Dracunculus maior
Pulegium	Dracunculus minor
Papauer satium	Asphodelus
Resina	Capparis
Styrax	Argemone
Seseli Malsiliense	Rhaponticum
Sulphur	Gentiana
Vinum	Aristolochia tertia
Vinum resinatum	Centaurium maius
Vinum absinthite	Acantha leuce
Vinum tragoriganite	Abrotonum
Constrictoriae	Origanum
medicinae.	Pulegium
Vide, Adstrictoriae me-	Calamintha
dicinae.	Serpyllum
Conuulsionis	Baccharis
remedia.	Panaces heracleon
Iris Illyrica	Libanotis
Acorus	Peucedanum
Cardamomum	Laserpitium
Asarum	Sagapenon
Costus	Galbanum
Iuncus odoratus	Clinopodium
Balsamum	Chamaedrys
Helenium	Alisma
Calamus odoratus	Cestron
Sampuchinum	Xyris
Metopium	Symphytum
Bdellium	Psyllium
Iuniperus	Phlomis
Cedrides	Ampeloleuce
Halimos	Vinum scilliticum

CVRATIVVS.

Vinum chamædryte

Vinum tragoriganite

Vinum daucites

Vinum panacite.

Condylomatum

remedia.

Strigmenta à balneis

Myrteum

Myrtus

Cotonea

Ouum

Aloë

Anethum

Libanotis

Ballote

Stachys

Phalangion

Pentaphyllon

Vitis sativa

Ferrum

Plumbum elotum

Sandaracha.

Cordis tremoris

medicinæ.

Nardi spica.

Coriandro con

traria.

Vinum in comuni

Diosc. lib. 6. cap. 9.

Corpora defun

cta à corruptione

diu tuetur.

Cedria.

Corpus macres

scientia.

Canchamum.

Coxæ doloris

remedia.

Strigmenta à palestris.

Coxendicum

doloris remedia.

Asparagus

Agaricus

Althæa

Abrotonum

Aster Atticus

Acetum scilliticum

Centaurium minus

Calamintha

Coris

Cestron

Cucumis sylvestris

Erysimon

Euphorbium

Finum

Garus

Helenium

Ammoniacum

Hypericon

Hiberis

Heliochrysos

Iris Illyrica

Lolium

Lupinum sativum

Laserpitium

Naphtha

Onos

Populus alba

Q q 2

INDEX

Panaces heracleon
Peucedanum
Pentaphyllon
Ruta
Scammonium
Vinum asarite
Xyris.

Crassitudinem
extenuantia.

Porrum
Staphis agria.

Croceum colo-
rem facit.

Rhaponticum.

Cruditatis re-
media.

Balsamum
Strigmenta à balneis
Gentiana
Vinum scilliticum.

Cruetas gene-
rat.

Lana vsta.

Culices fugan-
tia.

Cupressus
Conyza
Ebulus
Absinthium
Hiberis
Plumbum vstum.

Cutē albicantia, Lac.

Rapum sylvestre.

Cutem erugātia.

Oleum amygdalinum

Styrax.

Cutem lenientia.

Amygdala amara

Oleum sicyonium

Vnguentum telinum

Succus Peponis

Terra Chia.

Cutis vitia tol-
lentia.

Adarce

Ampelos leuce

Amygdalæ amaræ

Cochleæ terrestres

Costus

Chamaeleon niger

Iris Illyrica

Lac

Ficus

Linum

Lupinus

Lotus sylvestris

Mel ponticum

Oleum raphaninum

Picea

Sanguis leporis

Spuma argenti.

Cutis pruritus
remedia.

C V R A T I V V S

DENTIVM do-
loris remedia.

Amurca
Halicacabus
Asparagus
Allium
Anagallis
Aristolochia
Acantha leuce
Absinthium
Arction
Acetum
Acetum scilite
Alumen
Batrachion
Cedria
Cytinus
Cochlex terrestres
Capparis
Chelidonium maius
Chamaeleon niger
Clematis daphnoides
Cucumis anguinus,
siue syluestris
Characias
Colocynthis
Ephemeron
Helleborus niger
Ficus Galba
Galbanum
Hedera
Hyoscyamus
Hyssopus
Laserpitium

Leucacantha
Myrica
Morus
Melanthion
Melissophyllon
Naphtha
Olea æthiopica
Picea
Plantago
Panaces heracleon
Pyrethrum
Peucedanum
Pentaphyllon
Rhus
Ranæ
Sepiæ
Senecta serpentis
Strychnon hypnotico,
siue somniferum.
Vnguentum rosaceum
Vermes terreni.

**Dentiū stupo-
ris remedia.**

Portulaca.

**Dentitioni in-
fantium vtilia.**

Leporis cerebrum
Butyrum cum melle.

Dentifricia.

Purpura
Buccinum
Cerninum cornu
Halcyonium

Q. 93

I N D E X

<p>Corallium.</p> <p>Dentibus stuporem adferentia.</p> <p>Cadmia.</p> <p>Dentes firmantia.</p> <p>Lentiscus</p> <p>Oliuæ colymbades</p> <p>Myrrha</p> <p>Oleum omphacinum.</p> <p>Dentes albicare facit.</p> <p>Halcyonium.</p> <p>Dentes vitiatos extrahentia.</p> <p>Amurca</p> <p>Oleum oleastri</p> <p>Dentes mouentia.</p> <p>Oleum oleastri.</p> <p>Depiles facientia.</p> <p>Scolopendria</p> <p>Characias.</p> <p>Desquamatis utilia.</p> <p>Strigmenta gymnastorum</p> <p>Lana succida.</p> <p>Destillationes coercentia.</p> <p>Iritum</p> <p>Styrax</p> <p>Naphtha</p>	<p>Et in verbo, Pituitæ de stillationis remedia.</p> <p>Dilachrymationes emendantia.</p> <p>Picea</p> <p>Pinus.</p> <p>Discussoriæ medicinæ.</p> <p>Androsæmon</p> <p>Althæa</p> <p>Viscum</p> <p>Galbanum</p> <p>Ammoniacum</p> <p>Lapis Gagates.</p> <p>Dolorum inuentariorum remedia.</p> <p>Sinapi</p> <p>Lana succida</p> <p>Ligusticum.</p> <p>Dolores lateris.</p> <p>Vide, laterum dolores.</p> <p>Dolorem ne sentiant qui vrendi se candivē sunt.</p> <p>Mandragoras</p> <p>Lapis memphites.</p> <p>Dorycnij curatio</p> <p>Diosc. lib. 6, cap. 6.</p> <p>Draconis maris ni morsus.</p> <p>Mullus piscis</p>
---	---

CURATIVVS.

Vrina
Ocimum
Absinthium
Plumbum elotū & cre
matum
Sulphur
Diosc. lib. 6. cap. 61.

Dryini morsus
curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 65.

Duritiem emol-
lientia.

Amaracinūvnguentum
Bdellium
Buphthalmos
Cyprinum
Capparis
Erysimon
Aegilops
Ficus
Fimum
Glans
Galiopsis
Hydropiper
Ammoniacum
Lens
Linum
Lapis alabastrites
Megalium
Melanthion
Mandragoras
Porrum
Panaces heracleon

Pentaphyllon
Paronychia
Pyrites
Styrax
Sanguis
Smyrnion
Terra cimolia
Vinacei.

Dysentericorum
remedia.

Adipum medicinae
Asparagus
Argemone
Agaricum
Althæa Alcea
Alisma
Aizoon maius
Butyrum
Cupressus
Cotonea
Cornu
Cervinum cornu
Coagulum
Cera
Clematis daphnoides
Elatine
Eupatorium
Fœnogræcum
Faba Aegyptia
Ferrum
Galla
Omphacium
Hypocistis

Q 4

INDEX

Hedera
Hippuris
Lentiscus
Lycium
Lotus
Lixiuia ex ficu
Lac schliston
Linum
Lapathum
Lyfimachia
Myrrha
Macer
Malum punicum
Melissophyllum
Naphtha
Nymphæa
Nuclei acinorum
Oriza
Omphacium
Oxalme
Portulaca
Plantago
Phyllitis
Polemonium
Pentaphyllon
Papauer ceratitís, siue
 corniculare
Quercus
Rubrica, siue terra le-
 mnia
Silurus
Sanguis
Sium
Scordium

Symphitum
Stœbe
Sideritis achillea
Salugo
Tragion
Vitis satiuā, siue vini-
 fera
Vinacei
Vinum cydonite
Et in verbo, Intestino-
 rum remedia.
EBRIETATI
 vtilia
Amygdalus amara
Brassica satiuā
Absinthium.
 Elephantia re-
 media.
Cedria
Erinaceus terrestris
Serum
Fel animalium
Zythum
Plantago
Calamintha.
 Elephantias gi-
 gnentia.
Vinum sicyste.
Emollientes me-
 dicinæ.
Adipum medicinæ.
Bdellium
Cinamomum

C V R A T I V V S.

Cyrtos
 Cistos
 Cera
 Cerussa
 Calcanthum
 Calx viua
 Oelypus
 Fœnogræcum
 Gleucinum
 Ammoniacum
 Irinum
 Laurus
 Lana succida
 Linum
 Lapis Gagates
 Metopium
 Myrrha Bœotica
 Medullæ animalium
 Naphtha
 Palimpissa
 Panaces heracleon
 Psyllon
 Plumbum elotum
 Resina
 Styrax
 Viscum.
 Enterocelæ re-
 media.
 Hippuris, siue equise-
 tum.
 Ephelidis vti-
 lia.
 Balanus myrepica

Cici.
 Epinietydis mor-
 bi remedia.
 Olea syluestris
 Myrtus
 Amygdalæ amaræ
 Grossi
 Fimum
 Brassica satiuæ
 Plantago
 Cucumis
 Porrum
 Absinthium
 Coriandrū cum melle
 passa; vua
 Viscum
 Heliotropium maius
 Vua passa.
 Epiphoræ reme-
 dia.
 Asarum
 Malobathrum
 Cotonea
 Crimnon
 Coriandrum
 Liliū
 Ambrosia
 Vua passa
 Terra samia.
 Erucis pinorum
 conuenit
 Vnguentum melium
 Dioc, lib. 8. cap. 2.

I N D E X

Eruptionum re- media.

Serum
Lupinum satium
Beta
Portulaca
Pentaphyllon
Balanus myreplica
Vinum myrsinite
Alumen.

Excreationis cras- sæ pectoris reme- dia.

Pix liquida
Dracunculus minor
Tordylon.

Ex crescentia de- primentia.

Alumen
Cerussa
Cinis vitis
Diphryges
Erinaceus marinus
Lapis
Ochra
Pumex
Pyrites
Scordion
Spuma argenti
Sal.

Extenuatoriæ medicinæ.

Artemisia
Anthemis
Iris Illyrica
Hyssopus
Lapis hæmatites
Pulegium
Panaces heracleon.

Extractoriæ me- dicinæ.

Galbanum
Viscum
Thapsia
Scoria argenti.

FACIES ne à so- le adulatur

Ouum.

Faciei vitia auge- rentia.

Ampelos agria
Halcyonium
Adarces
Brassica sativa
Bulbus esculentus
Balanus myreplica
Cinnamomum
Cochleæ terrestris
Cyclaminos
Eruium
Ficus
Hedera
Iris Illyrica
Lepus
Lilium

C V R A T I V V S.

Lotus syluestris	Lac
Mastichinum	Laserpitium
Mel sardoum	Mel
Oleum amygdalinum	Papauer satiuum
Oleum raphaninum	Styrax.
Pepo	Fauces asperas
Folygonaton	facientia.
Spuma argenti	Characias
Sisymbrium aquaticum	Cimolia terra.
Thapsia.	Febribus con-
Faciei rugas au-	traria.
ferentia.	Mala punica.
Cacalia.	Febrifugia.
Fastidium gene-	Centaurium minus
uerantia	Conyza.
Vinum catorchite	Febriū remedia.
Diosc. 6. in præfat.	Agaricum
Fatigationum	Aristolochia tertia
remedia.	Anthemis
Adeps.	Anchusa
Fauos rūpentia.	Aphronitrum
Eruum	Balsamum
Vua passa	Buglossum
Peponis radix	Costus
Grossi.	Cucurbita
Faucium morbi	Clymenon
remedia.	Fœniculus
Acetum	Hypericon
Acetum scillite	Hyoscyamus
Cacalia	Heliotropium maius
Aethiopsis	Lac humanum
Ficus	Lagopus

I N D E X

Myrrha
 Ouum
 Oleum sicyonium
 Portulaca
 Piper
 Panaces heracleon
 Polygonon mas
 Pentaphyllon
 Peristerion supinus
 Rhaponticum
 Ruta
 Smyrnion
 Sagapenon
 Saxifraga
 Trifolium
 Vinum mellitite
 Vinum rhoite
 Vinum hyssopite.

Febris quartanæ
 remedia.

Araneus
 Buglosson
 Cimices lecti
 Dipfacum
 Hypericon
 Heliotropion maius
 Pentaphyllon
 Verbenaca supina
 Trifolium
 Ruta.

Felle suffusis
 vtilia.

Adiantum

Vinum asarite
Fellei humoris
 remedia.

Absinthium
 Centaureum minus.
Feritatem anima-
 liū mitigantia.

Oenagra.
Ferruminandi
 vim habentia.

Spuma argenti
 Rubrica sinopis
 Spongia
 Lapis morochthus.

Vux
Filium masculū
 generantia.

Phyllon
 Orchis
 Crataegonos.

Fistularum res
 media.

Adeps
 Arisaron
 Cinnamomum
 Characias
 Chalcites lapis
 Dracunculus minor
 Dipfacus
 Helleborum nigrum
 Orchis Serapias
 Omphacinum
 Papyrus

C V R V A T I V S.

Plantago
Pentaphyllon
Stratiotes terrestris.

Flatus discuti-
entia.

Cinnamomum
Ocimum

Vinum stichadite.

Flatum adgene-
rantia.

Malus
Rythum
Phaseolus.

Fluxionum re-
media.

Fuligo butyri
Erysimon
Lichen in petris
Ocimum
Portulaca

Pepo
Squama æris
Papauer[is] satium

Acantha
Arabica
Chium vinum

Acetum
Ebenus
Licium
Lixiuia ex ficu

Vinum rhoite
Vinum terebinthinum
Vinnm pissite

Vinum melapsinthium.

Fœtus necantia.

Vide, Partus necantia.

Fœminas steris
lescentia.

Lepus terrestris
Hedera.

Formicę morbi
remedia.

Cicer

Characias
Chamæsyce
Batrachion

Dipsacum
Heliotropium maius

Lacerta

Ruta

Thus

Vitis sativa.

Fracturæ res
media.

Fuligo pictoria.

Fungorū venenas
torū remedia.

Verbenaca

Fimum

Mel

Rhaphanus

Absinthium

Melissophyllon

Fungi

Vinum in communi

INDEX

Acetum
Calcanthum
Sal
Pyrorum ligni cinis
Aphronitrum
Cinis vitium
Lapis Aſius
Dioſc. lib. 6. cap. 23.
Furunculorum
remedia.
Ficus
Groſſi
Triticum
Rhaphanus
Aſphodelus
Galbanum
Pycnocomum
Sal
Aphronitrum.
Furfures tollētia.
Allium
Adiantum
Alumen
Fœnogræcum
Fel animalium
Groſſi
Linum
Lilium
Myrtus
Malua
Oleum oleaſtri
Oleum amygdalinum
Oleum myrtinum

Oxalme
Olea
Salix
Vnguentum melinum
Vnguentum telinum
Vrina
Vinum myrsinite
Allium
Beta.
GANGRAENAE
morbi remedia.
Ampelos leuce
Brassica ſſtiua
Bulbus eſculentus
Cinnamomum
Characias
Galiopsis
Iuglans
Lixiua è ficu
Lilium
Lens
Lupinum ſatiuum
Laſerpitum
Rhus
Rhaphanus
Vrtica
Vua paſſa.
Genitalium mor-
bi remedia.
Asparagus
Amurca
Aloë
Aſter atticus

C V R A T I V V S.

Cyprinum

Cotyledon

Fœnogræcum

Flos salis

Linum

Malum punicum

Polygonon

Sampſuchinum

Vinum terebinthinū.

Genitalium vis
rus extingue-
tia,

Alumen.

Genarum mor-
bi remedia,

Aloë

Aerugo aurificum

Aerugo ferri

Ammoniacum

Lapis schistos

Mituli

Naphtha

Olea sylueſtris.

Genituræ pro-
fluuij in ſomno
remedia.

Lactuca ſylueſtris

Nymphæa

Hermol. Cor. cap. 932

Generationem
deprimentia,

Clymenon

Heliotropium maius

Mentha

Thelypteris

Xyphion

Asplenon.

Genituram ex-
tinguentia.

Cannabis ſatiuæ ſemen

Anethum.

Genituram au-
gentia.

Semen coriandri

Coriandrum.

Genitalium tor-
porem inducē
tia.

Cicuta.

Gingiuarū mor-
bi remedia.

Aristolochia tertia

Aloë Acetum

Acetum ſcillite

Alumen

Butyrum

Canchamum

Cytinus

Chalcitis lapis

Aerugo aurificum

Aerugo ferri

Galla

Lycium

Lepus terreſtris.

INDEX

Lac schiston
Lapis alabatriles
Myrrha
Mastiche
Oleum omphacinum
Pruna
Plantago
Pumex
Rosa
Rubus
Staphis agria
Sal
Tribulus
Vua cœnanthe
Vinum rhetinite.

Clabros aut de-
piles faci-
entia.

Scolopendra
Characias.

Gladiorum acie
perstringentia.

Malum sylvestre.

Glandis membri
remedia.

Mel.

Grauedinis re-
media.

Styrax.

Gurgulioni vti-
lia.

Silurus

Gutturis reme-
dia.

Bdellium

Ficus

Aster Atticus

Vinum halosantinum

Gypsi curatio.

Lixiua ex ficu

Diosc. lib. 6. cap. 24.

HÆMORRHOL-
darum remedia.

Amaracinum

Allium

Anonis

Aloë

Cepe

Irinum

Libanotis

Lapis Arabicus

Ouum

Palma

Plumbum elotum

Rhus

Rubus.

Hæmoroidarum
curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 66.

Halitus oris re-
media.

Agallochum

Anisum

Citrum

Bromos

Malo

C V R A T I V V S.

Malobathrum

Myrrha

Mastiche

Vinum selenite.

Hastulas infis

xas corpori ex-
trahentia.

Oxyacantha.

Hepaticorum re-
media.

Vide, Iecinoris morbo-
rum remedia.

Herbæ quæ peri-
munt.

Diosc. lib. 6. in præfat.

Herniæ medicinæ

Cinnamomum

Cupressus

Cytinus

Pentaphyllon

Psyllium

Xiphion.

Herpetis con-
traria.

Strichnon satium

Acetum.

Hirundinum vi-
sus restaurantia.

Chelidonium maius.

Hirundines

pellentia.

Acetum.

Hirudinis

curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 32.

Hominem ne-

cantia.

Iuniperi ramenta

Similax seu taxus.

Hominis morsus
remedia.

Iuglans.

Horrores excu-
tientia.

Vide, Rigorem excu-
tientia.

Hulcerantes

medicinæ,

Buprestis

Salamandra

Batrachion

Ruta

Lonchitis

Hedysaron

Clematis

Portulaca agrestis

Ampeloleuce.

Ulcera reme-
dia.

Amygdala amara

Anemone

Amylum

Anagalis.

R r

INDEX

Aristolochia	Aerugo aurificum
Aloë	Fel
Anthemis	Glans
Althæa	Grossi
Anchusa	Hedera
Astragalus	Goëd, id est, coriandrū
Aconitum	Gentiana
Arction	Iris Illyrica
Acetum	Isatis
Arsenicum	Indicus lapis
Alumen	Lixiua cū cinere ficus
Brasica sativa	Lentiscus
Beta	Lycium
Bulbus esculentus	Lana combusta
Ballote	Lolium
Caries lignorum	Lens
Cistos	Lupinus
Chelidonium	Libanotis
Centaurium	Laserpitium
Chamæleon niger	Lilium
Coriandrum	Myrtus
Chamædrys	Mel
Chamæpitys	Mandragoras
Chamelæa	Nasturtium
Cadmia	Narcissus
Cinis vitis	Olea sylvestris
Corallion	Oleum amygdalinum
Dracunculus	Orobis
Elelisphacon	Orchis
Eupatorium	Oenagra
Ebulus	Omphacium
Aes vstum	Plantago
Ficus	Pix
Fimum	Palma

C V R A T I V V S.

Purpura combusta	Amurca
Pepo	Halicacabus
Panaces	Allium
Peucedanum	Abſinthium
Præſon	Aniſum
Pentaphyſſon	Androſaces
Periſtereon ſupinus	Alifma
Papauer ceratitidis, id eſt eſt, corniculare	Ampelos agria
Psyllium	Aqua maris
Plumbum ſolutum	Acetum
Pumex	Aphronitrum
Rhamnus	Halcyonium
Ruta	Bupreſtis
Stratiotes terreſtris	Cyperus
Scordion	Cinnamomum
Sandaracha	Calamus odoratus
Sal	Cochleæ terreſtres
Spongia	Cicer
Thuſ	Chamæleon albus
Viſcum	Chamædriſ
Thelipteriſ	Ceſtron
Teſtæ fornacum	Cotyledon
Vrtica	Cucumis anguinus
Humorum malo- rum medicinæ.	Cici
Metopium vnguentū	Helleborum nigrum
Nardinum	Ebulus
Amygdalæ dulces	Ficus
Mel.	Erinaceus terreſtris
Hadropicorum remedia,	Hippophaës
Alarum	Hippophæſton
	Hyſſopus
	Laſerpitium
	Lathyris
	Origanum

R r z

INDEX V

Plantago	Picea
Pancratium	Pinus
Polium	Daphnoides
Raphanus	Palma elate
Ruta	Amygdalæ amaræ
Scilla	Lac humanum
Sampsuchus	Scandyx
Staphylinus	Struthium
Smyrnion	Anagallis
Strychnon hypnotico,	Agaricum
siue solanum somni-	Rhaponticum
ficum	Gentiana
Sal	Glycyrrhiza
Trifolium	Bryngion
Tithymalus	Abinthium
Vitex	Serpyllum
Vrina	Spondylium
Vinum scillite	Ammoniacum
Vinum rhetinite	Anthemis
Vinum cedrite	Chamæpitys
Vinum asarite	Vettonica
Vinum panacite	Eupatorium
Hyoscyami cu-	Hyoscyamus
ratio.	Pentaphyllon
Diosc. lib. 6. cap. 15.	Chrysocome
I ECINORIS	Papauer ceratitis, siue
remedia.	cornutum
Acorus	Epipactis
Nardi spica	Isopyron
Nardum gallicum	Vinum cydonite
Amomum	Vinum pilsite
Iuncus odoratus	Vinum abinthite
Agallochum	Vinum nardite
	Vinum asarite

CVRVA VIVVS.

Vinum ex syluestri a-
faro

Vinum chamælaetes

Rubrica sinopis.

Ignis sacri re-
media.

Asarum

Acacia

Acinos herba

Anchusa

Lycopsis

Aizoon maius

Brassica sativa

Acetum

Beta

Baccharis

Bechion

Crocus

Cupressus

Coriandrum

Cicuta

Cotyledon

Cici

Chalcitis lapis

Aerugo ferri

Harundo

Helxine

Ifatis

Lens

Lilium

Lens palustris

Lapis smyris

Myrtus

Malua

Mandragoras

Portulaca

Piantago

Parthenion

Polygonon mas

Pentaphyllon

Peristereon rectus

Papauer sativum

Psyllium

Rhamnus

Rosa

Ruta

Rubus

Idæa

Salix

Sanguis

Seris

Strychmon, siue solanū
sativum

Stratiotes aquaticus

Vrina.

Ilei morbi re-
media.

Oleum vulgare

Strychnos haliaca-
bus.

Impetiginis mor-
bi remedia.

Amygdalæ amaræ

Lapathon

Lichen in petris

Lolium

Rr 3

I N D E X

Thus	Aspalatus
Myrrha	Amygdalæ amaræ
Nasturtium	Absinthium
Sinapi	Anisum
Propolis.	Anethum
Incussis vtilia.	Antemis
Phlomidēs.	Althæa
Infantes mor-	Costus
tuos vtero eij-	Cicer
cientia.	Cyminum
Dictamnus.	Eryngion
Infantibus	Epithymum
vtilia.	Helenium
Athara	Hyssopum
After Atticus	Heracium maius
Strychnum satium	Iuncus odoratus
Smilax aspera.	Iuniperus
Infantium pupil;	Lac
læ vt glaucæ, non	Ligusticum
nigræ reddan-	Hordeum
tur.	Ocimum
Auellana.	Peucedanum
Inflationes faci-	Rapa sylvestris
entia.	Rhapoticum
Allium	Triticum
Capparis	Thymoxalme
Glans	Vrtica
Laserpitium	Vinacei
Porrum	Vinum
Bulbus esculentus	Vinum pifsite
Inflationum rez	Vinum absinthie
media.	Vinum scilliticum
	Vinum chamædryite
	Vinum tragoriganite

C V R A T I V V S.

Vinū syluestris nardi.
Inflammationū
remedia.

Coriandrum

Adeps

Asphodelus

Argemone

Anagallis

Artemisia

Aizoon maius

Acetum

Butyron

Brassica syluestris

Bechion

Brion thalassion

Cassia

Cotyledon prima

Elatine

Ebulus

Faba

Ficus

Harundo

Hyoscyamus

Irinum

Laurus

Linum

Lupinum satium

Lonchitis

Lichen in petris

Lens pulustris

Lapis

Melilotus

Mandragoras

Naphtha

Ocimum

Ochra

Picea

Platanus

Portulaca

Pulegium

Parthenion

Polygonon mas

Papauer erraticum

Rosa

Rhus

Susinum

Sabina

Sesamum

Sonchos

Scordion

Symphytum

Statiotes aquaticus

Triticum

Tribulus

Vinacei

Xyris.

Inguinum mor-
bi remedia.

Vide, Genitalium.

Ingenium prom-
ptum facientia.

Ouum.

Insaniam indu-
centia.

Hyoscyamus

Strychnon hypnoticū

R r 4

I N D E X

Mandragoras.

Infanientium
remedia

Bettonica

Helleborum nigrum.

Insomnia indu
centia.

Vide, Somniferæ me-
dicinæ.

Intestinorum
remedia.

Agallochum

Anthemis

Cochleæ terrestres

Hippuris

Irinum

Lac

Linum

Mastichinum

Malua

Hordeum

Palma

Portulaca

Rosaceum

Rosa

Ruta

Salix

Spartum

Vinum furrentinum

Triticum.

Et in verbo, Disenteris
corum remedia.

Intertrigo vt tol-
latur.

Vitex

Corium.

Ischiadicorum
remedia.

Afarum

Balsamum

Cardamomum

Silurus

Fimum

Nasturtium

Thlaspi

Rhaponticum

Thymus

Ammoniacum

Leontopetalon

Erythrodanum

Ascyron

Androsenum

Chamæpitys

Polemonia

Ocimoides

Aethiopis **Arction**

Chamæcissos

Spartum

Colocynthis

Oxymeli

Vinum panacite

Salugo

Adarces.

Iumentis con-
traria.

C V R A T I V V S.

Gramen cilicum

Nerion.

Iumentorum

scabiē emen-
dantia.

Amurca

Alysson

Lupinum satium

Oleum picinum

Oleum lentiscinum.

Iumentorum

vlcera emem-
dantia.

Oleum picinum

Alysson

Thelypteris.

L A B I O R. V M
scissuræ remedia.

Adeps

Lycium.

Lac coagulantia.

Balsamum

Ficus

Lac extinguentia.

Cicuta.

Lachrymas

trahentia.

Aerugo aurificum.

Lacertæ morsus

remedia.

Portulaca

Seps, siue lacerta cal-

chidica, in vino epota.

Lachrymæ que
perimunt.

Dioscorides libro, 6.

in præfat.

Lachrymatio

nes emendan-
tia.

Vide, dilachrymationes
emendantia.

Lactis vberta-
tem facientia.

Argemone

Anethum

Ampeloleuce

Cicer

Circæa

Echion

Fœniculus

Halimos

Hordeum

Lactuca

Malua

Melanthion

Ocimum

Sonchos

Vitex.

Lactis coagu-

lati curatio.

Dioscorides lib. 6. cap.
26.

Lassitudinum

remedia.

Rr 5

INDEX

Anethinum
Adeps
Clymenon
Laurinum
Ammoniacum
Sal
Lapis gagates
Vinum chamælaetes.

Laterum morbi remedia.

Acorus
Agallochum
Asphodelus
Aristolochia tertia
Ampeloleuce
Balsamum
Brassica satiua
Bdellium
Cyprinum
Fimur
Centaurium maius
Gentiana
Galbanum
Hordeum
Leucacantha
Myrrha
Naphtha
Phu
Panaces heracleon
Petroselinum
Prasiū, siue marrubiū
Pseudobunion
Ruta

Sagapenum
Terebinthina
Thapsia
Vrtica
Vinum cedrite
Vinum hyssopite
Vinum richadite
Vinum tragoriganite
Vinum aromatite
Vinum acorite
Vinum glycyrrhite.

Lendes necantia.

Cedria
Mel
Myricæ
Beta
Allium
Alumen.

Lentiginis macu- læ remedia.

Alysson
Halcyonium
Aqua maris
Ampeloleuce
Brassica satiua
Bulbus esculentus
Balanus myreplica
Cinnamomum
Eruum
Galbanum
Melanthion
Raphanus
Sanguis leporinus

C V R A T I V V S.

Sisymbrium sylvestre
Spuma argenti
Triticum cum aceto.

Lepræ remedia.

Allium
Anemone
Aristolochia
Acantha
Anchusa
Acetum
Ampelos leuce
Halcyonium
Alumen
Adarce
Buprestis
Brassica sativa
Cochleæ terrestres
Clematis
Fraxinus
Cucumis anguinus
Helleborum nigrum
Aerugo aurificum
Ficus
Hordeum
Iuniperus
Lolium
Lapathum
Lepidium
Myosotis
Oleum oleastri
Oleum cicinum
Olea æthiopica
Oriza

Salamandra
Serum
Sinapi
Struthion
Scammonia
Sulphur
Terebinthina
Thapsia
Terra melia
Ulmus
Urina
Vitis sativa.

Sal

Leporis marini remedia.

Fiber
Cornus
Lapis ophites
Halcionium
Chamaeleon niger
Cicer
Cucumis anguinus
Characias
Helleborum nigrum
Ficus
Glutinum
Laserpitium
Olea
Pruna
Rhaponticum
Ruta
Sal
Vitis sativa
Vinum tethalassome.

Fel

INDEX

num.

Lienis morbi

remedia.

Iris Illyrica

Nardum gallicum

Myrice

Acorus

Canchamum

Oleum amygdalinum

Lycium

Vitex

Cotonea

Linum

Ficus Aegyptia

Lac humanum

Lupinum sativum

Raphanus

Lapathum

Sinapi

Brassica sativa

Nasturtium

Piper

Struthion

Hedera

Cyclaminos

Pancration

Capparis

Lepidium

Agaricum

Rhaponticum

Aristolochia tertia

Crocodilion

Abinthium

Hyslopum

Tragorigaunum

Pulegium

Dictamnus

Sison

Anison

Smyrnion

Peucedanum

Sagapenom

Ammoniacum

Viscum

Polium

Chamedrys

Leucoion

Nymphæa

Asplenon

Hemionitis

Erythrodanum

Vertonita

Louchytis altera

Polemonia

Clymenon

Xyris

Anchusa

Adiantum

Pteris

Ampelos leuce & agria

Aqua maris

Vitis sativa

Acetum scilliticum

Vinum panacite

Ferrum

Corallium

Lapis Aflus

Vrtica

CVRATIVVS.

Coris
Hermol. Cor. cap. 124

Linguae vtilia.
Olea æthiopica.

Lippitudinis res
media.

Ebenus
Lapis hæmatites
Plantago
Spongiz.

Liquores qui
perimunt.

Dioscorides lib. 6. in
præfat.

Liuorem emen-
dantia.

Allium
Aqua maris
Iuglans
Lana succida
Rhaponticum
Sinapi
Lupinum satium.
Thapsia.

Locorum mulie-
brium remedia.

Anethum
Althæa
Fœnogræcum
Linum
Leucoion
Trifolium.

Lumbricos ne-
cantia.

Coriandri semen
Absinthium seriphium
Brassica sativa
Chamæleon albus
Calamintha
Myrrha
Portulaca
Oleum cicinum
Thelypteris
Lupinum satium.

Lumborum affe-
ctuum remedia.

Aspharagus.
Capparis
Chamæpeuce.
Echion
Harundo
Leucacantha
Papauer cornutum
Sampfuchinum
Smyrnion.

Lupos necantia.
Aconitum pardalian-
ches.

Aconitum alterum
Apocynum.

Luscioforum re-
media.

Fel animalium
Sanguis.

INDEX

Naphtha	Cyclaminos
Cedrides	Asphodelus
Myrice	Capparis
Tilia	Anemone
Hypocistis	Hedera
Lycium	Agaricum
Acacia	Aristolochia tertia
Vitex	Centaurium maius &
Olea sylvestris	minus
Lotus	Eryngion
Amygdala amara	Abinthium
Ficus	Origanum
Cochlear terrestres	Tragoriganum
Fiber	Pulegium
Buprestis	Elelisphacos
Oesypus	Calamintha
Fimum	Thymus
Cicer	Serpyllum
Raphanus	Sampsuchus
Lapathum	Baccharis
Brassica sativa	Ruta
Chondrylla	Panaces heracleum
Lactuca sylvestris	Ligusticum
Caucalis	Seseli Malsiliense
Bruca	Tordylon
Ocimum	Sison
Cepe	Foeniculus
Orobanche	Oreoselinon
Allium	Petroselinum
Porrum	Hippomarathrum
Ampeloprason	Hipposelinum
Nasturtium	Smyrnion
Thlaspi	Daucus
Struthion	Libanotis

Anisum

Melan

C V R A T I V V S.

Melanthion
 Laserpitium
 Sagapenon
 Euphorbium
 Clynopodium
 Chamedrys
 Lilium
 Melistophyllon
 Prasium
 Stachys
 Trifolium
 Polium
 Scordion
 Artemisia
 Leucoion
 Anthemis
 Pæonia
 Erythrodanum
 Anagyris
 Alisma
 Coris
 Hypericon
 Cestron
 Medion
 Xiphion
 Tragion
 Heliochryfos
 Mandragoras
 Vrtica
 Myrtus
 Adiantum
 Mirtus sylnestris
 Laurus Alexandrina

Daphnoides
 Chamædaphne
 Helleborus niger & al-
 bus
 Ampelos melæna
 Heliotropion maius
 Vinum scilliticum
 Vinum absinthite
 Vinum hyslopite
 Vinum aromatite
 Vinum daucite
 Vinum panacite
 Vinum helleborite
 Vinum dictamnite
 Staphyllinus.

Menstrua si- stentia.

Lentisci succus
 Myrica
 Oxyacanthos
 Thus
 Palma
 Malum punicum
 Myrtus
 Lepus terrestris
 Fuligo butyri
 Coagulum
 Sanguis
 Acinos
 Acantha Arabica
 Hieracium maius
 Nymphæa
 Pæonia

INDEX

Limonion
 Medion
 Sideritis achilleos
 Rubus
 Idæa radix
 Tragos Lyssimachia
 Oxychoenos
 Heliochrysos
 Papauer satium
 Mandragora
 Aizoon maius
 Aerugo ferri
 Vinum rhetinite
 Fax vini
 Lapis asius
 Morochthus
 Hæmatites
 Ostracites
 Terra samia.
 Mentem com-
 mouentia.
 Coriandrum.
 Oreoselinum.
 Metalla quæ pe-
 rimunt.
 Diosc. lib. 6. in præfat.
 Mollientes me-
 dicinæ.
 Vide, Demollientes.
 Morbi regij me-
 dicinæ.
 Vide, Regij morbi.

Morborum quæ
 serpunt remedia.
 Vide, Malorum quæ
 serpunt.
 Mulierû deside-
 rio quo fatisciat.
 Acorum
 Picea
 Pinus
 Adeps bubulus.
 Mulierum in-
 firmitatum re-
 media.
 Amomum
 Balsamum
 Sussinum
 Sefeli Malsiliense.
 Mures necantia.
 Chamæleon albus
 Aconitû pardalianches
 Helleborus candidus
 Hermol. Cor. cap. 28.
 Muris aranei mor-
 sus remedia.
 Mus araneus
 Absinthium
 Crhyfagonon
 Diosc. lib. 6. cap. 62.
 Muris morsus
 remedia.
 Grosi
 Allium.

C V R A T I V V S.

Muscas necantia.	Lac humanum
Lyfimachia.	Triticum
Myrmecias tol-	Poterium
lentia.	Peucedanum
Ficus.	Laserpitium
N A R I V M morbi	Lilium
remedia.	Satyrrium
Malum punicum.	Melissophyllon
Nauseam discus-	Althæa
tientia.	Cocus
Tragoriganum	Erigeron
Pulegium	Cacalia
Fœniculus.	Narcissus
Nauseam mo-	Hippophæstion
uentia.	Vini qualitas
Laurinum.	Aqua maris
Susinum.	Acetum scilliticum
Nervorum mor-	Vinum stichadite
bi remedia.	Vinum thymite
Oleum sicyonium	Fex vini
Oleum elæomeli	Fiber.
Laurinum	Nervos lædentia.
Cyprinum	Malus
Gleucinum	Hedera
Amaracinum	Vinum
Metopium	Vinum gypsatum
Bdellium	Mesagite.
Lixiua ex ficu	Nervos tollentia.
Erinaceus terrestris	Mel sardoum.
Cochleæ terrestres	Nigredines abs-
Vipera	tergit.
Vermes terreni	Sabina.
	Nodis vtilia.

INDEX

Bdellium.

Nomorum mor

bos curantia.

Asparagus

Sabina

Papyrus

Cistos

Olea sylvestris

Olea

Oliuæ colymbades

Malum punicum

Smarides

Fel animalium

Vrina

Lilium

Plantago

Arifaron

Asphodelus

Maron

Prasium

Orchis serapias

Britannica

Peristereon supinus

Galiopsis

Vua cœnanthe

Omphacinum

Acetum

Oxalme

Squama æris

Aerugo aurificum

Chalcites lapis

Flos salis

Lapis ostracites.

Nubeculas ocul

lorum emen-
dantia.

**Vide, Oculorum reme-
dia.**

Nyctiloparum

morbi reme-
dia.

**Vide, Lusciosorum re-
media.**

**O B M V T E S C E -
R E facientis.**

Mandragora.

**Oculorū epipho-
ræ remedia.**

Afarum

Malabathrum

Cotonea

Sesamum

Lens

Cucurbita

Anemone

Argemone

Myosoris

Gentiana

Baccharis

Ruta

Apium

Hemerocallis

Rubus Idæa

Papauer fatiuum

Phlomidis

Aster atticus

C V R A T I V V S.

Viola purpurea	Rosa
Cict.	Lycium
Oculis contraria.	Acacia
Lactuca	Salix
Porrum	Olea syluestris
Ocimum	Olea Aethiopica
Coriandrum	Palma thebaica
Anethum.	Cytinus
Oculorum mor-	Myrtus
borum remedia.	Cerasia
Acorum	Halicacabus
Casia	Mituli
Cinnamomum	Cochleæ terrestres
Amomum	Scorpius marinus
Balsamum	Vipera
Canchamum	Senecta serpentis
Crocum	Sepia
Crocomagma	Mullus piscis
Oleum vulgare	Ouum
Elæomeli	Hirundines
Oleum amygdalinum	Ceruinum cornu
Myrrha	Lac humanum
Thus	Costus
Fuligo thuris & resinæ	Fuligo butyri
& picis	Lana vsta
Picea	Oesypus
Cupressus	Fel animalium
Sabina	Sanguis
Platanus	Vrina
Populus alba	Amylum
Myrice	Faba
Acalis	Lens.
Ebenus	Brassica sativa
	Portulaca

Mel

INDEX

Seris	Pepo	Tribulus
Lactuca sylvestris		Erinos
Ocimum		Gramen parnasium
Cepe		Rubus
Sinapi		Elatine
Piper		Papauer fatium , &
Zingiber		cornutum
Cyclaminos		Hyoscyamus
Asphodelus		Mandragoras
Dracunculus maior		Aconitum pardalian -
Dracunculus minor		ches
Argemone		Aizoon maius
Anagalis		Helleborus albus
Clelidonium maius		Cici
Orthonna		Chamaesyce
Centaurium minus		Capnos
Tragacantha		Lotus fatiua
Aloe		Sesamoides maius
Abfinthium		Aes vftum
Abrotonum		Vua oenanthe
Ruta		Vinum furrentinum
Sampsuchus		Acetum fcilliticum
Melilotus		Cadmia
Ruta Galatica, fve fyl-		Squama æris
ueftris		Aerugo aurificum
Panaces heracleon		Plumbum elotum
Fœniculus		Stimmi
Libanotis		Cinnabaris
Sagapenon		Chalcitis lapis
Ammoniacum		Alumen
Sarcocolla		Pumex
Chamaedrys		Sal
Prasium		Flos falis
Stœbe		Fex vini

C V R A T I V V S.

Spongia	Cyprus
Corallium	Tilia
Pyrites	Acacia
Hæmatites	Olea syluestris
Galactites	Castanea
Thyites	Malum punicum
Morochthus	Mæna
Sapphirus	Lac schiston
Geodes	Butyrum
Samius.	Plantago Aloë
Opistotonicorū,	Origanum
id est, ceruicis rigo,	Leucoion
re laborantium	Orchis serapias
remedia.	Anthemis
Acanthion	Periclimenon
Eryngium	Rubus
Laserpitium	Staphis agria
Sagapenon	Vua œnanthe
Satyrion	Omphacium
Coris.	Acetum scilliticum
Opñ remedia.	Sandaracha
Sal	Alumen Sal.
Diosc. lib. 6. cap. 17.	Orthopnoicis, id
Oris halitus re-	est, difficulter spi-
media.	rantibus re-
Vide, Halitus oris re-	media.
media.	Helenium
Oris vlcerum re-	Myrrha
media.	Cupressus
Cyperus	Daphnides
Aspalathus	Cotonea Vrina
Fuligo picis	Struthion
	Cyclaminos

I N D E X

Dracunculus maior

Abrotonum

Hyssopus

Calamintha

Thymus

Baccharis

Seseli Mafsiliense

Hieracium maius

Smyrnion

Spondylium

Peucedanum

Melanthion

Ammoniacum

Melissophyllon

Bechion

Botrys

Anemone

Hippuris

Vrtica

Elaterium

Hippophæstion

Vinum panacite.

Ossium squamas

extrahen/
tia.

Aristolochia

Ampelos leuce.

Ossa fracta con/

solidantia.

Vetonica

Xyris.

Oues necantia.

Nerion.

**Oxypara ingres/
dientia.**

Ligusticum

Caros

Anethum.

**PALPEBRA,
rum remedia.**

Vnguentū rosaceum

Mastiche

Resina

Fuligo picis

Grossi

Lixiuiā ex ficu

Vrina

Alumen

Chondrylla

**Vide supra, Genarum
morbi remedia.**

**Palpebrarum pi-
li euulsi ne rena/
scantur.**

Tellinæ

Sanguis

Capnos.

**Pallidum colo-
rem facientia.**

Hieracium minus

Aloë.

**Panorum reme-
dia.**

Atriplex

Acetum

Bulbus esculentus

CV R A T I V V S.

Coriandrum cum faba
fracta

Conyza

Ficus

Galiopsis

Olea sylvestris

Helxine

Ocimum

Ammoniacum

Isatis

Plantago

Xyphion.

Pantheras ne-
cantia.

Aconitum pardalian-
ches.

Papaveris cu-
ratio.

Dioscor. lib. 6. cap. 17.
& 18.

Papularum re-
media.

Vrina

Flos æris.

Paralyticorum
remedia.

Capparis

Brythrodanum

Colocynthis

Ampelos melæna

Vinum scilliticum

Aphronitrum.

Partus necantia.

Daphnides

Coagulum

Adeps hircinus & ouil-
lus & bubulus

Nasturtium

Thlaspi

Ruta

Hedysaron

Helleborus albus &
niger

Colocynthis

Ampelos leuce

Vinum phthorium.

Partus quibus
inuatur.

Iris Illyrica

Cinnamomum

Balsamum

Vnguentum telinum

Irinum

Amaracinum

Myrrha

Picea

Fiber

Olea æthiopica

Oesypum

Finum

Cicer

Lupinum sativum

Allium

Cyclaminos

Dracunculus maior

Dracunculus minor

S s 3

INDEX

Hedera
Gentiana
Centaurium maius
Centaurium minus
Pulegium
Elelisphagos
Calamintha
Baccharis
Panaces heracleon
Staphylinus
Thynni falsi caro
Seseli Messiliense
Smyrnion
Peucedanum
Sagapenum
Galbanum
Clinopodium
Ammoniacum
Chamaedrys
Prasium
Bechion
Artemisia
Conyza
Leucoion
Onosma
Anthemis
Anchusa
Mandragoras
Laurus alexandrina
Ampelos leuce
Heliotropium maius
Vinum panacite
Vinum helleborite
Alumen

Sulphur
Lapis Iaspis
Aëtites
Samius.
Paronychiarum,
 id est, vnguiū mor,
 borū remedia.
Thus cum melle
Olea sylvestris
Myrtus
Ebur
Paronychia
Vua œnanthe
Aerugo ferri.
Parotidum, id est,
 auriū apostematū
 remedia.
Ficus
Fimum
Linum
Faba
Lapathum
Plantago
Erysimon
Viscum
Althæa
Psyllium
Strycnon fatium
Vrtica
Galiopsis
Terra cimolia
Et in verbo, Aurium
 medicinæ.

C V R A T I V V S;

Pauescentium res
media.

Linum

Melicratum

Hydromel.

Pecoris scabiem
emendantia.

Vide, Iumentorū sca-
biem.

Pecori vtilia.

Adiantum.

Pecus necantia.

Merion

Aconitū lycoctonon.

Pecus mortuum
extrahentia.

Aristolochia.

Pectoris morbi
remedia.

Acorus

Meu

Costum

Myrrha

Iuncus odoratus

Pityides

Terebinthina

Iuniperus

Ficus

Pomum

Nasturtium

Piper

Chelidonium minus

Rhaponticum

Stichas

Thymus

Ruta

Libanotis

Sagapenum

Ammoniacum

Scordion

Bechion

Vrtica

Isopyrum

Vinum cedrite

Vinum aromatite

Vinum nectarite

Vinum daucite.

Pediculos ne-
cantia.

Allium

Alumen

Mel

Cedria.

Pedum qui à fri-
gore alserūt remedia.

Cyclaminos.

Pedum rimarum
remedia.

Scilla.

Perfrictionis me-
dicinæ.

Iris Illyrica

Cyperus

Balsamum

I N D E X

Oleum
 Ficus Aegyptia
 Vinum stichadite.
Percussis à fe-
ris vtilia.
 Balsamum
 Paliurus
 Mustela
 Ouum
 Argemone
 Hippomarathrum
 Coagulum
 Sanguis
 Piper
 Elaphoboscum
 Phyllitis.
Pernionum re-
media.
 Vnguētum melinum &
 telinum
 Thus cum suillo adipe
 Acacia
 Ficus
 Cancri
 Pulmo marinus
 Vngues asini
 Adeps Lens
 Bruum
 Rapa sativa
 Beta
 Cyclaminos
 Dracunculus maior
 Dracunculus minor

Asphodelus
 Scilla
 Batrachion
 Arction
 Cotyledon prima
 Aqua maris
 Alumen.
Peripneumonia
 corum remedia.
 Abrotonum
 Tragoriganum.
Pestilentie con-
traria.
 Myrrhis, id est celifo-
 lium
 Vinum omphacite.
Phalangiorum
 ictus remedia.
 Cinnamomum
 Terebinthus
 Myrica
 Myrtus
 Lixiua ex fico
 Cancri
 Malua
 Asparagus
 Lactuca sylvestris
 Hedera
 Abrotonum
 Daucus
 Spondylium
 Aparine
 Phalangium

C V R A T I V V S.

Myrrhis

Aqua maris

Diosc. lib. 8. cap. 38

Phagedænæ mor-
bi remedia.

Fel Fimum

Dracunculus minor

Isatis

Chamæleon niger

Panaces

Staphylinus

Perasites

Characias

Ampelos leuce

Vinum

Acetum

Alumen

Sal Flos salis.

Pharico veneno
contraria.

Vinum albanum

Diosc. lib. 6. cap. 19.

Phlegmatis con-
traria.

Plantago.

Phreneticorum
remedia.

Crocinum

Vitex

Asparagus

Serpyllum

Conyza tertia

Leucoion.

Phthiriasis, siue
pedicularis morbi re-
media.

Strigmenta gymnasto-
rum

Myrica

Hedera

Staphis agria

Sandaracha.

Phthysicorum re-
media.

Pix

Adeps

Porrum

Agaricum

Rhaponticum

Acantha

Prasium

Cestron

Lapis Asi.

Piligenarum ne
defluant.

Spica nardi

Cochlex terrestres

Oesypus

Condrylla

Armenius lapis.

Pili palpebrarū
euulsi ne rena-
scantur.

Tellinæ

I N D E X

Sanguis		Centaurium minus
Capnos.		Tragacantha
Pili alarum euul-		Hyssopus
si ne renascantur.		Origanus
Fabæ.		Tragoriganum
Pituitæ crassæ		Pulegium
remedia.		Thymus
Iris Illyrica		Ruta
Sesamum		Pyrethrum
Hyssopus		Spondylium
Thymoxalme.		Melanthium
Pituitæ remedia.		Parthenion
Cinnamomum		Clematis
Styrax		Sideritis achilleos
Naphtha		Hyoscyamus
Vlmus.		Helleborum nigrum
Auellana		Sesamoides maus
Ouum		Cucumis
Serum	Vrina	Elaterium
Hordeum		Staphis agria
Linum		Thapsia
Faba		Hippophaës
Lupinum satium		Hippophæston
Agrioraphanus		Cici
Portulaca		Characias
Cucurbita		Lathyris
Cepa		Scammonia
Sinapi	Piper	Thimelæa
Cyclaminos		Ebulus
Dracunculus maior		Apios
Capparis		Colocynthis
Anemone		Epithymon
Anagallis		Empetron
		Ampelos leuce

C V R A T I V V S.

Polypodium
Heliotropium maius
Vua passa
Aqua maris
Vinum rhetinite
Vinum aromatite
Vinum mandragorite
Vinum scammonite
Sulphur
Peplus.

Pityocamparū
curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 7.

Plagarum vibri-
ces emendatia.

Susino.

Plantæ quæ pe-
rimunt.

Diosc. lib. 6. in præfat.

Pleureticorum
remedia.

Staphylinus

Laserpitium.

Aethiopis.

Podagræ morbi
remedia.

Amomum.

Naphtha.

Populus nigra.

Amurca

Salix

Ficus

Cochleæ terrestres
Mustela
Marinus pulmo
Lac humanum
Adipum medicinae
Sanguis scilicet men-
struus
Finium
Hordeum
Lens Rapa satia
Brassica sativa
Seris
Cucurbita.
Aros
Asphodelus
Bulbus esculentus
Pulegium
Panaces heracleon.
Libanotis
Scordion
Leucoion
Androsaces
Helxine
Papauer sativum
Hyoscyamus
Lens palustris
Aizoon maius
Bryon thalassium
Phycos marinus
Cucumis anguinus
Balanus myrepica
Ebulus
Heliotropium maius
Vua passa

I N D E X

<p> Acetum Ferrum Sulphur Lapis Albus Lapis gagates Testæ siue terræ fornacum. Polypi morbi remedia. Dracunculus maior Dracunculus minor. Presteris serpentis morsus remedia. Omotarichos Rubus. Præputiorum morbi remedia. Aloë. Præcordiorum remedia. Scordion Vinum thymite Vinum daucite. Præcipitatis ex alto vtilia. Iris Illyrica Vitex Asparagus Anisum Cannabis sativa </p>	<p> Sal Profluuij geniturę remedia. Vide, Geniturę profluuij in summo. Pruriginem facientia. Scolopendra Ephemeron Opium. Pruriginem emedantia. Vrina Eruum Lapathum Aloë Origanum Pulegium Elelisphacos Melilotus Balanus myreplica Acetum Alumen Sulphur Sal. Psilothrum, siue vnguentum depilatorium. Lepus marinus Hedera Ampelos leuce Dryopteris Arsenicum. Psoræ morbi remedia. Car </p>
---	--

CURATIVVS.

Cardamomum	Acetum
Oleum amygdalinum	Alumen
Lycium Olea	Sal
Palma elate	Ferri rubigo.
Ficus	Pubertas ne
Erinaceus marinus	erumpat.
Cicer	Hyacinthus.
Lupinum satium	Pulmonis morbi
Batrachion	remedia.
Chelidonium minus	Iuncus odoratus
Origanum	Balsamum
Pentaphyllon	Cedria
Staphis agria	Amygdalus amara
Balanus myrepfica	Ficus Lac
Ampelos leuce	Pulegium
Vitis sativa	Ruta
Aqua maris Sal.	Sagapenon
Psylli curatio.	Symphyton
Diosc. lib. 6. cap. 10.	Pentaphillon
Pterigi morbi	Chrysocome
remedia.	Vrtica
Acacia	Thapsia
Rhus	Melicratum
Malum punicum	Vinum hyssopite
Myrtus	Vinum aromatite.
Ficus	Pulices necantia.
Glycyrrhiza	Vnguentum telinum
Aloë	Crocinum
Prasium	Butyrum.
Pentaphyllon	Putredinum geni-
Characias	talium remedia.
Ampelos leuce	Aspalathus.
Vua oenanthæ	

Tt

INDEX

Putredines pur-
gantia.

Irinum

Cinnamomum

Pix

Sal.

QUADRUPPE,
dum scabiem
emendat.

Vide, lumentorum sca-
biem.

Quartanæ febris
remedia.

Vide, Febris quartanæ
remedia.

RADICES quæ
perimunt.

Diosc. lib. 6. in præfat.

Raucedinis re-
media.

Tragacantha.

Reduuias sa-
nantia.

Ferri rubigo.

Refrigerantes
medicinæ.

Vnguentum melinum

Cupressus

Rhodides

Rosa

Acacia

Ouum

Sonchos

Seris

Lactuca

Caros

Coriandrum

Hieracium maius

Polygonum duplex

Clymenon

Periclymenon

Helxine

Papauer fatium

Psyllium

Cicuta

Lens palustris

Aizoon duplex

Erigeron

Phacos thalassion

Potamogeton

Cytifus

Ebulus

Acetum

Omphacomeli.

Pompholyx

Plumbum elotum

Spuma argenti

Cerussa

Corallium

Terra

Lapis samius

Terra ampelitis.

Regn morbi res
media,

Nardi spica

Solus
Cerasus
Fum
Lapathum
Anigler
Mongus
Bryonia
Sola
Cochlearum
Alia
Abotium
Origum
Hippocuris
Libanotis
Spondium
Lactarium
Prilum
Scorion
Apleon
Antemis
Pacia
Erythrodia
Cinnapit
Puraphyll
Hycodum
Halicacis
Cinnacali
Ciris
Myrris
Elaterum
Vincetoxic
Vincetoxic
Vincetoxic
Vincetoxic

CVRATIVVS.

Schistos		Renum doloris
Ceruinum cornu		remedia.
Fim um	Cicer	
Lapathum		Amygdala amara
Attriplex		Asparagus
Asparagus		Anagallis
Erysimon		Agaricus
Scilla		Anthillis
Chelidonium		Anchusa
Aloë		Halcyonium
Abfinthium		Cardamomum
Origanum		Calamus odoratus
Hippomarathrum		Cicer
Libanotis		Cassia
Spondilium		Cinnamomum
Laserpitium		Chamæpitys
Prasum		Passum
Scordion		Glycyrrhiza
Asplenon		Iuncus odoratus
Anthemis		Laurinum
Pæonia		Lac
Erythrodanum		Lotus sativa
Chamæpitys		Meu
Pentaphyllon		Pistacia
Hyacinthus		Nardus gallica
Halicacabus		Nuclei pini
Chamæcissos		Oleum amygdalarum.
Osyris		Palma elate
Myrtus syluestris		Portulaca
Blaterium		Plantago
Vinum chamædryte		Porrum
Vinum calaminthite		Petroselinum
Vinum nardite		Peucedanum
Sulphur.		Pæonia
		Rhaponticum
		Saccharum

T t 2

I N D E X

Scandyx
Smyrnion
Symphyton
Stratiotes aquaticus

Tragacantha
Cordylon

Vrina
Vetonica

Vua passa

Vinum

Vinum cydonite

Vinum holosanthinum

Erinaceus terrestris

Foeniculus

Vinum absinthite

Vinum nardite

Vinum aromatite

Oleum balaninum.

Rhagadum re-
media.

Pix Lycium

Vitex

Cancrī

Rheumatismis
vtilia.

Acetum

Cupressus

Daphnides

Ficus Fax vini

Macer

Oleum oleastri

Ouum

Persica

Portulaca

Plantago

Staphis agria

Triticum

Vini qualitas

Vinum labruscæ

Vinum ex pyris

Vinum myrtite.

Ricinos necantia.

Cedria.

Rigores seu hor-
rores febrium ex-
cutientia.

Glencinum

Piper

Panaces heracleon

Staphylinus

Vinum cedrite

Pyrethrum.

Rimarum sedis
remedia.

Vide, Sedis rimarum.

Rosionis reme-
dia.

Lac schiston

Pæonia.

Ructū mouentia.

Mastiche

Raphanus

Anethum

Smyrnion

Vinum daucite

CVRATIVVS.

Ruptorum re-
media.

Acorus
Cardamomum
Asarum
Calamus odoratus
Helenium Bdellium
Iuniperus Cedrides
Halimos
Lixiua ex ficu
Fel simum
Dracunculus maior
Dracunculus minor
Asphodelus
Bulbus esculentus
Capparis
Rhaponticum
Gentiana
Aristolochia
Centaurium
Acantha
Leucacantha
Abrotonum
Origanum
Calamintha
Serpillum
Baccharis
Panaces heracleon
Libanotis
Laserpitium
Sagapenum
Galbanum
Polycnemnon

Clinopodion
Althæa Cestron
Symphyton
Holotheon Xyris
Hippuris
Heliochryson
Phlomidis
Ampelos leuce
Vinum daucite
Vinum tragoriganite
Vinum panacite
Lapis schistos.
SAGITTAS in
fixas extrahentia.
Vide, Spicula infixæ.
Saluam euo-
cantia.
Pyrethrum.
Salmandre vene-
ni remedia.
Diosc. lib. 6. cap. 4.
Sanguinem ex-
creantibus vtilia.
Iuncus odoratus
Aspalathus
Thus in potu datum
Lentiscus
Mastiche potu data
Naphtha
Cupressus
Macer Myrica
Hipopistis Rosa
Licium Salix

T

S

INDEX

Quercus	Vinum phoenicite
Palma	Corallium
Malum punicum	Lapis hæmatites
Myrtus	Terra samia,
Cichorium	Sanguinem si-
Amygdalus amara	stentia,
Ouum	Thus
Ceruinum cornu	Cupressus
Fimum	Galla
Coagulum	Persea
Triticum	Cochleæ terrestres
Amylum	Ranæ
Portulaca	Araneus
Plantago	Coagulum
Porrum	Sanguis
Erysimon	Fimum
Agaricum	Plantago
Rhaponticum	Porrum
Centaurium	Elelisphacos
Acantha leuce & Ara-	Mentha
bica	Serpyllum
Ferula	Ruta
Althæa	Cyminum sativum
Cestron	Stœbe
Lyfimachia	Ferula
Symphytum	Clymenon
Polygonon mas	Hippuris
Symphytum alterum	Sideritis achilleos
Clymenon	Pentaphyllon
Aethiopis	Phoenix herba
Isopyrum	Astragalus
Adiantum	Lichen in petris
Vitis sativa	Idæa radix
Omphacium	Vua
	Gallion

C V R A T I V V S.

Stratiotes terrestris	Sandarachæ
Vua œnanthe	curatio.
Acetum	Diosc lib. 6. cap. 19.
Vinum terebinthinum	Sardonix cu-
Plumbum elotum	ratio.
Stimmi	Diosc. lib. 6. cap. 14.
Cinnabaris	Sulphur Scabiem iumētoꝝ
Alumen	rū emendantia.
Spongiæ	Vide, Iumentorum sca-
Gypsum.	biem.
Sanguinem con-	Scabiei morbi
cretum discutientia.	remedia.
Lixiua ex ficu	Argemone prima
Thymus	Chamaeleon niger
Heliochryson.	Helleborus niger
Sanguinē per vri-	Oesypum Sal
nam expellentia.	Oleum oleastri.
Bruum	Sinapi
Cantharides	Sulphur
Ammoniacum.	Vnguentum melinum.
Sanguinē per na-	Scolopēdre mori
res expellentia.	sus remedia.
Crocodilium.	Grossi
Sanguinem per	Scolopendra.
vrinā reddentiū	Asphodelus Sal
remedia.	Diosc. lib. 6. cap. 19.
Cyminum sylvestre.	Scorpionis ictus
Sanguisugas	remedia.
necantia.	Cyperus
Oxalme	Amomum
Dioscori, libro 6. cap.	Cardamomum
329	Cinnamomum

T t 4

I N D E X

<p> Daphnides Myrtus Ficus Scorpius terrestris Smarides Mullus piscis Locustæ Lacerta Mures domestici Fimum Lapathum Sonchos Lactuca syluestris Ocimum Abrotonum Sampsuchum Heracium maius Delphinion Laserpitium Atractilis Lychnis vtracq Millefolium Phalangium Polemonia Chamæfyce Heliotropium Scorpioides Aqua maris Vinū tethalassomenum Vinum cydonite Sulphur Sal Lapis sapphirus Diosc. lib. 6. cap. 60. </p>	<p> Scorpiones ne- cantia. Canceri Canceri. Scorpionis mas- rini icus remedia. Vrina Asphodelus Plumbum syncerum & crematum Sulphur. Diosc. lib. 9. cap. 61. Scorpiones tor- pefacientia. Delphinion Lychnis syluestris Lens palustris. Secundinas tras- hencia. Balsamum Sampsuchinum Abrotonum Picea Fiber Iecur mergi Linum Aristolochia tertia Thymus Pulegium Prasium Artemissa Oenanthe Hemorocallis </p>
--	--

C V R A T I V V S.

Erythrodanum	Portulaca
Anagyris Myrtus	Sonchos
Adiantum	Anagallis
Ampelos leuce	Melilotus
Vinum dictamnite.	Laserpitium
Sedis rimarum	Aster Atticus
remedia.	Viola purpurea
Strigmenta balneorum	Cucumis anguinus
Meu Aloë	Colocynthis
Dipsacos	Acetum
Leucoion.	Oxalme
Sedis inflammacionis	Vinum terebinthinum
remedia.	Flos æris
Oleum cycinum	Plumbum elotum.
Amaracinum	Semina quæ per-
Lens Libanotis	rimunt.
Symphyton	Diosc. lib. 6. in præfat.
Erigeron.	Sensibus nocētia.
Sedis morbi re-	Vinum annosum.
media.	Sensus recreātia.
Thus	Lapis samius.
Lentiscus	Sepis bestiolæ
Pix Rosa	morsus remedia.
Amurca	Portulaca Oxymel.
Mâlum punicum	Serpentiū vene-
Myrtus	nis contraria.
Cancri	Paliurus
Ouum	Vitex Cancri
Oesypum	Hippopotamus
Adeps Fel	Fiber Mustela
Lens	Gallinaceus
Malua	Cantharides
Althæa	

T t 3

INDEX

Chondrylla	Dracunculus maior
Nasturtium	Abrotonum
Dracunculus	Origanum
Asphodelus	Calamintha
Rhaponticum	Peucedanum
Aristolochia tertia	Melanthion
Origanum sylvestre	Galbanum
Baccharis	Ruta Polium
Phlomos, siue verba-	Oenanthe
scum	Lyfimachia
Panaces chironium	Aster atticus
Staphylinus	Vinum conyzite
Smyrnion	Lapis gagates.
Aparine	Serpentium mor-
Camædrys	fus remedia.
Lychnis fatiua, siue co-	Iris Illyrica
ronaria	Afarum
Brythrodanum, siue	Cinnamomum
Rubia	Balsamum
Sparganion	Pix
Polygonon mas	Naphtha
Clematis daphnides	Iuniperus
Polemonia	Platanus
Ocimoides	Erica
Hyacinthus	Glandes
Mandragoras	Pistacia
Nerion	Ficus ægyptia
Adiantum.	Pastinaca piscis
	Ranæ
	Gobius
	Fel
Serpentes fu-	Omotarichos
gantia.	Fimum
Iuniperus	Marinus pulmo
Cornu ceruinum	Mel
Adeps	Erucum
Nasturtium	Distampus

C V R A T I V V S.

Raphanus
 Agaricum
 Brassica sativa
 Cyclaminos
 Ampeloprason
 Dracunculus minor
 Asphodelus
 Anagallis
 Acantha leuce
 Abrotonum
 Asclepias
 Origanum
 Lilium
 Calamintha
 Clinopodium
 Serpyllum
 Leontopetalon
 Panaces heracleon
 & asclepion
 Cyminum sativum &
 sylvestre
 Ammi Foeniculum
 Daucus
 Libanotis
 Sagapenon
 Prasion
 Phyllitis
 Trifolium
 Scordion
 Cestron
 Periclymenos
 Echion
 Ocimoides, siue oima-
 strum

Rubus
 Eupatorium
 Heliochryson
 Adiantum
 Peristereon supinus
 Ebulus
 Ampelos leuce
 Vitis sativa
 Vinum Acetum
 Oxymeli
 Vinum conyzite
 Vinum panacite
 Sal Cinis vitis
 Lapis ophites.
 Serpentes ne fe-
 riant.
 Cerui medulla.
 Serpentes ne
 cantia.
 Anchusa onocheles
 Vinum cedrite.
 Siccantes medi-
 cine.
 Ammi
 Bromos
 Cistos
 Cyminum sativum
 Ebulus
 Aes vitum
 Harena litoris
 Libanotis Mentha
 Pompholyx
 Spodium Rubus

I N D E X

<p> Terra Chia Rubrica sinopis Fæx vini Diphryges. Singultum pel- lencia. Fiber Sisymbrium Rhaponticum Mentha Aristolochia tertia Anethum Cyminum sylvestre Alysson Asplenon Clymenon Saxifragum. Siriasis remedia. Cucurbita Pepo Heliotropium maius. Sitim generantia. Cepe Allium Capparitis Vini qualitas. Sitimextinguētia. Glycyrrhiza Simphytum. Smilaci cōtraria. Vide, Taxo contraria. Somniferæ me- dicinæ. Amygdalæ amaræ Halicacabus, siue sola- </p>	<p> num vesicarum. Anisum Amomum Cistos tertia, siue lada- num Baccharis Dorycnion Hyoscyamus Lactuca Iris Illyrica Opium Mandragoras Papauer rhœas, siue sa- tium Porrum Styrax Smilax hortensis Strychnon hypnoticō, siue solanum somni- ficum Vitex Vinum nouum Lapis memphites. Somnum discus- tientia. Spondylium Peucedanum. Somnia imagino- sa & mala inducentia. Faba Lens Pycnocomum Smilax leuis. Sordes purgātia. Irinum </p>
--	---

C V R A T I V V S.

Cortex thuris

Sabina.

Spasticorum
remedia.

Fiber.

Spasmi remedia.

Vide, Convulsionis re/
media.

Spiritū, id est, fla-
tum generantia.

Gentiana.

Spirantibus diffi-
culter vtilia.

Vide, Ortopnoicis.

Spiritus discurren-
tes coërcentia.

Bdellium.

Spirantibus vitā
auferentia.

Cedria.

Spicula infixā
corpori extra-
hientia.

Anagallis

Harundo

Aristolochia

Dicamnus

Propolis

Narcissus

Oxyacantha

Silurus

Triticum

Tragion

Xyphion

Xyris

Lacerta.

Spissandi vim
habentia.

Acacia Malus

Cotonea

Malum sylvestre

Amygdalus amara

Baccharis

Britannica

Polygonon mas & foe-
mina.

Clymenon Medion

Rubus Helxine

Idæa radix

Hippuris Psyllium

Bryon thalassium

Potamogeton

Acetum

Vinum hadrianum

Aerugo aurificum

Vinum nigrū labruscæ

Vinum tyburtinum

Cadmia

Pompholyx

Squama æris

Pumex Corallia

Rubrica sinopis

Lapis hæmatites.

Spleneticis vti-
lia.

INDEX

Vide, Lienis morbi re/ media.	Terebinthina	
Spumæ argenti	Cedrides	
contraria.	Melimela	Pruna
Vinum in commune.	Arbutus	Iuglans
Squamas ofstum	Auellana	Ficus
extrahentia.	Hordeum	Lens
Aristolochia tertia	Malua	
Peucedanum.	Porrum	
Staphyllomatis	Brassica fatiua & ma/ rina	
remedia.	Cepe	Nasturtium
Palma thebaica	Capparis	
Lapis schistos	Abfintium	
Lapis sapphiros.	Abfintium feriphium	
Sternutamentum	Balanus myrepica	
mouentia.	Vua	Thymelæa
Iris Illyrica	Ebulus	Prafium
Fiber	Galbanum	
Sinapi	Aqua maris	
Ptarmice	Vinū tethalaffomenū.	
Struthion		
Batrachio Daphnoides	Stomachi mor/ bi remedia.	
Helleborus albus.		
Steriles foeminas	Meu	Nardi spica
facientia.	Nardum Gallicum	
Vide, Generationem de	Malabathrum	
primentia.	Iuncus odoratus	
Stigmatum re-	Agallochum	
media.	Helenium	
Batrachion	Oleum balanintum	
Mandragora.	Mastichinum	
Stomacho con-	Vnguentum rosaceum	
traria.	Susinum	
	Nuclei pini	

Malua
 Cedrides
 Arbutus
 Populus
 Oliva
 Palma
 Peucedanum
 Malua
 Porrum
 Brassica
 Nasturtium
 Capparis
 Absinthium
 Absinthium
 Balanus
 Vua
 Ebulus
 Galbanum
 Aqua maris
 Vinū
 Stomachi
 Meu
 Nardum
 Malabathrum
 Iuncus
 Agallochum
 Helenium
 Oleum
 Mastichinum
 Vnguentum
 Susinum
 Nuclei

C V R A T I V V S.

Mastiche		Gingidium	
Cupressus		Scandyx	Aphace
Iuniperus	Laurus	Sampeloprasen	
Populus nigra	Rosa	Allium	
Oliuæ colymbades		Zingiber	Scilla
Palma		Bulbus esculentus	
Palma elate		Agaricum	
Malum punicum		Rhaponticum	
Siliquæ	Myrtus	Gentiana	
Cotonea		Acantha leuce	
Mala epirotica		Aloë	Abinthiū
Armeniaca		Mentha	
Mespilus		Tragorigantum	
Lotus	Pruna	Pulegium	Metilotus
Amygdalæ dulces		Ligusticum	Caros
Pistacia	Iuglans	Anethum	
Morus	Persea	Cuminum sylvestre	
Ficus Aegyptia		Hieracium maius	
Ionis		Apium	Petroselinū
Cochleæ terrestres		Smyrnion	Foeniculū
Onum	Lac	Scordion	Artemisia
Lac humanum		Nymphæa	
Caseus		Pæonia	Cestron
Lana succida		Polygonō mas	Rubus
Oriza	Lyncuriō	Strychnon satium	
Saccharon		Cotyledon prima	
Faba Aegyptia		Erigeron	Adiantum
Siser		Aster atticus	
Lupinum satium		Viola purpurea	
Lapathum	Lāpsana	Chamædaphne	
Brassica satia		Colocynthis	
Portulaca	Sonchios	Vitis famia	
Seris	Cucumis	Nuclei acinorum	
Lactuca		Vua cœnanthe	

Nuclei pini

CV R A T I V V S.

Mastiche		Gingidium	
Cupressus		Scandyx	Aphace
Iuniperus	Laurus	Sampeloprason	
Populus nigra	Rosa	Allium	
Oliuæ colymbades		Zingiber	Scilla
Palma		Bulbus esculentus	
Palma elate		Agaricum	
Malum punicum		Rhaponticum	
Siliquæ	Myrtus	Gentiana	
Cotonea		Acantha leuce	
Mala epirotica		Aloë	Abinthiū
Armeniaca		Mentha	
Mespilus		Tragorigantum	
Lotus	Pruna	Pulegium	Melilotus
Amygdalæ dulces		Ligusticum	Caros
Pistacia	Iuglans	Anethum	
Morus	Persea	Cuminum sylvestre	
Ficus Aegyptia		Hieracium maius	
Ionia		Apium	Petroselinū
Cochleæ terrestres		Smyrnion	Foeniculus
Onum	Lac	Scordion	Artemisia
Lac humanum		Nymphæa	
Caseus		Pæonia	Cestron
Lana succida		Polygonō mas	Rubus
Oriza	Lyncuriō	Strychnon sativum	
Saccharon		Cotyledon prima	
Faba Aegyptia		Erigeron	Adiantum
Siser		Aster atticus	
Lupinum sativum		Viola purpurea	
Lapathum	Lāpsana	Chamædaphne	
Brassica sativa		Colocynthis	
Portulaca	Sonchios	Vitis famia	
Seris	Cucumis	Nuclei acinorum	
Lactuca		Vua œnanthe	

INDEX

Omphacium
 Vini qualitas
 Phalerum
 Hydromel
 Thymoxalme
 Omphacomeli
 Vinum
 Vinum furrentinum
 Vinum omphacite
 Vinum nigrum ex la-
 bruscæ floribus
 Vinum melitite
 Vinum scilliticum
 Vinum cydonite
 Vinum apijte
 Vinum anethinum
 Vinum rhoite
 Vinum myrtite
 Vinum terebinthinum
 Vinum phoenicite
 Vinum absinthite
 Vinum bunite
 Vinum dictamnite
 Vinum calaminthite
 Vinum aromatite
 Vinum nectarite
 Vinum nardite
 Vinū ex sylvestri nardo
 Vinum selenite
 Ferrum
 Flos salis
 Fax vini
 Lapis alabastrites
 Lapis samius,

Strumæ gutturis remedia.

Iris Illyrica Grossi
 Vipera Mustela
 Vnguis asini Finum
 Hordeum Loliū
 Fabæ Lens
 Lupinum satium
 Lapathum
 Andrachne, siue portu-
 laca sylvestris
 Plantago Piper
 Capparis Argemone
 Coriandrum,
 Libanotis
 Laserpitium
 Aparine
 Millefolium
 Scordion
 Lithospermon
 Cotyledon prima
 Galiopsis
 Pseudobunion
 Adiantum
 Testæ, siue terræ for-
 nacum.

Strangulatus remedia.

Irinum
 Absinthium.
 Stranguriæ mor-
 bi remedia.
 Aspalathus

Cedri

C V R A T I V V S.

Cedrides	Locustę	Vnguentum melinum.
Asparagus		Rhodides Myrtus.
Sisymbrium		Bulbus esculentus
Medica		Vinum myrsinite
Panaces heracleon		Sulphur Gypsum.
Seseli Malsiliense		Terra samia.
Hipposelinon		Sudoreseuocātia.
Hippomarathron		Metopium vnguentum
Polycnemon		Smyrnion
Clinopodium		Pyrethrum
Oenanthe	Conyza	Onobrychis.
Asplenon	Cepe	Flos salis
Onobrychis		Anchusa
Poligonon mas		Lycopsis.
Saxifragon		Sues necantia.
Xyris		Chamæleon albus
Laurus Alexandrina		Suffusionū mor-
Tragion		bi remedia.
Pseudobunion		Fel Sanguis.
Adiantum.		Sagapenum
Stipticæ medi-		Euphorbium
cinæ.		Chamæsyce
Vide, Adstrictorię me-		Harena litoris.
dicinæ.		Sugillatorum re-
Succi qui peri-		media.
munt.		Acetum Sal.
Diosc. lib. 6. in præfat.		Superciliorum
Sudorem depri-		raritati vtilia.
mentia.		Picea.
Oleum		Supercilij's gla-
Oleum omphacinum.		bris vtilia.
Oleum oleastri		Fuligo resinæ
Myrtēū Lentiscinum		V v

INDEX

<p>Suppurationis tuberculorum remedia.</p> <p>Crocomagma Palimpissa.</p> <p>Suppurationum remedia.</p> <p>Ficus Aegyptia Mel Hordeum Lolium Curcubita Ligusticum Smyrnion Althæa Mandragoras Vrtica Narcissus Ampelos leuce Diphryges.</p> <p>Suspiriosorum remedia.</p> <p>Canchamum Cyphi Oleum amygdalarum Pix Ficus Vulpinus pulmo Eruum Plantago Agaricum Rhaponticum Aristolochia tertia Hyssopum Thymus Acinos Ruta Galbanum Ammoniacum Praſium</p>	<p>Parthenium Anagyris Adiantum Thapsia Ampelos leuce Vinum paſſite Vinum hyſſopite.</p> <p>TABIDI corporis remedia.</p> <p>Vide, Phthiſicorum re- media.</p> <p>Tabescentibus vtilia.</p> <p>Daphnides Vinum ſtrobilite.</p> <p>Taxo contraria. Vinum in commune Acetum Dioſc. lib. 6. cap. 12.</p> <p>Tela infixæ cor- poribus extrahentia. Vide, Spicula infixæ.</p> <p>Tenaſmi morbi remedia.</p> <p>Lac ſchiſton Fœnogræcum Linum Eruum,</p> <p>Teredinem ſen- tientia.</p> <p>Ficus Aegyptia Hyofcyamus.</p> <p>Teredinem non ſentientia,</p>
---	--

C V R A T I V V S.

Tilia

Hermol. Cor. cap. 133.

Teredinem ne-
cantia.

Sal.

Testium morbi
remedia.

Vitex

Myrtus

Cicer

Faba

Erysimon

Asphodelus

Melilotus

Ruta

Cyminum

Lilium

Hyosciamus

Erigeron

Vua passa

Sal

Geodes lapis

Terra samia

Cimolia.

Thapsiæ con-
traria.

Diosc. lib. 6. in præfat.
& cap. 33.

Theriacam in-
gredientia.

Rapa sativa

Zingiber

Dictamnus

Apium.

Theriomatum
remedia.

Lupinum sativum

Eleli sphacos.

Thoracis reme-
dia.

Cerebrum gallinacei
Glycyrrhiza.

Thymos absu-
mentia.

Smaris

Fimum

Thymus

Ruta

Heliotropium maius

Vitis sativa

Sal.

Tibiarum vlce-
rum remedia.

Hydropiper

Ampelos leuce.

Tineas latas pel-
lentia.

Cardamomum

Costum

Malicorium

Melimela

Iuglans

Morus

Heliotropium minus

Vinum absinthite

Lupinum sativum

Brassica sativa

Portulaca

Chamaeleon albus

Hyssopum

Calamintha

Thymus

Ruta

Coriandrum

Melilotum

Bryon thalassion

V V z

INDEX

•Pteris	Telypteris	Iris Illyrica	
Vinum cedritej		Acorus	Mes
Calcanthum		Cardamomum	
Anchusa tertia.		Balsamum	
Tineas rotundas		Agallocum	
generantia.		Oleum	
Triticum.		Iuniperus	
Tineas necantia.		Halimos	Iuglans
Abinthium seriphion		Ficus	Fiber
Mentha		Talus suis	Triticum
Heliotropium minus		Milium	Panicum
Cedria		Brum	Atriplex
Aizoon maius.		Sisymbrium	
Tineis contraria.		Plper	Scilla
Citria.		Agaricum	
Tonsillarū mor-		Rhaponticum	
bi remedia.		Centaurium maius	
Pix	Cedria	Eringium	
Lycium	Pruna	Calamintha	
Morus	Ficus	Serpyllum	
Hirundines		Sampsuchus	Ruta
Lac schiston	Mel	Panaces heracleon	
Sinapi	Aloë	Acetum	
Origanum	Britanica	Cyminum sativum	
Periclimenos	Helxine	Seseli Massiliense	
Peristereon supinus		Cyminum sylvestre	
Omphacium		Blaphoboscon	
Vinum myrsinite		Petroselinum	
Flos æris		Daucus	Libanotis
Alumen	Sal.	Ferula	
Torminis re-		Peucedanum	
media.		Asclepias	
		Melissophyllos	
		Phalangion	

C V R A T I V V S.

Conyza	Alisma	Asphodelus
Chamaepitys		Panaces Asclepion
Gramen		Laserpitium
Pseupobunion		Viscum Thapsia
Chamaedaphne		Mandragoras
Vinum scillite		Bphemeron
Vinum cedrite		Cucumis anguinus
Vinum hyssopite		Vrtica
Vinum tragoriganite		Aerugo aurificum
Vinum panacite		Lapis asius
Aphronitrum		Terra cimolia.
Et in verbo, Disenteri corum remedia.		Tubera exte- nuantia.
Torporis re- media.		Triticum.
Fagus.		Leontopodium
Torsionis re- media.		Scammonia
Tragoriganum.		Vinum nigrum c la- brusca.
Toxico cōtraria.		Tumorum re- media.
Glandes. Sanguis.		Anagyris
Tremorem excu- tientia.		Platanus Fagus
Vnguentum cinnamo- minum.		Ilex Adeps
Tremoris re- media.		Hordeum Faba
Lepus terrestris.		Brassica sativa & syl- uestris
Tuberculorū sup- purationis remedia.		Cucurbita
Strigmēta gymnastorū		Nasturtium
Morus Cepe		Hydropiper
		Bulbus esculentus
		Isatis
		Chamaeleon
		Tragorigannm

INDEX

Sampfuchum	Calamus odoratus
Ligusticum	Cupressus
Daucus Libanotis	Cedrides
Melanthium	Cistos Cacalia
Orchis serapias	Chamaedrys
Orminum	Tragacantha
Buphthalmus	Dracunculus
Cannabis syluatica	Faba Helenion
Polygonon mas	Hipparis
Lagopus Xyris	Hyoscyamus
Helxine	Iris Illyrica
Pentaphyllon	Lycium
Peristerion supinus	Laserpitium Mel
Hyoscyamus	Melicratum
Psyllium	Origanum Pix
Xanthium	Paliurus Piper
Sesamoides	Peucedanum
Ephemerum	Prasium
Phlomis	Papauer satium
Cucumis anguinus	Ruta Styrax
Thapsia	Strution
Chamaesyce	Smyrnion
Pycnocomum	Sulphur
Aqua maris	Triticum
Indicus lapis	Tragoriganum
Fæx vini Spongia.	Terebinthina
Tussis remedia.	Vua passa.
Amygdala amara	Tussis veteris
Asphodelus	remedia.
Apium satium	Asarum Myrrha
Bdellium	Nuclei pini
Bromos	Mastiche
Cinnamonum	Naphtha

C V R A T I V V S.

Cerasia		Venerē cū volu-
Amygdala amara		ptate expedientia.
Anellana	Allium	Lanrus Alexandrina.
Ficus	Propolis	Venerem cohi-
Raphanus		bentia.
Scilla	Hyssopus	Portulaca Lactuca
Centaurium maius		Lactuca siluestris.
Baccharis		Venerem stimu-
Seseli Malsiliense		lantia.
Daucus		Costum Crocum
Sagapenon		Mastiche Linum
Galbanon		Rapa satiuā Siser
Scordion		Eruca Porrum
Bechion	Helxine	Cepe Nasturtium
Phlomides		Dracunculus maior
Acetum		Dracunculus minor
Vinum hyssopite		Bulbus esculentus
Sandaracha.		Mentha
V AROS purgātia.		Staphylinus
Oleū balaninū.		Anisum Orchis
Myrrha		Orchis serapias
Lacerta	Linum	Satyrion
Porrum	Cepe	Satyrion alterum
Bulbus esculentus		Orminum Xiphion
Pulegium		Vrtica Galiopsis.
Balanus myrepica		Venenata fu-
Cici	Sory.	gantia.
Ampelos leuce.		Vitex Dictānus.
Varices sanantia.		Venas excitātia.
Circion.		Vinum phalernum.
Veneficijs me-		Ventris animalia
detur.		expellentia.
Scilla.		V v 4

INDEX

Vide, Tineas latas.	Ruta	Apium
Ventrē soluētia.	Laserpitium	Leucas
Vide, Aluum soluētia.	Polium	Cestron
Venenatorum	Pentaphyllum	
ictus remedia.	Colchicon	
Cardamomum	Epipactis	Passum
Nardum gallicum	Linum gypsatum	
Helenium	Rubrica lemnia	
Cinnamomum	Terra samia.	
Bdellium Vitex	Vermibus con-	
Ficus Propolis	traria.	
Raphanus Triticum	Cedria.	
Eryngium	Verrucas tol-	
Cuminum syluestre	lentia.	
Althæa Tribulus	Batrachion	
Prasium	Clinopodion	
Smilax aspera	Characia	
Aqua maris Acetum.	Chamaesyce	Dipsacos
Venenorum re-	Ficus	Grossi
media.	Cicer	Lacerta
Cinnamomum	Heliotropiū	Fimum
Oleum Pix	Staphis agria	
Palurus Lyciū	Scilla	Thymus.
Olea Aethiopica	Vertiginis morbi	
Iuglans	remedia.	
Lixiua ex ficu	Balsamum	
Lepus terrestris	Lac humanum	
Fiber Butyrum	Peucedanum	
Sanguis Vrina	Galbanum	
Rapa sativa	Malua	Ampelos leuce
Brysimon Agaricū		Ampelos melæna
Aristolochia secunda		Acetum scilliticum
Abrotonum		Vinum scilliticum.

CV RATIVVS.

Vertiginem ad generantia.

Cardamomum
Balsamum
Hyoscyamus
Mandragoras
Falernum
Vinum rhetinite
Mandragorite
Aconitum Cicutā.

Vesicæ morbi remedia.

Meu
Nardum gallicum
Nuclei pini Cupressus
Laurus Palma
Palma elate
Myrtus Lac
Ficus Ouum
Cochleæ terrestres
Cicadæ Napum
Ceruinum cornu
Saccharum
Gramen Malua
Hippuris
Portulaca
Lotus sylvestris
Plantago vna passa
Cucumis
Scandyx Passum
Ochra Porru
Bulbus vomitiuus
Rhaponticum

Glycyrrhiza
Tragacantha
Panaces heracleon
Petroselinum
Smyrnion
Peucedantum
Foeniculus Nymphaea
Anthemis Peonia
Phalaris Cepe
Alcyonium Cestron

Vinum terebinthinum
Vinum scilliticum
Vinum aromatite
Vinum halosanthite
Lapis morochthus.

Vesparumictus remedia.

Laurus Malua
Silybrium.
Vestibus ne ani-
malia noceant.
Absinthium
Heliochrysos.

Vibices plagarū emendantia.

Susinum.
Viperæ morsus
remedia.

Casia Costum
Iuniperus
Macer
Fraxinus Vrina

V V 3

INDEX

Caries lignorum	Argemone	Gentiana
Triticum	Eruum	Ruta
Ferula	Anchusa	Chamaeleon niger
Onocheles	Libanotis	Lilium
Ocimoides	Nymphaea	Cicuta
Diosc. lib. 6. cap. 63.	Erythrodanum	
Herm. Cor. cap. 721.	Helleborum nigrum	
Virium infirmi-	Cucumis anguinis	
tates roborantia.	Balanus myrepica	
Nuclei pini.	Narcissus	
Visco contraria.	Sulphur	
Vinum in communi	Halcyonium	
Acetum	Terra melia.	
Vinum absinthite	Vitra fracta con-	
Diosc. lib. 6. cap. 21.	glutinantia.	
Viscerum morbi	Herm. Cor. cap. 254.	
remedia.	Umbilicire-	
Thus.	media.	
Vitiliginis re-	Lapis magnes.	
media.	Vnguibus vtilia.	
Daphnides	Pix	Cupressus
Myrtus	Daphnides	
Ficus	Olea	Oriza
Grossi	Linum	Lapathum
Cochlex terrestres	Bulbus esculentus	
Lepus terrestris	Batrachion	
Sepia	Chelidonium minus	
Faba	Viscum	Vua passa
Beta	Sandaracha	Alumen
Lupinum satium	Sulphur	Fæx vini.
Chondrylla	Vocem claram	
Cepa	reddentia.	
Allium		
Piper		
Dracunculus maior		
Dracunculus minor		
Asphodelus		
Capparis		

C V R A T I V V S.

<p>Myrrha Styrax Voluptates ani- mi augescencia. Buglossum. Volucrum mor- sus remedia. Iecur aprinum. Vomitiones mo- uentia. Irinum Cochlex terrestres Omotarichos Blattæ Asphodelus Capparis Bulbus vomitorius Origanum Anagyris semen Papauer spumeum Mandragoras Daphnoides Helleborus albus Elaterium Balanus myreplica Narcissus Melicratum Aes vstum Chrysocolia Rubrica lemnia. Vomitiones co- hibentia.</p>	<p>Silurus. Vomica morbi remedia. Paliurus Struthion Bechion Mandragora Acetum. Vrendi vim ha- bentia. Misy Vredinem fa- cientiu. Trifolium. Vrinæ difficultas tem generantia. Diosc. lib. 6. in prefat. Vrinæ harenosæ & asperæ remedia. Papauer ceratitis. Vrinam cruētam mouentia. Clymenon. Vrinā arcessentia. Bruum Vrinā mouentia. Acorus Meu Cyperus</p>	<p>Atriplex Apium Mentha Eupatorium. Thlaspi Bryngion Psyllium Laurus Pepo Cestrum Sylibon Cici Galbanum Acetum Faba Faba</p>
--	---	--

INDEX

Cardamomum	Oues	Buprestis
Nardi spica	Vermes terreni	
Nardum gallicum	Mel	Hordeum
Asarum Phu	Zythum	Milium
Malabathron	Panicum	Cicer
Casia	Eruum	Rapa sativa
Cinnamomum	Raphanus	
Costum	Rhaphanus agria	
Iuncus odoratus	Sifer	Bunion
Calamus odoratus	Brassica sativa	
Balsamum Crocum	Asparagus	
Crocomagma	Sisymbrium aquaticum	
Helenium	Crithmon	Cucumis
Oleum amygdalinum	Pepo	Lactuca
Unguentum melinum	Gingidium	Caucalis
Susinum Irinum	Bruca	Ocimum
Amaracinum	Smilax hortensis	
Bdellium	Porrum	
Picea Nuclei pini	Ampeloprasum	
Lentiscus Resina	Cepa	Allium
Terebinthus	Piper	Struthion
Cupressus	Dracunculus	
Iuniperus	Asphodelus	
Populus alba	Scilla	Capparis
Paliurus Tilia	Agaricum	
Olea aethiopica	Crocodilum	
Glandes Myrtus	Centaureum maius	
Palma elate	Chamaeleon albus	
Siliqua Cotonea	Acantha leuca	
Mala epirotica	Acantha	Anonis
Cornus	Bryngion	
Amygdala dulces	Abinthium	
Erinaceus marinus	Abrotonum	
Cimices lecti	Tragoriganum	

CV R A T I V V S.

Helisphacos	Thymus	Papauer rhoeas
Serpyllum	Baccharis	Strychnon hypnoticon
Ruta	Moly	Cotyledon prima
Ligusticum		Vrtica
Staphylinus	Tordyls	Arcticon
Sison	Anisum	Vinum lesbium.
Caros	Anethum	Hydromel
Cyminum	syluestre	Melicratum
Opium	Oreoselinum	Vinum rhetinite
Petroselinum		Vinum catorchite
Daucus	Libanotis	Vinum e cedro
Melanthion		Vinum e lauro
Ammoniacum		Vinum absinthite
Chamaedrys		Vinum calaminthite
Trifolium	Scordion	Vinum aromatite
Androsaces	Anthyllis	Vinum nectarite
Anthemis		Vinum nardite
Lithosperma		Vinum asarite
Erythrodanum		Vinum sylvestris nardi
Lonchitis	Althæa	Vinum daucite
Hypericon	Choris	Vinum acorite
Chamaepitys		Halcyonium
Cestron		Lapis hæmatites
Polygonon mas		Tapis Iudaicus
Polemonia		Corallinum
Saxifragon		Vinum chamaepiteos
Xyris	Gramen	Vrtice herba pru-
Gramen parnasium		ritus remedia.
Phoenix herba		Herm. Cor. cap. 707.
Hippuris		Vitis utilia.
Oxychoenos		Vrtica siue acalyphe.
Heliochrysos		Vux faucium.
Astragalus		remedia.
Hyacinthus	Pix	Galla

INDEX

Pruna	Hirundines	Polycnemon	Polium
Vrtica	Omphacium	Polygonon mas	
Acetum	Flos æris	Polygonatum	
Alumen	Sal.	Pentaphyllum	
Vulpes necantia.		Phoenix herba	Pteris
Apocynon.		Peristereō	Papauer
Vulnerū remedia		Plumbum elotum	
Amurca		Scordion	Symphyton
Allium	Argemone	Sideritis	
Aristolochia	Aloë	Stratiotes aquaticus	
Anthyllis	Althæa	Spongia	
Androsæmon		Cochleæ terrestres	
Lycopsis	Acetum	Thus	Terra eretria
Butyrum	Brassica	Vinum	
Coccus	Chamæpitys	Vinum œnanthe	
Centaurion		Vnguentum citrinum	
Cyclaminos		Vlmus	Vitex.
Cytinus	Cupressus	Vulvæ mulieris	
Dracunculus		remedia.	
Dictamnus		Meu	Cyperus
Aerugo aurificum		Nardi spica	
Oenanthe		Cassa	Costum
Ficus Aegyptia		Iuncus odoratus	
Fimum	Gentiana	Balsamum	Bryon
Glycyrriza	Glutinū	Narcaphthum	
Hippuris	Isatis	Oleum amygdalinum	
Lana succida		Mastichinum	
Ligusticum	Lilium	Vnguentum rosaceum	
Lyfimachion		Melinum	
Minium sinopicum		Sampsuchinum	
Myriophyllum		Abrotoninū	Susinū
Picea	Palma	Narcissinum	
Portulaca	Porrum	Crocinum	Irinum

C V R A T I V V S.

Gleucinum		Peucedanum
Amaracinum		Sagapennum
Metopium		Galbanum
Cinnamomum		Asclepias
Myrrha	Styrax	Lilium
Bdellium		Circæa
Lentiscus	Pix	Artemisia
Naphtha	Iuniperus	Geranium
Laurus	Myrica	Anthyllis
Cistos	Rosa	Parthenion
Lycium	Acacia	Pæonia
Amurca	Vitex.	Cestron
Galla	Palma elate	Clematis daphnoides
Myrtus	Cotonea	Chrysocome
Iuglans	Cimices lecti	Ageraton
Lac schiston	Butyrū	Vinum terebinthinum
Oesypum	Coagulum	Vinum cedrite
Adeps	Fœnogræcum	Vinum picatum, siue
Linum	Malua	pissite
Portulaca	Plantago	Vinum chamædryte
Sonchos	Porrum	Vinum daucite
Sinapi	Piper	Vinum helleborite
Agaricum		Lapis gagates
Rhaponticum		Peristereon rectus
Pulegium		Hyoscyamus
Centaurium maius		Mandragoras
Melilotus	Ruta	Ebulus
Panaces heracleon		Ampelos leuce
Ammi		Acetum
Spondyliion		Acetum scilliticum.

INDICIS CVRATIVI
FINIS,

EXCVDEBAT
Theobaldus Paganus.

1 5 4 7.

